

**Documento de consenso de Gesida/Plan Nacional sobre el Sida respecto
al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la
inmunodeficiencia humana
(Actualización enero 2011)**

Panel de expertos de Gesida y Plan Nacional sobre el Sida



Panel:

Coordinadores:

Fernando Lozano¹

Hospital de Valme. Sevilla

Pere Domingo Pedrol¹

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Rosa Polo²

Secretaría Plan Nacional sobre el Sida. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Madrid

Redactores:

Koldo Aguirrebengoa¹

Hospital de Cruces, Bilbao

Pere Domingo Pedrol¹

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Hernando Knobel²

Hospital del Mar, Barcelona

Celia Miralles²

Hospital Xeral, Vigo

Antonio Rivero¹

Hospital Reina Sofía, Córdoba

Jesús Sanz²

Hospital de la Princesa, Madrid

Juan Berenguer¹

Hospital Gregorio Marañón, Madrid

M^a José Galindo²

Hospital Clínico Universitario, Valencia

Esteban Martínez²

Hospital Clínic, Barcelona

Daniel Podzamczar¹

Hospital Univ. de Belvitge, L'Hospitalet. Barcelona

Jesús Santos²

Hospital Univ. Virgen de la Victoria. Málaga

Montserrat Tuset²

Hospital Clínic, Barcelona

Consultores:

Jose R. Arribas¹

Hospital La Paz, Madrid

Vicente Boix¹

Hospital General, Alicante

Vicente Estrada¹

Hospital Clínico, Madrid

José M^a Gatell¹

Hospital Clínic, Barcelona

Josep Maria Llibre¹

Hospital Germans Trias Pujol, Badalona

Santiago Moreno¹

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Vicente Soriano¹

Hospital Carlos III, Madrid

Julio Arrizabalaga¹

Hospital Donostia, San Sebastián

Bonaventura Clotet¹

Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

Federico García¹

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Félix Gutiérrez¹

Hospital General Universitario, Elche

José M^a Miró¹

Hospital Clínic, Barcelona

Federico Pulido¹

Hospital Doce de Octubre, Madrid

Redactor General

José López Aldeguer¹

Hospital La Fe, Valencia

1. Miembros del Panel propuestos por Gesida; 2. Ídem, propuestos por el Plan Nacional sobre el Sida

Agradecimiento:

La Junta Directiva de Gesida y la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida agradecen las aportaciones y opiniones de los doctores Marisa Álvarez, Àngels Andreu, Angel Burgos, María Coronado, Manuel Cotarelo, Jorge del Romero, Pedro Ferrer, Oscar L. Ferrero, Clara Gutiérrez, Henar Hevia, Francisco Ledesma, Juan E. Losa, Enrique Redondo y Rafael Rubio que han contribuido a mejorar la redacción y enriquecer el contenido del documento

Qué hay de nuevo en estas guías

Secciones nuevas

- Tratamiento antirretroviral en pacientes con eventos tipo C. Se comenta el TAR en pacientes diagnosticados simultáneamente de infección VIH y un evento tipo C (pág. 39)
- VIH en la mujer. Se ha modificado el capítulo relativo a la prevención de la transmisión materno-fetal que ahora se refiere al “Tratamiento antirretroviral en la mujer, en el embarazo la prevención de la transmisión materno-fetal” (pág. 85)
- Prevención de la transmisión del VIH. El capítulo relativo a la profilaxis postexposición se ha modificado incluyendo tanto aspectos de profilaxis preexposición como postexposición ocupacional o no (pág. 90)

Actualizaciones consideradas clave:

- Se aconseja iniciar el tratamiento antirretroviral en el paciente asintomático cuando los CD4 desciendan por debajo de 500 células/ μ L (Tabla 3, pág 104)
- Respecto a los fármacos que debe incluir el tratamiento antirretroviral inicial, se modifica el esquema en columnas (de familias de fármacos) por combinaciones concretas en función de los resultados de los ensayos efectuados con esas pautas (Tabla 4, pág 105)
- Entre las pautas recomendadas para el tratamiento de inicio, se diferencia entre las que hubo consenso global del panel frente a las que no lo hubo (Tabla 4, pág 105).
- Se recomienda el uso de fármacos coformulados para facilitar la adherencia (Pág 25 y Tabla 4, pág 105)

Otras actualizaciones

- Tratamiento de la infección aguda con síntomas graves (pág 14)
- Determinación genotípica del tropismo (pág 10)
- Pautas de tratamiento libres de análogos (pág 38)
- Consideraciones sobre los estudios de resistencia (pág 44)
- Se aportan en cada capítulo los datos relevantes de los ensayos y estudios nuevos en pacientes con o sin tratamiento previo

Índice

Resumen	1
1. Introducción	
1.1. Metodología	2
1.2. Principios generales	3
2. Parámetros para guiar el tratamiento antirretroviral	
2.1. Linfocitos CD4	4
2.2. Carga viral plasmática del VIH	5
2.3. Niveles plasmáticos de fármacos	6
2.4. Resistencia del VIH a fármacos antirretrovirales	6
2.5. Determinación del HLA B*5701	9
2.6. Determinación del tropismo	10
3. Infección aguda por VIH	11
4. Tratamiento antirretroviral inicial	
4.1. Cuándo iniciar el tratamiento antirretroviral	14
Evaluación del riesgo de progresión	15
Respuesta clínica (progresión a sida o muerte)	15
Incidencia de enfermedades no relacionadas con el VIH	16
Subgrupos de mayor riesgo de progresión	17
Respuesta inmunológica	17
Toxicidad de tratamiento antirretroviral	18
TAR en parejas serodiscordantes	18
4.2. ¿Qué combinación de antirretrovirales debe utilizarse?	
Criterios para la elección de las pautas de antirretrovirales	19
Consideraciones sobre elección de un NN o un IP	19
4.3. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido	
Ensayos clínicos que avalan las recomendaciones de uso de AN	20
Recomendaciones sobre análogos de nucleósido	25
Combinaciones de TAR con tres análogos	26
Ensayos que avalan las recomendaciones de uso de tres AN	26
Recomendaciones sobre las combinaciones de 3 AN	27

4.4. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos	
Ensayos clínicos que avalan las recomendaciones de NVP	28
Ensayos clínicos que avalan las recomendaciones de EFV	29
Consideraciones sobre la elección de un régimen con NVP o EFV	32
Recomendaciones sobre no nucleósidos	32
4.5. Inhibidores de la proteasa	32
Ensayos que avalan las recomendaciones sobre IP	33
Recomendaciones sobre IP	36
4.6. Inhibidores del correceptor CCR5	
Ensayos que avalan recomendaciones sobre inhibidores de CCR5	37
Recomendaciones sobre Inhibidores CCR5	37
4.7. Inhibidores de la integrasa	
Ensayo que avala la recomendación de inhibidores integrasa	38
Recomendaciones sobre Inhibidores integrasa	38
4.8. Pautas libres de análogos de nucleósido	38
Ensayo que avala la recomendación de pautas libres de AN	38
Recomendaciones sobre Inhibidores integrasa	39
4.9. TAR en pacientes sin tratamiento previo con eventos C	39
Recomendaciones sobre TAR y eventos C	40
5. Modificación del tratamiento antirretroviral	
5.1. Fracaso del TAR	40
Factores que influyen en el fracaso terapéutico	40
Criterios de cambio de TAR por fracaso virológico	41
Objetivo del tratamiento tras un fracaso virológico	42
5.1.1. Cambio de TAR tras fracaso precoz	44
5.1.2. Cambio de TAR en el fracaso avanzado (TAR de rescate)	46
Inhibidores de la proteasa potenciados	46
Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos	50
Inhibidores de la unión	52
Inhibidores correceptor CCR5	53
Inhibidores de la integrasa	54

Opciones en pacientes con múltiples fracasos virológicos	56
Replicación viral baja en pacientes multitratados	57
Suspensión del TAR	58
Recomendaciones de cambio de TAR por fracaso virológico	58
5.2. Simplificación del TAR	59
Reducción del número de fármacos	59
Reducción del número de comprimidos y/o de dosis	63
Simplificación a regímenes de administración una vez al día	66
Otros tipos de simplificación	69
Recomendaciones sobre simplificación	71
6. Adherencia	71
Recomendaciones sobre adherencia	74
7. Efectos adversos del tratamiento antirretroviral	75
Recomendaciones	78
8. Interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas	79
Recomendaciones	81
9. Hepatopatía crónica y tratamiento antirretroviral	82
Infección VIH, TAR e historia natural hepatitis crónica (VHB y VHC)	82
Toxicidad hepática de los FAR en pacientes con hepatopatía	82
Uso de antirretrovirales en pacientes con hepatopatía	83
TAR en pacientes en tratamiento de la hepatitis C	84
Tratamiento de la hepatitis crónica B en pacientes coinfectados	85
10. TAR en la mujer, el embarazo y prevención de la transmisión materno fetal	85
Consideraciones especiales del TAR en la mujer	85
Recomendaciones	87
TAR en el embarazo y prevención de transmisión materno-fetal	87
Recomendaciones	89
11. Prevención de la transmisión del VIH	90
Papel del TAR en la prevención de la transmisión del VIH	90
Profilaxis pre exposición	91
Profilaxis post-exposición ocupacional	91
Profilaxis post-exposición no ocupacional	93

12. Otras estrategias y nuevos fármacos	95
Interrupciones supervisadas del tratamiento	95
Tratamientos inmunomediados	97
Inmunizaciones terapéuticas	98
Nuevos antirretrovirales	98
13. Coste comparativo de combinaciones de fármacos antirretrovirales	99
14. Tablas	101
15. Bibliografía	186

Abreviaturas usadas:

3TC	Lamivudina
ABC	Abacavir
AN	Inhibidores transcriptasa inversa análogos nucleósido o nucleótido
APV	Amprenavir
ATV	Atazanavir
BID	Pauta de tratamiento administrada dos veces al día
CVP	Carga viral plasmática
d4T	Estavudina
ddI	Didanosina
DRV	Darunavir
EFV	Efavirenz
EMA	European Medicines Agency
ENF	Enfuvirtida
ETR	Etravirina
ETS	Enfermedades de transmisión sexual
FAR	Fármacos antirretrovirales
FPV	Fosamprenavir
FTC	Emtricitabina
IDV	Indinavir
IF	Inhibidores de la fusión
IInt	Inhibidores de la integrasa
IP	Inhibidores de la proteasa
IP/r	Inhibidor de la proteasa (IP) potenciado con ritonavir
IST	Interrupción estructurada del tratamiento
ITT	Análisis por intención de tratamiento
IU	Inhibidores de la unión al receptor CCR5
LPV	Lopinavir
MVC	Maraviroc

NFV	Nelfinavir
NN	Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos
NVP	Nevirapina
OT	Análisis “en tratamiento”
QD	Fármaco o pauta de tratamiento administrada una vez al día
RHS	Reacción de hipersensibilidad
RAL	Raltegravir
RTV	Ritonavir
SQV	Saquinavir
TAR	Tratamiento antirretroviral; ídem. de alta eficacia
TDF	Tenofovir DF
TLOVR	Tiempo hasta la pérdida de la eficacia virológica
TPV	Tipranavir
ZDV, AZT	Zidovudina

Resumen

Objetivo: Actualizar las recomendaciones sobre el tratamiento antirretroviral (TAR) para los adultos infectados por el VIH.

Métodos: Estas recomendaciones se han consensado por un panel de expertos del Grupo de Estudio de Sida y del Plan Nacional sobre el Sida. Para ello se han revisado los resultados de eficacia y seguridad de ensayos clínicos, estudios de cohortes y de farmacocinética publicados en revistas biomédicas (PubMed y Embase) o presentados en congresos. Se han definido tres niveles de evidencia según la procedencia de los datos: estudios aleatorizados (**nivel A**), de cohortes o de caso-control (**nivel B**), u opinión de expertos (**nivel C**). En cada una de las situaciones se ha establecido recomendar, considerar o no recomendar el TAR.

Resultados: El TAR con combinaciones de tres fármacos constituye el tratamiento de inicio de elección de la infección crónica por el VIH. Se recomienda iniciar el TAR en los pacientes con infección por VIH sintomática. Se incluyen directrices sobre el inicio de los enfermos con un evento infeccioso tipo C. En los pacientes asintomáticos el inicio de TAR se basará en los resultados de determinación de linfocitos CD4 (CD4/ μ L), en la carga viral plasmática (CVP) y en las comorbilidades del paciente: 1) Si los linfocitos CD4 son inferiores a 350 células/ μ L se recomienda iniciar el TAR; 2) En caso de que los linfocitos CD4 se encuentren entre 350 y 500 células/ μ L se recomienda el tratamiento salvo en casos de número estable de CD4, CVP baja o poca predisposición del paciente; 3) Si los linfocitos CD4 son superiores a 500 células/ μ L en general se puede diferir el tratamiento, pero se puede considerar en los pacientes con cirrosis hepática, hepatitis crónica por virus C, hepatitis B que requiera tratamiento, riesgo cardiovascular elevado, nefropatía VIH, CVP superior a 100000 copias/mL, proporción de CD4 inferior a 14%, edad superior a 55 años y en parejas serodiscordantes con riesgo de transmisión sexual. El esquema terapéutico debe incluir 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido o nucleótido (AN) y 1 inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo (NN) o 2 AN y 1 inhibidor de la proteasa potenciado con ritonavir (IP/r) aunque son posibles otras combinaciones. Se han seleccionado y priorizado por consenso combinaciones concretas de fármacos algunas de ellas coformuladas. El objetivo del TAR es conseguir una CVP indetectable. La adherencia al TAR juega un papel fundamental en la duración de la respuesta antiviral. Las opciones terapéuticas tras los fracasos del TAR son limitadas pero con los estudios genotípicos se puede conseguir el objetivo de CVP indetectable con los fármacos disponibles. La toxicidad es un factor cada vez menos limitante del TAR cuyos beneficios superan los posibles perjuicios. También se comentan los criterios de TAR en la infección aguda, en la mujer, el embarazo y prevención de la transmisión materno-fetal, así como la profilaxis pre y postexposición (laboral o no) y el manejo de la coinfección del VIH con los virus VHC y VHB.

Conclusiones: La cifra de linfocitos CD4, la CVP y las comorbilidades del paciente son los factores de referencia más importantes para iniciar el TAR en pacientes asintomáticos. Por otra parte, el número considerable de fármacos disponibles, los métodos más sensibles de monitorización de la CVP, y la posibilidad de determinar las resistencias hacen que las estrategias terapéuticas deban ser mucho más individualizadas para conseguir en cualquier circunstancia el objetivo de CVP indetectable.

1. INTRODUCCION

El tratamiento antirretroviral (TAR) evoluciona con tal rapidez que exige una frecuente actualización de sus recomendaciones. Desde que en 1995 el Plan Nacional Sobre el Sida (PNS) y su Consejo Asesor Clínico editaran las primeras “Recomendaciones de tratamiento antirretroviral en el adulto”¹, este organismo junto al Grupo de Estudio de Sida (Gesida) de la SEIMC han actualizado estas recomendaciones con periodicidad anual, publicándolas en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica o en sus respectivas páginas web². Otras instituciones y sociedades científicas elaboran y actualizan sus propias recomendaciones sobre el empleo de los fármacos antirretrovirales (FAR)^{3,4}.

El objetivo de este documento es dar a conocer a la comunidad científica y a los profesionales que tratan a pacientes infectados por el VIH el estado del arte del TAR en el momento de su actualización. Se incluyen algunos aspectos del tratamiento que tanto Gesida y el PNS, en colaboración con otras sociedades científicas han elaborado in extenso, a las que se remite al lector interesado en el tema.

1.1. Metodología

El Panel está formado por un grupo de clínicos expertos en el tratamiento de pacientes infectados por el VIH y en el uso de los FAR. Estos profesionales han sido designados por la Junta Directiva de Gesida y la Secretaría del PNS y aceptado voluntariamente. Los miembros se han dividido en grupos formados por un redactor y dos consultores para actualizar cada capítulo de las recomendaciones. Tres miembros del panel actúan como coordinadores y uno como redactor general.

Para la actualización de estas guías cada redactor ha revisado los datos más relevantes de las publicaciones científicas (PubMed y Embase; idiomas: español, inglés y francés) o las comunicaciones de los congresos recientes de la materia. Con esta recopilación el redactor de cada grupo actualiza su capítulo, somete sus aportaciones a los consultores consensuando las aportaciones. Cada capítulo se remite a los coordinadores y finalmente se ensamblan en el documento en el que se resaltan en amarillo las novedades. El documento se consensua en una reunión presencial de los coordinadores y redactores. Tras ello se expone durante un periodo de tiempo en la web de las entidades promotoras para que los profesionales a los que va dirigido y quien esté interesado pueda sugerir matices o cambios que el Panel puede o no aceptar *a posteriori*.

La jerarquización de la evidencia está ligada a la solidez del diseño de cada estudio y es esencial si sus resultados van a matizar una recomendación de práctica clínica. En este consenso la gradación de la evidencia se ha efectuado según una modificación de las recomendaciones de la IDSA⁵: **nivel A**, estudios aleatorizados y controlados; **nivel B**, estudios de cohortes o de casos y controles; y **nivel C**, estudios descriptivos u opinión de expertos.

Se debe recordar que los datos sobre TAR cambian frecuentemente, por lo que los lectores deben consultar con regularidad otras fuentes de información.

1.2. Principios generales

Tras más de 20 años de estudios clínicos con FAR efectuados en todos los estadios evolutivos de la infección por el VIH y utilizando los fármacos en distintas combinaciones pueden establecerse los siguientes principios:

1. El TAR se basa en combinaciones de al menos tres fármacos lo que retrasa la progresión clínica (morbilidad e ingresos hospitalarios), reduce los costes y aumenta la supervivencia^{6, 7}. Se han establecido pautas eficaces con menos número de fármacos en esquemas de simplificación y rescate que no están autorizadas por las autoridades sanitarias como tratamiento de inicio.

2. La adherencia al TAR desempeña un papel primordial en el grado y duración de la respuesta antiviral⁸. Por ello es imprescindible que cada centro hospitalario tenga una estrategia para mejorar el cumplimiento del TAR mediante una estrecha colaboración entre todos los profesionales implicados.

3. La situación clínica, la cifra de linfocitos CD4 y la CVP son los elementos básicos para establecer las decisiones terapéuticas y monitorizar la efectividad del TAR. Los linfocitos CD4 y la CVP son los parámetros imprescindibles para la toma de decisiones. Ambos son factores predictores independientes de la progresión de la enfermedad y de la aparición de enfermedades que en principio no se creían relacionados con el VIH. Además, la primera indica el riesgo de padecer eventos oportunistas y señala el momento de iniciar las profilaxis de las infecciones oportunistas. Existe una buena correlación entre las respuestas virológica, inmunológica y clínica (restauración de la inmunidad celular, retraso en la progresión y aumento de supervivencia)^{9, 10}.

4. El objetivo del tratamiento es reducir la CVP por debajo de los límites de detección (<50 copias/mL) y mantenerla suprimida el mayor tiempo posible.

5. La aparición de resistencias es un fenómeno inevitable cuando el VIH se expone a la presión selectiva de los fármacos y continúa su replicación. La detección de resistencias por métodos genotípicos es muy útil en el fracaso virológico.

6. Con las pautas actuales de TAR es posible la restauración del sistema inmune cuantitativa y cualitativamente independientemente de la inmunodepresión de partida^{11, 12}. La recuperación es lenta y constante mientras el TAR sea efectivo y es más difícil a partir de un determinado grado de deterioro y en la edad avanzada.

7. En diciembre de 2010 disponemos de 23 FAR comercializados que pertenecen a seis familias lo que posibilita estrategias terapéuticas individualizadas.

8. La toxicidad de los FAR a medio y largo plazo es un factor limitante que obliga a buscar nuevas opciones terapéuticas manteniendo la potencia antiviral¹³.

9. Hay diversas pautas de TAR que son similares en cuanto a potencia antirretroviral. La elección dependerá de los efectos secundarios, adherencia, tratamientos previos, resistencias cruzadas, interacciones farmacológicas, disponibilidad y coste, así como las preferencias del médico o paciente.

10. La recomendación de iniciar el TAR sólo cuando los CD4 llegan a un dintel determinado se debe fundamentalmente al temor a los efectos secundarios¹³, a las dificultades de adherencia⁸ y el riesgo de desarrollo de resistencias¹⁴. También ha influido en esta actitud la imposibilidad de erradicar el VIH^{15, 16} y de restaurar la respuesta inmunespecífica frente al mismo^{17, 18}. Sin embargo, la mejoría gradual de

las pautas de inicio en cuanto a tolerancia y simplicidad, la evidencia de un efecto negativo directo del VIH *per se*, así como el incremento de opciones de rescate tras un fracaso virológico ha reabierto el debate sobre este tema y algunos expertos abogan por recomendaciones menos restrictivas para iniciar el tratamiento.

11. La complejidad creciente del TAR implica que el cuidado de los pacientes debe efectuarse por personal especializado que tenga los conocimientos y los medios adecuados¹⁹.

12. La prevención de la infección por el VIH es un aspecto fundamental que no debe olvidarse nunca en la práctica clínica diaria y que debe introducirse de forma sistemática en la educación sanitaria de los pacientes y las personas de su entorno.

2. PARAMETROS PARA GUIAR EL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

El recuento de linfocitos CD4 y la CVP son los parámetros que se utilizan para indicar el TAR, monitorizar su eficacia y tomar decisiones respecto a cambios.

Existen otros parámetros que, aunque no intervienen directamente en el inicio del TAR, se deben realizar igualmente en la evaluación inicial o en el seguimiento ya que pueden matizar las decisiones terapéuticas (Tabla 1).

2.1. Linfocitos CD4

El número de linfocitos CD4 es el marcador principal de riesgo de progresión clínica de la infección VIH y necesidad de TAR. Un objetivo del TAR es la restauración inmunológica y la forma más práctica de valorarlo es midiendo el incremento de los CD4, que es evidente en las primeras semanas de tratamiento^{12, 20, 21}. Además del número de linfocitos CD4 se restaura la respuesta proliferativa frente a mitógenos y antígenos memoria pudiendo retirar las profilaxis de infecciones oportunistas²⁰⁻²³. Paralelamente al aumento de los linfocitos CD4, hay una disminución de los CD8 y otros marcadores de activación del sistema inmune^{20, 22}.

El aumento de la cifra de CD4 es lento pero constante en el tiempo. No hay datos que definan cuál es la respuesta inmunológica adecuada. Se admite, según estudios de cinética celular, que durante el primer año debería existir un aumento mínimo de 50-100 CD4/ μ L²⁴. No es raro observar una discordancia entre respuesta virológica e inmunológica: pacientes que mantienen una cifra de CD4 estable o que disminuye a pesar de tener una CVP no detectable²⁵⁻²⁸. En esta situación puede existir carga viral detectable en tejido linfático por un TAR subóptimo²⁷. Sin embargo, esta linfopenia puede deberse a otras causas como hipertensión portal, toxicidad farmacológica, etc. En este sentido, se ha sugerido que en cirróticos se pueda usar el porcentaje de CD4 para la toma de decisiones^{29, 30}, aunque también en estos pacientes el número de CD4 ha demostrado ser el mejor predictor de riesgo³¹. Por otra parte, se ha comunicado la posibilidad de suspender la profilaxis frente a *P. jiroveci*, en pacientes con <200 CD4/ μ L si la CVP está suprimida lo que orienta a que la supresión viral continuada debe ser necesaria para la reconstitución de la función inmune³².

En los pacientes asintomáticos deben medirse los linfocitos CD4 cada 3-6 meses y ante un hallazgo que oriente a tomar una decisión terapéutica, debe repetirse en 3-4

semanas^{33, 34}. Se aconseja la repetición del recuento de linfocitos CD4 antes de tomar la decisión de iniciar el TAR.

Recomendación sobre linfocitos CD4

- Se debe controlar el número de linfocitos CD4 ya que es el parámetro más importante para decidir el inicio del TAR (**nivel B**).

2.2. Carga viral plasmática del VIH

El objetivo del TAR es suprimir la replicación viral de modo rápido y duradero. La CVP desciende rápidamente (1-2 log₁₀) al inicio del TAR y el nadir, que se alcanza a las 4-8 semanas, se correlaciona con la duración de la respuesta³⁵⁻³⁸. Los pacientes con CVP muy elevadas pueden tardar hasta 24 semanas en conseguir niveles <50 copias/mL³⁹.

El objetivo de supresión de la CVP es llegar a una cifra inferior a 50 copias/mL, cifra con la que se ha comprobado que no se seleccionan mutaciones^{40, 41} y la duración de la respuesta virológica es mucho mayor (frente a los que mantienen CVP entre 50 y 500 copias/mL)³⁶. En los pacientes con CVP controlada se ha observado ocasionalmente brotes transitorios de viremia de bajo nivel (*blips*)⁴² que vuelve espontáneamente a ser indetectable sin ningún cambio en el tratamiento. La patogenia de los *blips* no está clara y se ha sugerido que la activación inmune por infecciones intercurrentes estimularían las células crónicamente infectadas (reservorios) con aparición transitoria de CVP⁴³. La mayoría de estudios no relacionan los *blips* con fracaso virológico⁴⁴⁻⁴⁷, aunque un pequeño porcentaje pueden desarrollar fracaso virológico con aparición de mutaciones de resistencia^{48, 49}.

Los criterios de respuesta y fracaso virológicos son:

Respuesta virológica: Descenso de la CVP >1 log a las 4 semanas de TAR y CVP <50 copias/mL a las 16-24 semanas.

Fracaso virológico: Cualquiera de las siguientes situaciones a) CVP detectable a las 24 semanas de TAR, o b) si tras alcanzar una CVP indetectable (<50 copias/mL), ésta vuelve a ser detectable en dos determinaciones consecutivas.

Es conveniente medir la CVP a las 4 semanas de inicio del TAR para comprobar la respuesta virológica y como medida indirecta de adherencia. Posteriormente la determinación se hará cada 3-6 meses. Si la medida de la CVP se efectúa tras un proceso viral intercurrente o vacunación puede haber brotes transitorios de la CVP⁵⁰.

Recomendaciones sobre carga viral plasmática

- Se debe conocer la CVP ya que es un criterio secundario para el inicio del TAR, complementario al número de CD4 (**nivel A**)
- Se debe controlar la eficacia del TAR mediante la CVP que es el parámetro principal para evaluar la misma, definir su fracaso y para tomar decisiones de cambio (**nivel B**)
- Debe utilizarse una técnica de determinación de CVP cuyo dintel de detección sea <50 copias/mL y usar siempre la misma técnica (**nivel B**)
- Si se van a tomar decisiones terapéuticas en función de un resultado, se debe confirmar la CVP con una segunda determinación (**nivel B**)

2.3. Niveles plasmáticos de fármacos

Las concentraciones plasmáticas de algunos FAR se correlacionan con su eficacia o toxicidad por lo que se ha sugerido que la determinación de los niveles plasmáticos podría ser útil para optimizar su uso⁵¹.

Se conocen determinadas situaciones clínicas o factores que pueden inducir variaciones importantes en los niveles plasmáticos de los FAR lo que justificaría su determinación⁵². Entre ellos están el sexo, edad, peso y superficie corporal, los niveles de alfa1-glucoproteína y variaciones en las isoformas del citocromo P450, las interacciones medicamentosas, el embarazo, la insuficiencia hepática o renal.

La monitorización de los niveles plasmáticos se limita a NN e IP ya que la determinación de la forma activa de los AN (intracelular) presenta una variabilidad inter e intrapaciente tan amplia que dificulta su uso clínico.

El valor de los niveles de IP con respecto a su eficacia ha perdido vigencia desde que se utilizan potenciados aunque ha aumentado su valor para reducir toxicidad. Los datos que relacionaban niveles plasmáticos de IP y eficacia se obtuvieron en los estudios de desarrollo donde se utilizaron en monoterapia⁵³. Los estudios en regímenes de combinación han mostrado resultados dispares, variando según línea de tratamiento (sin terapia previa frente a pretratados), fármacos acompañantes (otros IP o NN) o potenciación con RTV⁵⁴⁻⁶⁰. En cuanto a toxicidad, se ha demostrado una relación entre niveles plasmáticos y algunos efectos secundarios como alteraciones gastrointestinales, hipertrigliceridemia y parestesias (RTV), alteraciones renales (IDV), hepatotoxicidad (NVP), colesterol total y triglicéridos (LPV/r)⁶¹⁻⁶⁵. Igualmente hay datos que sugieren que los pacientes que alcanzan concentraciones más elevadas de EFV tienen mayor riesgo de síntomas neuropsiquiátricos^{66,67}.

Las limitaciones del uso rutinario de niveles plasmáticos en la clínica diaria son múltiples, por una parte no existen estudios prospectivos que demuestren su utilidad en mejorar la eficacia y por otra, la ausencia de rangos terapéuticos asociados a respuesta terapéutica o la posibilidad de reducir reacciones adversas. Otra limitación es la no disponibilidad de la técnica en la mayoría de los laboratorios.

Recomendación sobre niveles de fármacos

- La medición de niveles podría ser de ayuda en el manejo de situaciones clínicas concretas (interacciones farmacológicas, TAR en trasplante de órgano, delgadez u obesidad mórbidas, insuficiencia hepática o renal) **(nivel C)**

2.4. Resistencia del VIH a fármacos antirretrovirales

La tasa de mutación espontánea de los retrovirus se estima en un nucleótido por cada 10^4 ó 10^5 nucleótidos y copia de la cadena del ARN⁶⁸⁻⁷⁰. Por otro lado, la vida media de los linfocitos CD4 infectados que replican activamente es de un día y se estima que la vida media del virus en plasma es de 6 horas⁷¹⁻⁷⁴. La conjunción de esta alta tasa de error de la transcriptasa inversa y de la rápida renovación de la población viral produce un cúmulo de gran cantidad de variantes virales, que reciben el nombre de cuasi

especies. El número de variantes genéticas distintas presentes en un momento dado en un individuo infectado se estima entre 5×10^5 y 5×10^{10} .

Las mutaciones que confieren resistencia pueden existir en estas cuasi especies, pero representan una proporción mínima de la población viral hasta que se ve sometida a la presión selectiva del TAR⁷³. Así pues, el tratamiento conllevará que las variantes resistentes se conviertan en población dominante al cabo de semanas o meses si no se suprime la replicación viral⁷⁵⁻⁷⁷.

No todas las mutaciones tienen la misma importancia. Para cada FAR existen unas llamadas “principales”, cuya presencia está estrechamente ligada a la aparición de resistencia y que reducen la eficiencia biológica del virus (*fitness*) y otras “secundarias” que, en menor medida, también contribuyen a la resistencia y que, en general, actúan modificando la capacidad replicativa viral.

Detección de resistencias del VIH a fármacos antirretrovirales

Las variantes resistentes pueden detectarse mediante técnicas genotípicas o fenotípicas⁷⁸. Las genotípicas detectan cambios específicos en los genomas de las enzimas diana de los fármacos (transcriptasa inversa, proteasa, integrasa, envuelta), mientras que las técnicas fenotípicas determinan la respuesta de la población viral mayoritaria a concentraciones crecientes de los distintos fármacos. Ambas comparten limitaciones como la dificultad de detección cuando la población mutada es <20% de la población viral o la CVP es <1000 copias/mL⁷⁸, aunque técnicas recientes van reduciendo ambas limitaciones. Las pruebas de resistencias deben realizarse durante el TAR⁷⁹ activo ya que la población viral resistente será sustituida por otra sensible a las pocas semanas de retirar los fármacos. Los resultados de estas pruebas se deben interpretar teniendo presente los estudios previos de resistencia, la historia terapéutica y la adherencia.

Las técnicas genotípicas y fenotípicas tienen ventajas y desventajas que las hacen complementarias entre sí⁷⁸. Las técnicas genotípicas son más sencillas, rápidas y accesibles para la mayor parte de laboratorios y permiten la detección de mutaciones centinela antes de que se detecten cambios de susceptibilidad en las pruebas fenotípicas. Su mayor limitación estriba en la dificultad de establecer una correlación genotípica-fenotípica y, sobre todo, en las dificultades de interpretación para algunos fármacos. Además, su aplicación en la práctica diaria requiere el conocimiento previo por parte del clínico de la influencia que tiene cada mutación detectada en la eficacia de cada fármaco. Las técnicas fenotípicas tienen la ventaja de informar del efecto neto de las distintas concentraciones sobre la sensibilidad real de la cepa predominante a los FAR, hayan sido utilizados o no. Existe una buena correlación entre las dos técnicas existentes en la actualidad, *Virologic Phenosense* y *Virco Antivirogram*⁸⁰. Sus mayores desventajas son el coste, la disponibilidad limitada y demora en la obtención de resultados. Para superar estas desventajas se ha desarrollado el fenotipo virtual⁸¹, obtenido a partir de una base de datos que tiene miles de muestras analizadas por ambas técnicas. Ante un determinado genotipo el sistema busca todos los genotipos coincidentes en la base de datos y calcula el fenotipo medio de estos pacientes. En una modificación posterior (*VircoType*®) se añade información de predicción de la respuesta: proporción de pacientes con respuesta máxima o reducida y ausencia de

respuesta (puntos de corte clínicos). Se ha demostrado que existe una buena correlación entre ambos métodos^{80, 81} sobre todo con los NN y menos con los AN. La correlación es bastante más deficiente en pacientes multitratados.

Numerosos trabajos han estudiado, en países desarrollados, la prevalencia de resistencias primarias en pacientes con infección aguda o crónica. Se sabe que la mayoría de las mutaciones puede detectarse durante años y que su prevalencia ha aumentado llegando a superar el 10%⁸²⁻⁸⁴. En España en un estudio multicéntrico de pacientes con infección reciente se encontró que el 14% de las cepas tenía mutaciones primarias⁸⁵, pero datos más recientes muestran una reducción de la prevalencia en los diagnósticos nuevos a 10%^{86, 87}. Y aún más recientemente la prevalencia de transmisión de mutaciones de resistencia en población no tratada en el periodo 2004-2008 en los nuevos diagnósticos de la cohorte prospectiva de adultos de la red de Sida (CoRIS) se ha estimado en el 8,4%⁸⁸. Por ello se debe realizar una prueba genotípica en el momento del diagnóstico. Un estudio coste-eficacia relativo a la ventaja de efectuar la prueba genotípica a todos los pacientes con infección crónica antes de iniciar el TAR, ha demostrado que la misma es coste-eficaz a la hora de preservar fármacos y que, por tanto, debería incluirse en la práctica habitual^{89, 90}. Se debería considerar repetir el genotipado antes de iniciar el TAR en caso de diferir éste por la posibilidad de haber sufrido una reinfección.

En España una de las actividades de la plataforma de resistencias de la Red de SIDA ha sido el establecimiento de una base de datos de secuencias de pacientes en fracaso virológico, atendidos en numerosos centros hospitalarios españoles. Expertos de esta plataforma han elaborado un algoritmo de interpretación, que se actualiza anualmente, y que permite la predicción de la resistencia "on line". Se puede acceder a dicho algoritmo a través de la página web de la Red de Investigación en SIDA.

Una de las principales limitaciones de los estudios de resistencias consiste en que, por el momento, no son capaces de detectar mutaciones que no representan más del 15-20% de la población viral. Aunque se han desarrollado algunas tecnologías (PCR alelo específica, secuenciación de genomas individuales, o secuenciación masiva de genomas únicos-UDS-) que permiten detectar mutaciones de resistencia en niveles de hasta el 0,1-1%, en la actualidad no están disponibles para su uso en rutina y no se conoce con precisión la utilidad de la detección de estas poblaciones minoritarias que se escapan al estudio genotípico convencional⁹¹⁻⁹⁸.

Significado clínico de las resistencias del VIH a fármacos antirretrovirales

Con el uso de la CVP en el seguimiento de los pacientes con infección por VIH se ha evidenciado la relación entre aparición de mutaciones de resistencias y fracaso virológico. Sin embargo este fenómeno no es homogéneo para todos los fármacos ya que es muy claro en los AN y NN pero existen datos contradictorios con los IP con los que se ha constatado fracaso virológico sin evidencia de resistencias⁹⁹. En este sentido se ha definido el fenómeno de resistencia celular ya que se han detectado la existencia de bombas de expulsión de los FAR en la membrana de los linfocitos y otras células. Se han descrito el MDRP-1 (glicoproteína-P) para los IP y la MDRP-4 para los AN¹⁰⁰. Se desconoce la relevancia clínica de estos hallazgos.

Los estudios prospectivos y aleatorizados que han utilizado las pruebas de resistencias para el manejo del fracaso virológico comparan la eficacia del cambio de TAR cuando se realiza según las distintas pruebas de resistencia (genotipo, fenotipo o fenotipo virtual) con o sin consejo de expertos o en función de la historia terapéutica previa y/o la experiencia clínica de los médicos¹⁰¹⁻¹⁰⁹. Un metaanálisis de los primeros estudios comunicados puso de manifiesto que el uso del genotipo para diseñar el TAR de rescate frente al estándar (historia terapéutica y experiencia del médico) se asociaba con un control virológico significativamente mayor a los 3 y 6 meses¹¹⁰. Estas diferencias no se observaron en los estudios que compararon los métodos fenotípicos frente al manejo estándar¹¹⁰. Por otro lado, no se han detectado diferencias cuando se han comparado el fenotipo virtual y el fenotipo real^{108, 109}. Se requieren pues más datos para aclarar el papel de las pruebas fenotípicas para guiar el TAR.

Recomendaciones sobre mutaciones de resistencia

- Se deben estudiar las mutaciones de resistencia ya que su conocimiento permite un mejor uso de los fármacos **(nivel A)**
- Se considera indicada la realización de las técnicas genotípicas de detección de resistencias en la práctica asistencial en las situaciones expuestas en la Tabla 2 **(Nivel B)**

2.5. Determinación del HLA B*5701

La reacción de hipersensibilidad (RHS) a ABC es un síndrome multiorgánico que se manifiesta con una combinación variable de fiebre, mialgias, síntomas respiratorios y gastrointestinales y un exantema de intensidad creciente, pudiendo ser fatal en caso de continuar con el fármaco o reintroducirlo. Suele aparecer durante las primeras 6 semanas de tratamiento, se presenta en el 5-8% de los pacientes que toman ABC y es la causa más frecuente de su discontinuación¹¹¹. Se sabe que la RHS es más frecuente en la población blanca y se dispone de una prueba cutánea (parche) para su confirmación.

Estudios farmacogenéticos han identificado que la RHS ocurre en las personas portadoras del alelo HLA B*5701. En un ensayo (PREDICT) en el que los pacientes se aleatorizaron a comenzar TAR con ABC o comenzar sólo si el HLA*5701 era negativo, se valoró la RHS por datos clínicos que se confirmaron con una prueba cutánea (confirmación inmunológica). La prevalencia del HLA B*5701 en esta cohorte era del 5,6%. La genotipificación del HLA B*5701 redujo la incidencia de sospecha clínica de RHS (3,4% frente 7,8%) y la inmunológica (0% frente a 2,7%) siendo el valor predictivo negativo de esta prueba del 100%¹¹². Se ha validado esta prueba en población negra confirmando los resultados¹¹³.

El ABC no debe utilizarse en personas portadores del alelo HLA B*5701. Si el HLA B*5701 es negativo no se descarta la posibilidad de RHS y debe informarse y controlar estos pacientes respecto a la RHS cuando se inicia tratamiento con ABC.

Recomendaciones sobre determinación del HLA B*5701

- Se deben determinar el HLA B*5701 a todos los pacientes en el momento del diagnóstico o cuando vayan a comenzar TAR con ABC (**Nivel A**)
- Si el HLA B*5701 es positivo no se debe prescribir ABC (**Nivel A**)
- Si el HLA B*5701 es negativo no se puede descartar completamente la RHS, por lo que se debe informar al paciente y vigilar su posible aparición (**Nivel A**)
- Si se prescribe ABC sin conocer el HLA B*5701, se debe informar al paciente y estar alerta para detectar síntomas de la RHS (**Nivel C**)

2.6. Determinación del tropismo del VIH

El VIH entra en la célula diana por un mecanismo que incluye el reconocimiento del receptor CD4, seguido de la unión a uno de los correceptores CCR5 o CXCR4 y a continuación se produce la fusión de las membranas con paso del ARN del VIH a la célula invadida. Los inhibidores del CCR5 (MVC, vicriviroc) son fármacos que bloquean este receptor impidiendo la entrada del VIH en la célula¹¹⁴.

Tras la infección por el VIH la mayoría de los pacientes albergan virus que usan el correceptor CCR5 (R5). Si no se inicia un tratamiento el virus evoluciona a cepas que, en mayor o menor proporción, utilizan el correceptor CXCR4 (X4), pudiendo encontrar igualmente cepas duales o mixtas (D/M) que pueden usar ambos correceptores. Este cambio se relaciona con un descenso de CD4 y aumento de la inmunodepresión ya que se consideran más patogénicas¹¹⁵. En los pacientes multitratados con CVP detectable las cepas X4 o D/M son más prevalentes, pudiendo llegar a superar el 50% en caso de CD4 <100 células/ μ L^{116, 117}.

Actualmente existe una técnica fenotípica para la detección del tropismo (Trofile™, Monogram Biosciences, USA) que se realiza en un solo centro (California, USA) y que llega a detectar la población X4 o D/M cuya proporción supere el 0.3% en una CVP \geq 1000 copias/mL (prueba ultrasensible)¹¹⁸. Este ensayo, presenta limitaciones técnicas y logísticas que dificultan su utilización en la práctica clínica. Los ensayos genotípicos (secuenciación de la región V3) se presentan como una alternativa más económica, rápida y factible de desarrollar en cualquier laboratorio especializado de VIH que cuente con tecnología para realizar estudios genotípicos. Los primeros estudios de correlación entre métodos genotípicos y Trofile™ mostraron, en general, una baja sensibilidad de los primeros para la detección de variantes X4-trópicas¹¹⁹. Posteriormente, la introducción de mejoras en la interpretación de algunos algoritmos genotípicos y de estrategias de combinación de los mismos¹¹⁹⁻¹²², ha conseguido mejorar notablemente la sensibilidad de estos para detectar variantes X4-trópicas en comparación con el ensayo de Trofile™. Recientemente, en un análisis retrospectivo de los ensayos clínicos con MVC MOTIVATE y MERIT en pacientes pretratados y sin tratamiento previo respectivamente, se ha demostrado que las herramientas genotípicas y el ensayo de Trofile™ son comparables en la predicción de respuesta virológica a MVC^{123, 124}. Estos datos ponen de manifiesto la viabilidad de la utilización de métodos genotípicos para la determinación del tropismo viral en la práctica clínica, aunque el método genotípico no está homologado. En Marzo 2010 un grupo de investigadores nacionales, con experiencia en la determinación de tropismo viral,

iniciaron una serie de reuniones que han culminado en la publicación de una revisión, en la que se detallan las recomendaciones que este grupo estima adecuadas para la determinación genotípica del tropismo en la práctica clínica¹²⁵. Este grupo, recomienda la determinación del tropismo del VIH en todos los pacientes que hayan fracasado a cualquier línea de tratamiento y vayan a iniciar un tratamiento de rescate. La información del tropismo (tropismo R5/tropismo X4) debe de estar disponible rutinariamente junto con el estudio de resistencias a todos los antiretrovirales con el fin de facilitar la selección del tratamiento de rescate más óptimo. En pacientes sin tratamiento previo sólo se recomienda valorar la determinación del tropismo cuando se va a iniciar el TAR en determinadas situaciones clínicas (resistencias primarias, toxicidad a fármacos de primera línea) en las que un fármaco antagonista del receptor CCR5 pueda considerarse una buena opción terapéutica. Entre las recomendaciones metodológicas se aconseja partir de un volumen de plasma $\geq 500 \mu\text{l}$, la realización de 3 RT-PCR o la realización de una única PCR si se incrementa posteriormente la sensibilidad de los algoritmos de interpretación. Geno2pheno y PSSM son considerados los algoritmos de interpretación más adecuados. En muestras con carga viral indetectable o inferior a 500 copias/mL, la determinación del tropismo viral se puede realizar a partir de ADN proviral. En subtipos no-B, la sensibilidad para detectar variantes X4-trópicas es menor que en subtipos B.

Recomendaciones sobre tropismo viral

- Se recomienda siempre la realización de una prueba de tropismo antes de iniciar el tratamiento con un fármaco que bloquee el receptor CCR5 (**nivel A**)
- Se recomienda la determinación del tropismo del VIH en todos los pacientes que hayan fracasado a cualquier línea de tratamiento y vayan a iniciar un tratamiento de rescate (**nivel A**)
- La información del tropismo (tropismo R5/tropismo X4) debe de estar disponible rutinariamente junto con el estudio de resistencias a todos los antiretrovirales con el fin de facilitar la selección del tratamiento de rescate más óptimo (**nivel A**)
- En pacientes sin tratamiento previo sólo se recomienda valorar la determinación del tropismo cuando se va a iniciar el TAR en determinadas situaciones clínicas (resistencias primarias, toxicidad a fármacos de primera línea) en las que un antagonista del receptor CCR5 pueda considerarse una buena opción terapéutica (**nivel C**)

3. INFECCIÓN AGUDA POR VIH

La primoinfección por el VIH es sintomática en más de la mitad de los casos, pero puede pasar desapercibida ya que sus síntomas son los de una virosis común¹²⁶⁻¹³⁰. El cuadro clínico es similar a la mononucleosis o a una meningoencefalitis viral¹³⁰. Los síntomas y signos más comunes son fiebre, adenopatías, mialgias, exantema, sudoración nocturna y artralgias¹³¹. Debe sospecharse en toda persona con síntomas

compatibles con o sin conducta de riesgo. Las determinaciones necesarias para el diagnóstico difieren de la infección crónica. Como en esta fase todavía no hay anticuerpos (período ventana) debe determinarse la CVP¹³² que se detecta a partir de la primera semana, precede a los síntomas y tiene una sensibilidad y especificidad del 100% y 97% respectivamente (debe ser una CVP alta ya que si es inferior a 10000 copias/mL puede ser un falso positivo). La CVP suele estar muy elevada ($>6 \log_{10}$) en la infección aguda y se relaciona con la intensidad de las manifestaciones clínicas. La seroconversión se detecta 1-2 semanas más tarde¹³¹. La técnica de *Western blot* con la que se confirma el diagnóstico puede ser negativa o indeterminada y deberá repetirse unas semanas después del comienzo de los síntomas para confirmar su positividad. El término infección aguda (diagnóstico antes de la seroconversión) no debe confundirse con infección reciente que es la que tiene menos de seis meses de evolución¹³⁰.

Desde la descripción de los primeros casos de infección aguda se sabe que la progresión a sida es más rápida en los pacientes sintomáticos. En estudios de cohortes que han analizado la historia natural de la infección VIH se ha evidenciado que la progresión a sida o muerte se asociaba a factores iniciales de la infección como la gravedad de la sintomatología en la infección aguda¹³³ (mayor riesgo a mayor número de síntomas), descenso inicial de CD4 (mayor riesgo si <500)¹³⁴, nivel de CVP a partir del 4º mes (mayor progresión si *setpoint* $>100\ 000$ copias/mL)¹³³, y al ADN proviral inicial (mayor progresión si es $>3,4 \log_{10}$ copias/millón de células mononucleares en sangre periférica)¹³⁴.

El TAR en la infección aguda puede tener ventajas e inconvenientes^{130, 135}. Las ventajas teóricas serían acortar la duración y gravedad de los síntomas, suprimir la replicación viral, reducir el riesgo de transmisión del VIH (muy elevado en la infección aguda)^{127, 136} reducir la diversidad viral y el número de células infectadas (reservorio) y preservar o restaurar el sistema inmunitario y la inmunidad específica frente al VIH, tanto proliferativa (mediada por los linfocitos CD4) como citotóxica (mediada por los linfocitos CD8+)^{126, 137-141}, lo que podría permitir el control inmunológico de la replicación viral, modificar la historia natural, disminuir el riesgo de progresión y mejorar el pronóstico de la infección por VIH. Por el contrario, las principales desventajas del TAR en la fase aguda son la exposición a los antirretrovirales sin un beneficio clínico demostrado, su duración indefinida (ya que con las pautas de TAR que hasta ahora se han utilizado no se erradica la infección¹²⁶, ni se restaura el tejido linfático asociado a mucosas¹⁴²), el riesgo de efectos secundarios y desarrollo de resistencias, la posible reducción de la calidad de vida y el tratamiento innecesario de los no progresores.

En la actualidad el inicio del TAR durante la infección aguda o reciente es controvertido^{143, 144} ya que su potencial beneficio a largo plazo es desconocido. La información disponible se ha obtenido de series pequeñas, generalmente sin grupo control, en países desarrollados, con pacientes infectados por el subtipo B y con pautas de TAR similares a las utilizadas en la infección crónica. No hay estudios publicados que hayan evaluado si otras pautas (TAR con inhibidores de la entrada y/o de la integrasa) pueden ser más efectivas en este escenario. Hasta ahora no se ha demostrado un beneficio clínico en términos de reducir la progresión a sida o muerte¹⁴³, aunque en

algún estudio se ha visto una mejor evolución inmunológica y virológica en pacientes tratados¹⁴⁵⁻¹⁴⁷.

En cualquier caso, si se decide iniciar TAR las pautas recomendadas son las mismas que en la infección crónica y la respuesta virológica a IP o NN similar^{146, 148-150}. Como en la infección crónica siempre debe efectuarse un test de resistencias, se vaya a iniciar TAR o no, por la posibilidad de transmisión de cepas resistentes. En pacientes con multirresistencia se debe realizar un tropismo viral porque se han descrito cepas con fenotipo dual (R5 y X4) y una rápida progresión a sida¹⁵¹⁻¹⁵³. Dado que la prevalencia de cepas con resistencia a NN es mayor que a IP en pacientes con infección aguda o reciente^{85, 154}, si se decide iniciar TAR y todavía no está disponible el resultado del estudio de resistencias es preferible comenzar con una pauta basada en IP. Se ha observado que la prevalencia de lipodistrofia y dislipemia y otros efectos adversos asociados al TAR es similar a la de los pacientes con infección crónica^{150, 155-157}.

Para evitar el TAR indefinido y conseguir los objetivos mencionados previamente se han planteado diversas estrategias^{130, 135}: 1) Administrar el TAR durante un periodo limitado de tiempo; 2) Administrarlo de forma intermitente, a fin de potenciar la respuesta VIH-específica y controlar la replicación viral sin FAR; 3) Combinar el TAR con inmunosupresores (hidroxiurea, ciclosporina A, ácido micofenólico) o citoquinas (IL-2); y, 4) Asociar TAR y vacunas terapéuticas. Sin embargo, ninguna de estas estrategias ha conseguido que el sistema inmune controle la replicación viral de forma sostenida en ausencia de TAR, por lo que en la actualidad si se inicia el tratamiento durante la infección aguda probablemente se deba mantener de forma indefinida.

La eficacia del TAR durante un periodo variable se ha evaluado principalmente en estudios de cohortes en los que se han comparado pacientes con infección aguda o reciente tratados frente a no tratados. Los resultados de la mayoría de estos estudios no han conseguido demostrar un beneficio clínico, virológico ni inmunológico a las 48-144 semanas de interrumpir el tratamiento, mientras que en otros, sólo una pequeña proporción de los pacientes tratados mostraban un *setpoint* de CVP más bajo, mejores cifras de CD4 o mantenían la respuesta inmunespecífica frente al VIH^{148, 158-170}. Habrá que esperar a los resultados de ensayos clínicos aleatorizados que están en marcha (estudio SPARTAC) para poder valorar adecuadamente los potenciales beneficios de esta estrategia terapéutica.

La administración de TAR intermitente con el fin de potenciar la respuesta VIH inmunespecífica para controlar la replicación viral no ha conseguido buenos resultados, siendo testimonial la proporción de pacientes que mantenía la respuesta inmune y el control de la replicación viral sin TAR a las 96 semanas^{141, 171, 172}. Además esta estrategia de interrupción estructurada no está exenta de la aparición de resistencias^{173, 174}.

La estrategia de asociar al TAR citoquinas como interferón-pegilado o IL-2, a fin de disminuir el reservorio viral y mejorar la respuesta inmunitaria¹⁷⁵⁻¹⁷⁷ tampoco ha conseguido sus objetivos. Se han efectuado estudios con interferón pegilado¹⁷⁸ o inmunosupresores (hidroxiurea, ciclosporina, ácido micofenólico) para reducir la activación del sistema inmune y controlar la replicación viral^{174, 179-182}. **Algunos de estos estudios solamente han podido demostrar mayor toxicidad sin aumentar la eficacia.**

Finalmente, las vacunas terapéuticas asociadas o no a TAR con el fin de restaurar o potenciar la respuesta inmunespecífica frente al VIH tampoco han mostrado mejores resultados. Se sabía que en modelos animales algunas vacunas habían sido satisfactorias^{183, 184}, pero los resultados de ensayos clínicos doble ciego en humanos han sido desalentadores¹⁸⁵⁻¹⁸⁷. Tanto el estudio QUEST¹⁸⁵ (TAR frente a TAR más vacuna ALVAC-HIV, y frente a TAR más vacuna ALVAC-HIV más Remune[®]) como en el ensayo clínico que comparó diferentes dosis de una vacuna que usaba el virus de la viruela aviar con los genes *gag/pol* del VIH insertados¹⁸⁶, como en el estudio ACTG A5187 (TAR frente a TAR más vacuna HIV DNA)¹⁸⁷, las respuestas virológica e inmunespecífica fueron similares al grupo placebo.

Recomendaciones sobre infección aguda

- En general, no se recomienda iniciar TAR en los pacientes con infección aguda o reciente (**nivel B**)^{130, 135}
- Se recomienda iniciar TAR en pacientes con primoinfección grave: infección sintomática con afectación neurológica (meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré, etc) o afectación grave de cualquier otro órgano o aparato (hepatitis, miopericarditis, trombocitopenia, etc), infección sintomática prolongada (más de 7 días de duración), infección sintomática con eventos clínicos definitorios de sida, inmunodepresión celular avanzada (linfocitos CD4 <200/ μ L (**nivel C**)¹⁵³
- Se debe considerar iniciar el tratamiento en los casos en los que exista un alto riesgo de transmisión del VIH (**nivel C**)¹³⁶
- Se debe efectuar siempre una prueba de resistencias al diagnóstico de la infección aguda, se vaya a iniciar TAR o no (**nivel B**)^{85, 151, 152}
- Si se decide iniciar TAR las pautas recomendadas son las mismas que en la infección crónica (**nivel C**)^{146, 148-150}. Si no se dispone del resultado del estudio de resistencias es preferible comenzar con una pauta basada en un IP/r (**nivel C**)^{85, 154}
- En los pacientes no tratados se recomienda evaluar los criterios de TAR a partir de los 6 meses, cuando ya la infección es crónica (**nivel A**)

4. TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL INICIAL

En los pacientes sin tratamiento previo, se debe valorar individualmente cuándo iniciar el TAR y qué combinación de fármacos utilizar, sopesando siempre las ventajas e inconvenientes de cada opción. La disposición y la motivación del paciente para iniciarlo es un factor crítico a la hora de tomar la decisión de empezar.

4.1. Cuándo iniciar el TAR

Se dispone de combinaciones de FAR que bloquean de forma duradera la replicación viral en plasma y tejido linfático permitiendo la restauración, al menos parcial, del sistema inmunológico^{6, 11, 188}. En ediciones previas de estas guías se hacía énfasis en la influencia en el balance riesgo/beneficio del TAR de la toxicidad a medio-largo plazo de los FAR, los problemas de adherencia, la aparición de resistencias, las interacciones

medicamentosas y el impacto en la calidad de vida⁸. Aunque todos estos factores siguen siendo muy importantes, es justo reconocer que el número de opciones terapéuticas, la eficacia, la seguridad y la simplicidad de las combinaciones de antirretrovirales han aumentado marcadamente durante los últimos cinco años¹⁸⁹. Además, debido fundamentalmente al uso de IP/r, el riesgo de desarrollo de multirresistencia ha disminuido considerablemente.

Gracias al TAR se ha reducido drásticamente el riesgo de progresión y muerte de los pacientes con infección por el VIH. A pesar de todos estos avances la esperanza de vida del paciente infectado por el VIH que recibe TAR está acortada con respecto a la de la población general^{190, 191}. Se ha comunicado que sólo los pacientes que han recibido TAR durante al menos 6 años y han alcanzado una cifra de CD4 >500 células/ μ L tienen una mortalidad similar a la población general¹⁹².

El aumento de la eficacia, seguridad y simplicidad del TAR junto con el reconocimiento de que aún existe margen de mejora en el aumento de la esperanza de vida del paciente infectado por VIH ha vuelto a plantear el debate sobre un inicio más temprano del TAR.

Evaluación del riesgo de progresión

La CVP y la cifra de linfocitos CD4 son marcadores independientes de progresión de la infección por el VIH^{193, 194}.

Existe evidencia, basada en ensayos clínicos y estudios observacionales, que apoya el inicio del TAR en pacientes con linfocitos CD4 <350 células/ μ L. Sin embargo, y a pesar de sus limitaciones, existen estudios de cohortes observacionales, de pacientes tratados o no, que pueden ayudar a la hora de decidir el inicio del TAR en personas con infección VIH asintomáticas.

El debate actual se centra en torno a si es necesario iniciar TAR con cifras de linfocitos CD4 superiores a 350 células/ μ L. Los datos que sustentan este debate provienen de cohortes de pacientes en las que se ha evaluado la mortalidad, la progresión a sida, la incidencia de enfermedades no definitorias de sida, la recuperación inmunológica y la toxicidad del tratamiento en función de la cifra de linfocitos CD4 previa al inicio del TAR. Los estudios de cohortes tienen importantes problemas metodológicos como el sesgo de prescripción que hacen que la calidad de la evidencia sea menor que la proveniente de ensayos clínicos aleatorizados.

Respuesta clínica (progresión a sida o muerte)

Hay datos muy limitados sobre la comparación de la mortalidad y/o progresión a sida en pacientes que empiezan TAR por encima o por debajo de 350 CD4/ μ L.

En un análisis conjunto de varias cohortes que incluyó más de 21000 pacientes, la progresión a sida o muerte fue significativamente mayor en los que iniciaban el TAR entre 251-350 CD4/ μ L (*HR*, 1,28, IC 95% entre 1,04 y 1,57) que los que lo empezaron entre 351-450. Igualmente en el primer grupo se observó una mayor mortalidad y aún

mayor diferencia cuando se analizaba conjuntamente sida o muerte (*HR* 1,13; IC 95% entre 0,80 y 1,60)⁹.

En la cohorte PISCIS de Cataluña y Baleares el riesgo de progresión a sida o muerte tras inicio de TAR fue significativamente menor en los pacientes que lo iniciaron con cifras de CD4 \geq 350 células/ μ L que en los que empezaron entre 200-350 CD4/ μ L (*HR* 1,85; IC 95%, 1,03 a 3,33), o $<$ 200 CD4/ μ L (*HR* 2,97; IC 95%, 1,91 a 4,63)¹⁰.

En un subanálisis de los pacientes con $>$ 350 CD4/ μ L del ensayo SMART que no estaban recibiendo TAR al inicio del estudio, los aleatorizados a demorar el TAR hasta alcanzar la cifra de 250 CD4 / μ L tuvieron mayor riesgo de enfermedades oportunistas y/o muerte por causas no directamente relacionadas con sida que quienes iniciaron TAR inmediatamente con cifras de CD4 \geq 350 células/ μ L¹⁹⁵.

Por último, en un análisis paralelo de 17.517 pacientes con infección por VIH asintomática en EE.UU y Canadá (estudio NA-ACCORD), se estratificaron dichos pacientes en función del recuento de linfocitos CD4 ($>$ 351 a 500 células/ μ L o $>$ 500 células/ μ L) en el momento de iniciar el tratamiento antirretroviral. En cada grupo se comparó el riesgo relativo de muerte de los pacientes que iniciaron tratamiento cuando el recuento de CD4 era superior a cualquiera de los dos puntos de corte (tratamiento precoz) con el de los pacientes que difirieron el tratamiento hasta que el recuento de CD4 cayó por debajo de dichos puntos de corte (tratamiento diferido). El primer análisis incluyó 8362 pacientes, 2084 (25%) que iniciaron tratamiento entre 351 y 500 células/ μ L y 6278 (75%) que difirieron el tratamiento. Tras ajuste por año de tratamiento, cohorte, y características clínicas y demográficas se halló un incremento del riesgo de muerte del 69% comparando el grupo de tratamiento precoz con el de tratamiento diferido (RR en el grupo de TAR diferido: 1,69; IC 95%, 1,26 a 2,26; $p <$ 0,001). En un segundo análisis con 9155 pacientes, 2220 (24%) iniciaron TAR precozmente ($>$ 500 células/ μ L) y 6935 (76%) difirieron el TAR. Se halló un incremento del riesgo relativo de muerte en el grupo de TAR diferido del 94% (RR 1,94; IC 95%, 1,37 a 2,79; $p <$ 0,001)¹⁹⁶.

Por último, en un ensayo clínico, controlado, aleatorizado, abierto, llevado a cabo en Haití se incluyeron 816 pacientes mayores de 18 años a iniciar TAR (AZT+3TC+EFV) entre 200 y 350 células CD4/ μ L o diferirlo hasta 2 semanas después del diagnóstico clínico de SIDA o que su recuento de CD4 descendiera por debajo de 200 células/mL. El estudio fue interrumpido prematuramente tras un análisis interino planeado que mostró 6 muertes en el grupo de 200 a 350 células/ μ L frente a 23 en el grupo de pacientes que difirieron TAR. Además, en el grupo de TAR diferido se diagnosticaron el doble de casos de tuberculosis que en el grupo de inicio inmediato¹⁹⁷.

En resumen, los estudios de cohorte sugieren que existe una relación progresiva entre la inmunodeficiencia y el riesgo de muerte y/o progresión a sida. Comparado con los pacientes que empiezan el TAR con $>$ 350 CD4/ μ L, el riesgo de progresión está claramente aumentado en los pacientes que lo empiezan por debajo.

Incidencia de enfermedades no relacionadas con el VIH

Recientemente los estudios de cohortes han puesto énfasis en el riesgo de aparición de enfermedades que hasta el momento no se habían considerado relacionadas con la inmunosupresión y por lo tanto no prevenibles con el empleo de TAR. Estas

enfermedades son de tipo cardiovascular (infarto de miocardio, ictus), afectación de órganos (insuficiencia renal, hepatopatía descompensada) y aparición de cánceres no definitorios de sida (todo tipo excepto sarcoma de Kaposi, linfoma no hodgkiniano y carcinoma cervical invasor).

Hay que resaltar que para los pacientes que empiezan TAR con más de 200 CD4/ μ L la incidencia de enfermedades no relacionadas con el VIH es tan frecuente como las definitorias de sida¹⁹⁸. Por lo tanto, es muy relevante investigar estrategias encaminadas a disminuir la incidencia de los dos tipos de complicaciones y no sólo de las relacionadas clásicamente con la inmunosupresión. El TAR podría ejercer un efecto beneficioso sobre las complicaciones no-sida mediante el control del estado pro inflamatorio y la activación inmune que se asocian a la replicación viral persistente.

En la cohorte D.A.D.¹⁹⁹ y en la cohorte CASCADE²⁰⁰ se ha comunicado que existe una disminución progresiva del riesgo de enfermedades no relacionadas con el VIH a medida que aumenta la cifra de células CD4. Los pacientes que presentan el menor riesgo de desarrollar enfermedades no definitorias de sida son los que mantienen una cifra de CD4 mayor de 350 células/ μ L.

En el ensayo clínico SMART²⁰¹ la incidencia de enfermedades no relacionadas con sida aumentó significativamente en el grupo de pacientes que suspendieron el TAR cuando la cifra de CD4 era menor de 350 células/ μ L. En el ensayo clínico FIRST¹⁹⁸ también se ha puesto de manifiesto una relación entre la cifra de CD4 y el riesgo de desarrollar enfermedades no definitorias de sida, siendo menor el riesgo en aquellos pacientes que mantuvieron la cifra de CD4 por encima de 350 células/ μ L.

Subgrupos de mayor riesgo de progresión

Varios estudios^{10, 202, 203} han demostrado que diversos subgrupos de pacientes tienen un mayor riesgo de mortalidad y/o progresión a sida independientemente de la cifra de CD4 antes de iniciar TAR. El uso de drogas por vía parenteral, la coinfección por virus de la hepatitis C, el sexo masculino y la edad avanzada se asocian a un mayor riesgo de progresión. Aunque no se ha establecido claramente un corte de edad a partir del cual sea más beneficioso iniciar TAR, los estudios de cohorte sugieren que el riesgo de progresión está aumentado por encima de los 55-60 años de edad²⁰⁴.

Se ha estudiado la relación de la proporción de CD4 al inicio del TAR en la supervivencia en un grupo de pacientes cuyos CD4 estaban entre 200 y 350 células/ μ L. La supervivencia era más corta si la proporción era <5% (*HR* 4,46) o entre 5-14% (*HR* 2,43) que si era \geq 15% ($p < 0,01$)²⁰⁵. Sin embargo, en la cohorte PISCIS la proporción de CD4 no fue un factor independiente asociado con el riesgo de progresión¹⁰.

Respuesta inmunológica

Hay datos contradictorios sobre si existe un límite en la reconstitución inmunológica de los pacientes que reciben TAR. La cohorte del Hospital Johns Hopkins y la cohorte ATHENA^{205, 206} con un seguimiento de hasta 7 años después del inicio de TAR sugieren que la posibilidad de alcanzar recuentos de CD4 normales depende del número inicial. En estas dos cohortes sólo los pacientes que iniciaron TAR con >350 CD4 se aproximaron a la normalización cuantitativa; sin embargo los datos de EuroSIDA²⁰⁷

sugieren que se puede normalizar el número de CD4, independientemente del nadir alcanzado, si la replicación viral persiste suprimida por debajo de 50 copias/mL de forma prolongada.

Toxicidad del TAR

Un argumento para diferir el TAR es evitar la toxicidad asociada al empleo de antirretrovirales. Hay pocos estudios actuales que hayan evaluado la incidencia de efectos adversos en función de la cifra de CD4 antes del inicio del TAR. Un estudio reciente sugiere que la incidencia de neuropatía periférica, anemia e insuficiencia renal no está aumentada en los pacientes que inician TAR con cifras de CD4 mayores de 350 células/ μL ²⁰⁸. De hecho la incidencia de neuropatía periférica, anemia, insuficiencia renal y lipodistrofia fue menor en los pacientes que iniciaron TAR por encima de 350 CD4/ μL que en quienes empezaron entre 200 y 350 CD4/ μL .

TAR para evitar la transmisión del VIH (parejas serodiscordantes)

Algunos expertos han sugerido que en parejas serodiscordantes que mantienen relaciones sexuales no protegidas, el tratamiento del miembro infectado a fin de controlar la replicación viral (carga viral indetectable) puede constituir una indicación de TAR. En un metaanálisis reciente que incluyó 5021 parejas heterosexuales y 461 eventos de transmisión, la tasa global de transmisión para pacientes en TAR fue de 0,46 (IC 95%, 0,19 a 1,09) por 100 pacientes-año. La tasa de transmisión desde un sujeto en TAR con CVP <400 copias/mL fue de 0 con un IC 97,5% superior de 1,27 por 100 personas-año, lo que equivale en estas parejas a un episodio de transmisión por 79 personas-año. Si el sujeto no tomaba TAR la tasa de transmisión era del 0,16 (IC 95%, 0,02 a 1,13) por 100 personas-año. No habían suficientes datos para estratificar el riesgo de transmisión en función de la presencia de ETS, uso de condón o coito vaginal o anal²⁰⁹.

Recomendaciones sobre inicio del TAR

- El inicio del TAR debe basarse en tres elementos: los síntomas, el número de CD4 y la CVP
- En caso de **infección sintomática** (eventos B o C) **se recomienda iniciar el TAR** en todos los casos (**nivel A**)
- Si la **infección es asintomática** el inicio del TAR se basa en el número de CD4, la CVP o en determinadas comorbilidades o características del paciente (Tabla 3):
 - Si linfocitos CD4 <350 células/ μL se recomienda el TAR (**nivel B**)
 - Si los linfocitos CD4 están entre 350 y 500 células/ μL se recomienda el TAR, aunque se puede diferir su inicio en determinadas situaciones, como la presencia de un recuento de CD4 estable, CVP baja o poca predisposición del paciente (**nivel B**)
 - Si el número de linfocitos CD4 es mayor de 500 células/ μL se recomienda diferir el TAR en general, Sin embargo debe ser considerado en los pacientes con

comorbilidades (cirrosis hepática, hepatitis crónica por virus C, hepatitis B con indicación de tratamiento, CVP $>10^5$ copias/mL, proporción de CD4 $<14\%$, edad >55 años, riesgo cardiovascular elevado y nefropatía VIH) **(nivel B)**

- En parejas serodiscordantes, debe valorarse cuidadosamente el inicio de TAR para disminuir la transmisión por vía heterosexual **(nivel B)**. En ningún caso ello debe suponer la abstención de otras medidas para impedir la transmisión del VIH

- A pesar de las consideraciones previas, el inicio del TAR debe valorarse siempre individualmente. Antes de tomar la decisión de iniciarlo deben confirmarse la cifra de CD4 y de CVP. Además, debe prepararse al paciente, ofertando las distintas opciones, adaptando el esquema terapéutico al estilo de vida, comorbilidades, posibles interacciones y valorando el riesgo de mala adherencia

4.2. ¿Qué combinación de antirretrovirales debe utilizarse?

El tratamiento de elección de la infección por VIH en el momento actual consiste en una combinación de al menos tres fármacos que incluyan dos AN y un IP/r o un NN (tabla 4). Con la mayoría de estas combinaciones se puede conseguir CVP <50 copias/mL en $>70\%$ de casos a las 48 semanas²¹⁰.

Criterios para la elección de las pautas antirretrovirales

Se consideran “pautas preferentes” las combinaciones avaladas por el mayor número de ensayos clínicos con eficacia y durabilidad óptimas, tolerancias aceptables y fáciles de usar. Otras pautas que han demostrado eficacia, pero con menor número de pacientes, menor duración de los estudios, mayor toxicidad o complejidad en su posología se han considerado “pautas alternativas”. Se dispone de múltiples pautas antirretrovirales de eficacia similar. En este contexto este comité quiere destacar la importancia creciente del coste-efectividad de los FAR para establecer las pautas preferentes.

Consideraciones sobre la elección de un NN, un IP/r o IInt

La elección de una u otra familia ofrece ciertas ventajas sobre otras: 1) Menos interacciones farmacocinéticas y mejor perfil metabólico con NN o IInt; 2) Mayor barrera genética de los IP/r para el desarrollo de resistencias; 3) Menor coste de los NN. El momento idóneo del uso de los NN es el primer tratamiento ya que en pautas de rescate tienen menos actividad que otros componentes del régimen.

La ventaja principal de los IInt es su favorable perfil de seguridad y sus desventajas son la menor experiencia y el precio.

Recomendación sobre combinaciones de FAR en tratamiento de inicio

- Pueden utilizarse la combinación de 2 AN+1 NN ó 2 AN+1 IP/r o **2 AN+IInt** como tratamiento de inicio (los fármacos preferentes se detallan más adelante). Una alternativa válida cuando no se pueden tomar IP o NN es combinar 3 AN (ZDV/3TC/ABC) o 2 AN+ MVC **(nivel A)** (Tabla 4)

4.3. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido

En España están comercializados 6 AN: zidovudina (ZDV), didanosina (ddl), estavudina (d4T), lamivudina (3TC), emtricitabina (FTC) y abacavir (ABC). También se dispone de un análogo de nucleótido, tenofovir (TDF). A efectos prácticos, la abreviatura AN incluye también al TDF en esta guía. Las principales características de los AN se describen en Tabla 5^{4, 211, 212}. Las combinaciones TDF+FTC, ABC+3TC y ddl+3TC pueden administrarse una vez al día; de ellas las dos primeras se presentan en un solo comprimido.

Ensayos clínicos que avalan las recomendaciones de uso de AN

Gilead 903

El estudio Gilead 903 comparó la eficacia y seguridad de TDF frente a d4T administrados en combinación con EFV y 3TC en pacientes sin TAR previo. Los 602 pacientes incluidos tenían una media de CD4 de 276-283 células/ μ L y de CVP de 4,91 \log_{10} copias/mL. En un análisis por intención de tratar, a las 144 semanas, la proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL era del 67,9% en el grupo de TDF y 62,5% en el de d4T. Entre los tratados con TDF fue menos frecuente tanto la toxicidad global relacionada con disfunción mitocondrial (6% frente a 28%) como la neuropatía periférica (3% frente a 10%) o lipodistrofia (3% frente al 19%). Asimismo, este grupo tuvo un mejor perfil lipídico. Por tanto, este estudio apoyó el uso de TDF + 3TC + EFV frente al d4T + 3TC + EFV como terapia de inicio²¹³.

Gilead 934

El estudio aleatorizado Gilead 934 comparó TDF+FTC QD frente a ZDV+ 3TC BID combinados con EFV. Se incluyeron 517 pacientes sin TAR previo con CVP basal de 5 \log_{10} y mediana de CD4 de 233-241 células/ μ L, según grupo de tratamiento. En el análisis por intención de tratar a las 48 semanas, se observó que la proporción de pacientes con CVP <400 copias/mL fue del 81% en el grupo de TDF+FTC y del 70% en el grupo de ZDV+3TC ($p=0,005$). La proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL fue de 77% frente a 68%, respectivamente ($p=0,034$). Los linfocitos CD4 aumentaron 190 células/ μ L en el grupo TDF+FTC frente a 158 células/ μ L en el de ZDV+3TC ($p= 0,002$). Hubo menos efectos adversos en el grupo de TDF+FTC (4% frente al 9%; $p = 0,016$) y menos suspensiones de tratamiento por reacciones adversas (4% frente a 9%; $p= 0,016$). El 6% de los pacientes tratados con ZDV+3TC tuvo anemia frente al 0% en los tratados con TDF+FTC. El incremento del colesterol fue más bajo y el volumen de grasa en extremidades más alto en el grupo de TDF+FTC (diferencias significativas)²¹⁴. A las 144 semanas de seguimiento la proporción de pacientes con CVP <400 copias/mL era de 75% en el grupo de TDF+FTC y 58% en el grupo de ZDV+3TC ($p=0,004$), pero sin diferencias en la CVP <50 copias/mL ($p=0,08$). En caso de fracaso virológico, la mutación M184V/I fue más frecuente en el grupo de ZDV+3TC²¹⁵. La respuesta inmunológica fue algo mejor en los tratados con TDF+FTC (312 frente a 271 células/ μ L; $p= 0,09$). Por otra parte, la cantidad de grasa en extremidades fue mayor en el grupo de TDF+FTC (7,9 frente a 5,4 kg, $p <0,001$)²¹⁶.

CNA30024

El estudio CNA30024 es un ensayo aleatorizado, doble ciego que compara la eficacia y tolerancia de ZDV frente a ABC (ambos BID) combinados con 3TC y EFV. Se incluyeron 649 pacientes sin TAR previo con una CVP basal media de 4,76-4,81 log₁₀ copias/mL y una media de linfocitos CD4 de 256-267 células/μL. En la semana 48, la eficacia virológica fue similar en ambos grupos. Alrededor del 70% alcanzaron una CVP <50 copias/mL (análisis por intención de tratar). Sin embargo, el incremento de CD4 fue significativamente superior en el grupo tratado con ABC (mediana, 205 frente a 155 células/μL). Un 8% de los pacientes que tomaron ABC desarrolló reacción de hipersensibilidad. Basándose en los resultados de este estudio se considera que ABC es equivalente a ZDV en eficacia antiviral, aunque debe tenerse en cuenta el riesgo de aparición de la reacción de hipersensibilidad²¹⁷.

CNA30021

El estudio CNA30021 es un ensayo aleatorizado que compara la eficacia del ABC QD frente a BID. Incluyó 770 pacientes sin TAR previo. Los pacientes recibieron ABC, 600 mg QD, o ABC, 300 mg BID, además de 3TC (300 mg QD) + EFV (600 mg QD). A las 48 semanas el porcentaje de pacientes que alcanzaron <50 copias/mL (análisis por intención de tratar) fue de 66% en la rama QD y de 68% en la rama BID. El estudio demostró la equivalencia de las dos pautas de administración de ABC. Las reacciones de hipersensibilidad a ABC (grado 3-4) fueron más frecuentes en la rama QD que en la BID (5% frente a 2%)²¹⁸.

ABCDE

El ABCDE es un ensayo clínico abierto que incluyó 237 pacientes aleatorizados a recibir ABC o d4T en combinación con 3TC + EFV. En la semana 96 la proporción de pacientes con CVP<50 copias/mL fue mayor en los tratados con ABC (60,9% frente a 47,5%, p = 0,05). El grupo tratado con d4T presentaba lipoatrofia clínicamente aparente (para médico y paciente) en el 38,3%, significativamente superior al 4,8% de los que recibieron ABC²¹⁹.

PREDICT

El ensayo clínico PREDICT ha demostrado que la incidencia de reacción de hipersensibilidad a ABC puede disminuir drásticamente mediante la genotipificación del HLA- B*5701¹¹². En este ensayo clínico la prueba de genotipificación del HLA- B*5701 tuvo un valor predictivo negativo del 100% para descartar la reacción de hipersensibilidad a ABC confirmada mediante prueba cutánea.

FTC 301-A

El FTC 301-A es un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego que compara la eficacia y tolerancia de FTC frente a d4T, ambos en combinación con ddl+EFV. Se incluyeron 571 pacientes sin terapia previa con una media de linfocitos CD4 de 312-324 células/μL y

una media de CVP de 4,8 log₁₀. A la semana 48, la proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL para los grupos de FTC y d4T fue de 74% y 58% (p<0,0001). El incremento de los linfocitos CD4 fue mayor en el grupo de FTC (168 frente a 134 células/μL; p<0,05). La proporción de pacientes que discontinuaron por efectos adversos fue mayor en el grupo de d4T+ddl (16,6 frente a 7,4%; p=0,0028). Los pacientes tratados con d4T+ddl tuvieron mayor incidencia de neuropatía periférica, diarrea y náuseas²²⁰.

Gesida 3903

El Gesida 3903 es un ensayo clínico aleatorizado y abierto que estudia la eficacia de la combinación ddl+3TC en pauta QD. En este ensayo se compararon ddl (400 mg QD o 250 mg si peso <60 Kg, tomado con o sin comida) + 3TC (300 mg QD) frente a ZDV/3TC (coformulados, 300/150mg BID) en 369 pacientes sin TAR previo. Todos los pacientes recibieron además EFV 600 mg QD. A las 48 semanas la proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL (análisis por intención de tratar) fue 70% en el grupo de ddl+3TC y 63% en el grupo de ZDV+3TC (diferencia 7,1%; IC 95%, 2,39 a 16,59%, p=0,154). El estudio demostró la no inferioridad de ddl+3TC frente a ZDV+3TC. La discontinuación del tratamiento por efectos adversos fue menor en el grupo de ddl+3TC (14, 8% frente a 26%, p=0,046), así como la toxicidad hematológica y la anemia (1% y 6%; p=0,003). No hubo diferencias en cuanto a la recuperación inmunológica, ni en la prevalencia de lipoatrofia y/o lipoacumulación, valorada por criterio del investigador²²¹.

ACTG-384

El ACTG-384 es un estudio que valora la eficacia y tolerancia de las distintas combinaciones de AN cuando se asocian a un tercer fármaco (NN o IP). Este ensayo clínico aleatorizado se plantea responder a tres preguntas: 1º) ¿es mejor empezar con ddl+d4T o ZDV+3TC como combinación de AN?; 2º) ¿Es mejor empezar con un IP (NFV) o un NN (EFV)?, 3º) ¿Es mejor utilizar combinaciones secuenciales de tres FAR o una combinación de cuatro? Se incluyeron 980 pacientes sin TAR previo con una mediana de linfocitos CD4 de 278 células/μL y una CVP basal de 4,9 log₁₀ copias/mL. Los brazos del estudio fueron: 1º) d4T + ddl + EFV → ZDV + 3TC + NFV; 2º) d4T + ddl + NFV → ZDV + 3TC + EFV; 3º) ZDV + 3TC + EFV → d4T + ddl + NFV; 4º) ZDV + 3TC + NFV → d4T + ddl + EFV; 5º) d4T + ddl + EFV + NFV; 6º) ZDV +3TC + EFV + NFV. El punto de valoración final primario fue el tiempo hasta el fracaso de dos regímenes secuenciales de tres FAR o el primer fracaso de regímenes de 4. La mediana de seguimiento fue de 2,3 años. Desafortunadamente el diseño factorial fue frustrado por el hecho de que las combinaciones de AN no fueron independientes del efecto del tercer fármaco. La actividad de EFV fue diferente cuando se combinó con ZDV + 3TC que con ddl + d4T, y la actividad de la combinación de ZDV + 3TC varió dependiendo si se combinaba inicialmente con EFV o NFV. Por estas razones el análisis factorial no se pudo realizar. Sin embargo, de los datos de este estudio se pueden hacer varias observaciones: 1º) En relación con el tiempo hasta el primer fracaso virológico, es significativamente mejor iniciar la terapia con ZDV + 3TC + EFV que con d4T + ddl + EFV o ZDV + 3TC + NFV. 2º) Si la terapia se inicia con ZDV + 3TC + EFV, no existe beneficio significativo al añadir NFV como cuarto fármaco; 3º) d4T + ddl producen más efectos tóxicos que ZDV

+ 3TC. Los resultados de este estudio avalarían la combinación de ZDV + 3TC + EFV como terapia de inicio^{222, 223}.

ACTG 5175

La combinación ZDV+ 3TC + EFV se ha comparado con TDF + FTC + EFV y con ddl + FTC + ATV (sin potenciar con ritonavir) en 1571 pacientes sin tratamiento previo en el ensayo clínico ACTG 5175²²⁴. Después de una mediana de seguimiento de 72 semanas, el comité de control y seguridad del estudio decidió suspender el grupo de tratamiento con ddl + FTC + ATV debido a una tasa significativamente mayor de fracaso terapéutico.

HEAT

La combinación ABC/3TC se ha comparado con la combinación TDF/FTC en 688 pacientes sin tratamiento previo en el estudio HEAT. Todos los pacientes recibieron además LPV/r cápsulas una vez al día. Los datos disponibles a 48 y 96 semanas²²⁵ avalan la no inferioridad de ABC/3TC frente a TDF/FTC cuando se administran junto a LPV/r una vez al día. Tras 96 semanas de seguimiento la proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL (intención de tratar) fue del 60% en el grupo de ABC/3TC y del 58% en el grupo de TDF/FTC. La tasa de fracaso virológico confirmado fue del 12% en el grupo de ABC y 11% en el grupo de TDF. Tampoco hubo diferencias significativas en el subgrupo de pacientes que iniciaron tratamiento con más de 100.000 copias/mL aunque el estudio no tiene poder para demostrar la no-inferioridad de ABC/3TC en pacientes con CVP elevadas.

ACTG 5202

El estudio ACTG 5202 es un ensayo clínico factorial que compara ABC/3TC y TDF/FTC en 1857 pacientes sin tratamiento previo (véase más detalles de este estudio en el capítulo de EFV frente a LP/r). Los pacientes fueron aleatorizados además a recibir ATV/r o EFV. En el subgrupo de pacientes que iniciaron el TAR con una CVP >100000 copias/mL el tiempo hasta el fracaso virológico fue más corto en los que recibieron ABC/3TC y el número de efectos adversos grado 3-4 fue mayor. Después de una mediana de seguimiento de 60 semanas, el porcentaje de pacientes con fracaso virológico fue del 14% en el grupo de ABC/3TC y del 7% en el grupo de TDF/FTC (P=0,0003). Si el paciente había alcanzado una CVP <50 copias/mL entonces no hubo diferencias en cuanto a fracaso posterior independientemente de la pareja de nucleósidos recibida²²⁶. Con posterioridad hemos conocido que en el estrato de CVP <100000 copias/mL, no hay diferencias entre ambos “combos” independientemente de que se administren con EFV o ATV/r²²⁷.

Metaanálisis que compara la base de nucleósidos ABC+3TC con TDF+FTC

En un reciente metaanálisis se analizaron datos de 12 ensayos clínicos en los que se utilizaron TDF/FTC (3399) o ABC/3TC (1769) en combinación con inhibidores de proteasa potenciados con ritonavir. En los ensayos que utilizaban LPV/r, ATV/r y

FAPV/r como tercer fármaco, la tasa de respuesta (por ITT, tiempo hasta la pérdida de respuesta virológica, ITT-TOLVR), fue significativamente inferior para ABC/3TC que para TDF/FTC (68,8% frente a 76,1%, $P = 0,0015$). En pacientes con carga viral basal inferior a 100.000 copias/mL la diferencia fue de 70,1% para ABC/3TC frente a 80,6%, para TDF/FTC $P = 0,0161$), mientras que en los que tenían una carga basal superior a 100.000 copias/mL, la diferencia fue *borderline* (67,5% frente a 71,5%, $P = 0,0523$)²²⁸.

Estudio ASSERT

El estudio ASSERT es un estudio multicéntrico, abierto, que comparó los perfiles de seguridad de TDF/FTC y ABC/3TC, ambos administrados con EFV en pacientes HLA-B*5701 negativos. Los cambios de filtrado glomerular fueron similares en ambas ramas, mientras que la excreción urinaria de beta-2-microglobulina y de proteína que se une al retinol fue significativamente mayor en la rama de TDF/FTC. Una mayor proporción de pacientes que recibían TDF/FTC (71%) comparado con los que recibían ABC/3TC (59%) alcanzaron una carga viral <50 copias/mL (diferencia 11,6%; IC 95%, 2,2 a 21,1)²²⁹.

Cohortes que avalan las recomendaciones de uso de AN

D.A.D.

En la cohorte D.A.D. se ha comunicado que el uso reciente (pero no el acumulado) de ABC (definido como estar recibiéndolo en el momento actual o haberlo suspendido durante los últimos 6 meses) se asoció con un incremento de 1,9 veces en el riesgo de padecer un infarto de miocardio (comparado con los pacientes que no han utilizado recientemente ABC). Esta asociación persistía después del ajuste por otros factores de riesgo. El riesgo de infarto de miocardio no aumentó en los pacientes que habían recibido ABC hacía más de 6 meses. El aumento del riesgo de infarto de miocardio fue más relevante desde el punto de vista clínico en aquellos pacientes que ya tienen un riesgo cardiovascular alto según la ecuación de Framingham. En este estudio también se encontró un incremento significativo del riesgo de infarto de miocardio asociado al uso reciente de ddl si bien la magnitud de la asociación fue menor²³⁰.

SMART

El estudio SMART, que también ha evaluado la asociación entre uso de ABC y riesgo de enfermedad cardiovascular en el grupo de pacientes aleatorizados a continuar la terapia antirretroviral se ha observado una asociación significativa entre estar recibiendo ABC y un incremento del riesgo de padecer infarto de miocardio (HR 4,3), siendo más evidente en los pacientes que ya tenían múltiples factores de riesgo o con alteraciones electrocardiográficas en el momento basal²³¹.

Otras Cohortes

En una revisión de múltiples ensayos de ABC (9639 pacientes, 7485 personas-año de seguimiento) no se ha encontrado una asociación entre uso de este AN y riesgo de infarto de miocardio²³².

Resumen de los datos de ensayos y cohortes

La pauta TDF+FTC es más eficaz y tiene menos riesgo de lipoatrofia que la combinación ZDV+3TC. La combinación ABC+3TC tiene una eficacia similar a ZDV+3TC con menor riesgo de lipoatrofia y ha demostrado la no inferioridad frente a la pauta TDF+3TC cuando ambas se administran con LPV/r. Es posible que el riesgo de fracaso virológico sea mayor con la pauta ABC+3TC que con la pauta TDF+3TC en pacientes con CVP elevadas cuando ABC+3TC se administra con efavirenz o ATV/r. No se han realizado grandes estudios de la combinación TDF+3TC con un IP como tratamiento inicial, pero sí de TDF+FTC (con ATV/r, FPV/r, LPV/r, DRV/r y SQV/r). No existe experiencia de ensayos clínicos de la combinación ABC+3TC con NVP, pero sí con ATV/r, LPV/r, FPV/r²³³⁻²³⁵.

La combinación ddl+3TC asociada a EFV no es inferior a ZDV+3TC+ EFV²²¹. No hay datos sobre el riesgo de lipoatrofia de la combinación ddl+3TC medida por DEXA. No existe experiencia de las combinaciones ddl+FTC con NVP ni con IP. La combinación d4T+3TC ha demostrado su eficacia en múltiples estudios, pero produce más alteraciones del metabolismo de los lípidos, lipodistrofia y neuropatía periférica que la combinación TDF+3TC.

Recomendaciones sobre AN

Combinaciones preferentes

- Las combinaciones de AN de elección para regímenes de inicio son TDF/FTC o ABC/3TC. Se recomienda el uso de nucleósidos coformulados **(nivel A)**
- ABC/3TC tiene mayor riesgo de fracaso virológico que TDF/FTC cuando se administra combinado con EFV **(nivel A)**
- ABC+3TC debe ser empleado con precaución en pacientes con CVP elevadas (>100.000 copias/mL) **(nivel A)**

Combinaciones alternativas

- Combinaciones de AN alternativas son TDF+3TC, ddl+3TC **(nivel A)** y ddl+FTC, aunque de esta última sólo existen datos de un ensayo clínico, por lo que su perfil de seguridad no está firmemente establecido
- Otras combinaciones alternativas son ZDV/3TC y ZDV+ddl^{214, 216}

Combinaciones no recomendadas

- No se recomiendan las combinaciones d4T+ddl por toxicidad, TDF+ddl por toxicidad y menor eficacia²³⁶⁻²⁴⁰, ZDV+d4T por antagonismo, FTC+3TC por similar perfil de resistencias y pocos beneficios clínicos (Tabla 4)

En resumen, la elección final de la combinación de AN deberá individualizarse teniendo en cuenta las características del fármaco, la situación clínica y preferencias del paciente. Las pautas sencillas facilitan la adherencia. Estas incluyen FAR que se administran una vez al día (ABC, ddl, FTC, 3TC y TDF) **con especial preferencia por las coformuladas en dosis fijas (TDF/FTC o ABC/3TC).**

Combinaciones de TAR con tres AN

Las combinaciones de 3 AN han demostrado eficacia virológica e inmunológica en varios estudios.

Existe una coformulación con la asociación ZDV+3TC+ABC que permite su administración en forma de un comprimido BID, pauta atractiva desde el punto de vista de la adherencia. Otros estudios comparan esta combinación con pautas que contienen IP o NN.

Ensayos que avalan las recomendaciones de uso de tres AN

ACTG A5095

El ACTG A5095 es un estudio aleatorizado y controlado con placebo que evalúa la eficacia y tolerancia de tres regímenes: 1º) ZDV/3TC/ABC (Trizivir®); 2º) ZDV/3TC+EFV; y 3º) ZDV/3TC/ABC+EFV en pacientes sin terapia previa. Se incluyeron 1.147 pacientes con una mediana de CD4 de 238 células/ μ L y CVP de 71434 copias/mL. Tras una mediana de seguimiento de 32 semanas, los pacientes tratados con ZDV/3TC/ABC tuvieron mayor fracaso virológico (21% frente al 11% en los otros grupos) y en un tiempo más corto ($p < 0,001$), independientemente del nivel de CVP. Dado que a las 48 semanas la proporción de pacientes con CVP < 200 copias/mL era del 74% en el grupo con 3 AN y 89% en los otros dos (análisis por intención de tratar) el comité de seguridad recomendó que el grupo de ZDV/3TC/ABC se interrumpiese, continuando el estudio de forma ciega con los pacientes en los brazos que contenían EFV²⁴¹. Estos resultados han hecho que se replantee el papel del ZDV/3TC/ABC en el tratamiento de inicio y se considere una alternativa a otras opciones más eficaces.

A los tres años de seguimiento, la pauta ZDV/3TC/ABC+EFV no demostró ser superior a la pauta ZDV/3TC+EFV. La proporción de pacientes con CVP < 200 y < 50 copias/mL en las dos ramas del estudio fue 90% y 92% ($p = 0,59$) y 85% y 88% ($p = 0,39$) respectivamente. El ensayo A5095 demostró que la adición de un tercer AN a un régimen que incluya 2 AN y EFV no incrementa la respuesta virológica²⁴².

CNA3005

El CNA3005 es un estudio controlado con placebo, doble ciego y de equivalencia que comparó ZDV/3TC+ABC frente a ZDV/3TC+IDV. La principal conclusión fue que ambos regímenes eran equivalentes para alcanzar CVP < 400 copias/mL, pero en los pacientes con CVP > 100.000 copias/mL, el régimen con ABC era inferior al de IDV para conseguir CVP inferior a 50 copias/mL²⁴³.

CLASS

El estudio CLASS comparó la eficacia virológica de una pauta basada en NN (EFV), frente a un IP/r (APV/r) o una pauta con tres AN (d4T), todos ellos combinados con ABC y 3TC. Los datos preliminares de la semana 48 (análisis por intención de tratamiento) mostraron la superioridad de la pauta de EFV frente a las otras (pacientes con CVP < 50 copias/mL 76%, 59% y 62%, respectivamente)²⁴⁴.

ESS30009

El estudio ESS30009 comparó la administración QD de 3 AN (TDF+3TC+ABC) frente a la combinación de ABC+3TC+EFV. Se observó una falta de respuesta virológica temprana (descenso de CVP $\geq 2 \log_{10}$ en la semana 8 o incremento de $1 \log_{10}$ sobre el nadir alcanzado) en el grupo de pacientes con 3 AN. Entre los pacientes que llegaron a la semana 12, se consideró no respondedores al 49% en el grupo de 3 AN y 5% en el grupo con EFV ($p < 0,001$). El análisis genotípico de los 14 aislados de los no respondedores (brazo con 3 AN) mostraron la mutación M184V y 8 de ellos tenían la K65R, que puede reducir la susceptibilidad a TDF y ABC²⁴⁵.

Otros

En un estudio piloto con ddl+3TC+TDF, el 91% de los pacientes tuvieron un fracaso virológico (descenso de la CVP $\leq 2 \log_{10}$ en la semana 12). La mutación M184I/V se detectó en el 95% de los pacientes y el 50% tenían también la K65R.

En otro estudio se comparó la eficacia y tolerancia de d4T+ddl+ABC frente a SQV+RTV (400/400mg BID)+ZDV+3TC frente a NFV+NVP+ZDV+3TC. Se incluyeron 180 pacientes, con una mediana de CD4 de 161 células/ μL y CVP de $5 \log_{10}$. A las 48 semanas, la proporción de pacientes con CVP < 20 copias/mL fue inferior en el grupo de tres AN (43%, 62% y 69%, respectivamente), los efectos secundarios fueron más frecuentes en este grupo²⁴⁶.

Además, en un estudio multicéntrico español no comparativo en el que se inició TAR a pacientes con 4 AN (Trizivir[®]+TDF) y seguido hasta la semana 96, la proporción de pacientes con CVP < 50 copias/mL era del 63% (ITT) y 87% (OT). Los resultados fueron mejores si la CVP era $< 5 \log_{10}$ o los CD4 > 250 células/ μL ²⁴⁷.

El estudio TIMS comparó en 113 pacientes la combinación de 4 AN (Trizivir[®]+TDF) frente a ZDV+3TC+EFV. Tras 48 semanas de seguimiento la proporción de pacientes con CVP < 50 copias/mL era del 67% (ITT) en el grupo de 4 AN y del 67% en el grupo de ZDV+ 3TC + EFV²⁴⁸.

Recomendaciones sobre combinaciones de 3 AN

- Un régimen con ZDV/3TC/ABC con o sin TDF debería ser usado solamente cuando no pueda usarse otra pauta más potente (**nivel A**)
- No se recomienda utilizar d4T+ddl+ABC (**nivel A**). El comité recomienda no utilizar en ningún momento pautas con 3 AN con ABC/3TC+TDF o ddl+3TC+TDF (**nivel A**)
- No deben usarse otras combinaciones de 3 AN en una pauta de TAR porque no existe experiencia

4.4. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (NN)

En España hay 3 NN comercializados: nevirapina, efavirenz y etravirina. Sus principales características se describen en la Tabla 6^{211, 212}. Son inductores de algunos isoenzimas del citocromo P450 pudiendo interactuar con otros fármacos. EFV se administra en

pauta QD (1 comprimido de 600 mg/día) y NVP se puede administrar tanto en pauta BID (200 mg/ 12 horas) o QD (400 mg/d); durante los primeros 14 días se administra 1 comprimido al día. ETR se administra en BID (200 mg/12 horas) o QD (400 mg/24 horas). **ETR no está aprobada por la EMA para tratamiento de inicio.**

Ensayos clínicos que avalan las recomendaciones de NVP

Pautas con NVP frente a pautas con IP

Combine

En el ensayo Combine se comparó la eficacia de NVP frente a NFV²⁴⁹. Es de destacar que el ensayo no tenía suficiente poder estadístico para evaluar la equivalencia entre ambas pautas. El número de pacientes incluidos con CVP elevada (>100000 copias/mL) fue bajo y no se observaron diferencias entre NVP y NFV. En una recopilación de diversos estudios con NVP en pacientes sin TAR previo el 83% de los que tenían CVP >100000 copias/mL tenían CVP indetectable a los 6 meses²⁵⁰.

ARTEN

En el ensayo ARTEN se comparó la eficacia y seguridad de NVP administrada una o dos veces al día frente a ATV/r, ambos combinados con TDF/FTC²⁵¹. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado, abierto y multicéntrico que incluyó 569 pacientes sin tratamiento previo. El fracaso virológico se definió por la presencia de CVP detectable (>50 copias/mL) a las 24 semanas del estudio y el margen de no inferioridad se estableció en -12%. La proporción de pacientes con carga viral basal >100.000 copias/mL fue superior al 60% en los tres grupos de tratamiento. A la semana 48, la proporción de pacientes con CVP indetectable fue del 65% y 67% para NVP y ATV/r respectivamente (IC 95%, -5,9% a 9,8%; p=0,63) en el análisis basado en el objetivo primario, mientras que en el análisis por TLVOR fue del 70% y 74% respectivamente (IC 95%, -10,4% a 4,5%; p=0,44)²⁵¹. En pacientes con >100.000 copias/mL de CVP basal, la proporción de indetectabilidad para NVP y ATV/r fueron del 60% y 52%, respectivamente.

OCTANE 1 y 2

Los estudios OCTANE comparan el tratamiento con NVP frente a LPV/r, ambas con TDF/FTC, en mujeres con CD4 <200 células/ μ L de varios países africanos. El objetivo era el tiempo desde la aleatorización hasta la muerte o fracaso virológico (definido como descenso de CVP <1 log en la semana 12 o CVP >400 copias/mL en la semana 24)

En el OCTANE 1 se aleatorizaron 234 mujeres que habían recibido al menos una dosis de NVP en los 6 meses previos para prevención de la transmisión madre-hijo. El estudio se interrumpió a las 66 semanas de seguimiento al documentarse que LPV/r era más eficaz que NVP y con menos efectos adversos²⁵².

El OCTANE 2 se designó para buscar equivalencia (definida como IC 95%, HR: 0,5 a 2,0) entre las dos ramas. Se aleatorizaron 500 mujeres (249 a NVP y 251 a LPV/r) que no habían tomado NVP. Las características basales eran similares. El seguimiento medio fue de 118 semanas. Se perdieron 14 mujeres de la rama de NVP y 6 de la de LPV/r. El objetivo del estudio lo consiguieron 42 (17%) mujeres de la rama de NVP y 50 (20%)

del LPV/r (HR 0,85; IC 95%, 0,56 a 1,29) cumpliendo criterios de equivalencia (análisis por ITT). Se analizaron por separado el fracaso virológico y la mortalidad (15% frente a 17% y 2% frente a 3%) de las ramas con NVP y LPV/r. Globalmente 93 mujeres discontinuaron el tratamiento (70 [28%] en la rama de NVP y 23 [9%] en la de LPV/r). Lo hicieron por efectos adversos relacionados con el fármaco 35 (14%) de las tratadas con NVP y ninguna de las de LPV/r²⁵³.

Ensayos clínicos que avalan las recomendaciones de EFV

Pautas con EFV frente a pautas con IP

ACTG 5202

El estudio 5202 es un estudio aleatorizado, ciego, que se diseñó para comparar en el tratamiento inicial un NN (EFV) con un IP/r (ATV/r) junto a uno de los dos AN coformulados (ABC/3TC o TDF/FTC). La hipótesis del estudio era, por una parte, comparar la equivalencia de ATV/r a EFV cuando se combinan con ABC/3TC o FTC/TDF y, por otra, comparar la equivalencia de ABC/3TC a FTC/TDF cuando se combinan con EFV o ATV/r. El objetivo del estudio era triple. Respecto a la eficacia, tiempo hasta el fracaso virológico; respecto a la seguridad, tiempo hasta la aparición de un efecto adverso tipo 3 ó 4; y respecto a la tolerancia, tiempo hasta la modificación del tratamiento al que se fue aleatorizado. Se aleatorizaron 1850 pacientes a cada uno de las cuatro ramas estratificando los pacientes por CVP (> ó < 100000 copias/mL).

El comité de seguimiento y seguridad del estudio en enero de 2008 modificó el estudio ante el hallazgo de mayor fracaso virológico en las ramas con ABC/3TC del estrato con CVP altas discontinuando estas ramas, no el resto del estudio²²⁶.

Los resultados finales, presentados en un congreso, mostraron que no hubo diferencia en cuanto a la eficacia entre ATV/r y EFV independientemente de los AN que les acompañaran. Entre los pacientes que fracasaron, el número de mutaciones de resistencia para AN y NN fue mayor en las ramas con EFV (no hubo mutaciones primarias a ATV). El incremento de CD4 fue algo mayor en los tratados con TDF/FTC. En cuanto a los análisis de seguridad y tolerancia, no hubo diferencia en los tratados con TDF/FTC, pero en el caso de ABC/3TC el tiempo hasta la modificación del tratamiento fue menor con ATV/r que con EFV. El incremento de los lípidos fue menor en la rama de TDF/FTC y en cuanto al aclaramiento de creatinina aumentó discretamente en todas las ramas, excepto en ATV/r+TDF/FTC en la que descendió discretamente²²⁷. Se han comunicado resultados de un subestudio metabólico (cambios en grasa y densidad mineral ósea) que se exponen en capítulos posteriores.

ACTG 5142

El estudio ACTG 5142 es un ensayo clínico aleatorizado cuyo objetivo era valorar la eficacia y tolerancia de tres regímenes de tratamiento: LPV/r+2 AN, EFV+2 AN y LPV/r+EFV. Se incluyeron 753 pacientes con una mediana de CD4 de 182 células/ μ L y CVP de 100.000 copias/mL. Los puntos finales de valoración fueron: 1º) Fracaso virológico: a) fracaso temprano: imposibilidad de reducir la CVP >1 log₁₀ o rebrote antes de la semana 32; y b) fracaso tardío: imposibilidad de suprimir la CVP por debajo de 200

copias/mL o rebrote después de la semana 32. 2º) Finalización del régimen: fracaso virológico o suspensión relacionada con la toxicidad. En la semana 96 la proporción de pacientes sin fracaso virológico fue de 67, 76 y 73% para los grupos de LPV/r+2 AN, EFV+2 AN y LPV/r+EFV respectivamente. En este corte, la proporción de pacientes con CVP <200 copias/mL (ITT) fue de 86, 93, 92 % para cada rama de tratamiento ($p=0,041$, LPV frente a EFV), y con CVP <50 copias/mL fue de 77, 89 y 83%, respectivamente ($p=0,003$; LPV frente a EFV). El incremento de linfocitos CD4 fue mayor en los brazos que contenían LPV/r frente al brazo de EFV ($p = 0,01$ frente EFV+2 AN. Los datos de resistencias indican que en caso de fracaso virológico, es más probable que aparezcan resistencias a dos clases de fármacos en el grupo de EFV+2 AN que en los grupos de LPV/r, mientras que hipertrigliceridemia fue más frecuente en los pacientes con LPV/r+EFV. En resumen, el estudio ACTG 5142, demuestra que tanto la eficacia virológica como el tiempo hasta el fracaso virológico son mejores con la pauta de EFV + 2 AN y el incremento de los linfocitos CD4 es mayor en los brazos con LPV/r²⁵⁴.

Estudio DMP-006

En el estudio DMP-006 se ha demostrado que EFV, combinado con ZDV y 3TC tiene una mayor eficacia virológica (48 y 144 semanas) que IDV+ZDV+3TC²⁵⁵.

ACTG 384

En el estudio ACTG 384 se demostró que la combinación de EFV+ZDV+3TC es más eficaz que un régimen con NFV+ZDV+3TC o NFV+ddi+d4T²²².

FOCUS

En el ensayo FOCUS se comparó una pauta con EFV frente a SQV/r (1600/100, QD) en 152 pacientes sin terapia previa. La pauta con EFV fue más eficaz en la semana 48 (CVP <50 copias/mL, 71 % frente a 51%) y presentó menos toxicidad²⁵⁶.

CLASS

En el ensayo clínico CLASS se comparó una pauta con EFV frente a otra con APV/r. La proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL fue del 94% en el primer grupo y del 73% en el segundo²⁴⁴.

BMS-034

En el estudio BMS AI424-034 se demostró que ATV (400 mg, QD) + ZDV + 3TC fue tan eficaz como EFV + ZDV + 3TC en pacientes sin tratamiento previo²⁵⁷. Sin embargo los resultados de este estudio son difíciles de interpretar por un error en la determinación de la CVP relacionado con el procesamiento y tipo de tubos empleados para el transporte de muestras.

Pautas con EFV frente a pautas con 3 AN

ACTG A5095

Como ya se ha comentado previamente, el estudio ACTG-A5095 demostró que las combinaciones de fármacos de 2 familias (EFV+ZDV/3TC o EFV+ZDV/3TC/ABC) son más eficaces que la combinación de 3 AN (ZDV/3TC/ABC)²⁴¹.

Pautas con EFV frente a pautas con NVP

Estudio 2NN

El estudio 2 NN²⁵⁸, ensayo clínico aleatorizado y abierto, comparó la eficacia y tolerancia de 4 pautas con EFV, NVP (400 mg QD), NVP (200 mg BID) y EFV+NVP, combinados todos con d4T+3TC. Se incluyeron 1216 pacientes con una mediana de CD4 de 190 células/ μ L y CVP de 4,7 \log_{10} copias/mL. Se consideró *fracaso de tratamiento* el fracaso virológico (descenso de CVP $<1 \log_{10}$ en la semana 12 o dos determinaciones de CVP >50 copias/mL a partir de la semana 24 o una CVP ≥ 50 copias/mL en la semana 48), la progresión clínica a estadio C o muerte y el cambio de tratamiento. En la semana 48, la proporción de pacientes con fracaso de tratamiento fue 43,6% en el grupo de NVP QD; 43,7% en el de NVP BID, 37,8% en el de EFV, y 53,1% en el de NVP+EFV. La diferencia de 5,9% (IC 95%, - 0,9 a 12,8) entre las ramas con NVP BID y EFV no fue significativa, por lo que no pudo demostrarse la equivalencia dentro de los límites del 10%. No hubo diferencias entre los grupos con NVP (QD o BID). El fracaso de tratamiento fue más frecuente en la rama NVP+EFV que en la de EFV (15,3%, $p=0,0003$), pero no hubo diferencias significativas respecto al grupo de NVP QD (9,5%; $p=0,05$). Tampoco hubo diferencias entre las distintas ramas con respecto a la proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL: 70% con NVP QD, 65% con NVP BID, 70% con EFV y 62,7% con EFV+NVP (ITT). En el subgrupo con CVP alta (>100000 copias/mL) el fracaso de tratamiento fue de 19,9% en la rama NVP QD, 15,8% en la de NVP BID, 8,2% en la de NVP+EFV y 5,9% en la de EFV ($p=0,004$). El incremento de linfocitos CD4 fue el mismo en las 4 ramas. Los efectos adversos fueron más frecuentes en el grupo de NVP+EFV y la toxicidad hepatoiliar fue más frecuente en el de NVP QD que en los otros. Se registraron 25 muertes de las que 2 se atribuyeron a NVP. Como conclusión de este estudio se puede decir que la eficacia fue similar en los tres brazos que contenían un NN. La eficacia de la combinación NVP + EFV es inferior a la que contiene solamente EFV.

A la hora de valorar los resultados de este estudio, debe tenerse en cuenta que en el diseño se especificó que sería clínicamente significativa una diferencia de fracaso terapéutico inferior al 10% entre las dos pautas (semana 48). Los resultados indicaron, sin embargo, que no podía descartarse una diferencia mayor ya que según el intervalo de confianza del 95% la eficacia de EFV sobre NVP puede superar el 10%. En un análisis de sensibilidad en el que sólo se incluyeron los pacientes que tomaron la medicación la proporción de pacientes con éxito terapéutico fue significativamente mayor en el grupo de EFV que en el de NVP BID.

Resumen sobre ensayos de NN

Se ha demostrado que pautas con EFV o NVP son más eficaces que pautas con 3 AN. Igualmente se ha demostrado que una pauta con EFV es más eficaz que con algunos IP (IDV, NFV, SQV/r, APV/r, LPV/r). ATV/r es no inferior a EFV. Sin embargo, no se ha demostrado en ningún ensayo clínico que NVP sea más eficaz que un IP pero sí no inferior a ATV/r. Por último, la comparación entre los dos NN no ha permitido obtener conclusiones definitivas.

Consideraciones sobre la elección de un régimen con NVP o EFV

- 1) EFV ha demostrado su eficacia en pacientes con CVP >100000 copias/mL o muy inmunodeprimidos (50-100 linfocitos CD4/ μ L)^{259, 260} y es capaz de suprimir la carga viral en tejido linfático de forma similar a regímenes con IP²⁶¹.
- 2) EFV está contraindicado en embarazadas (riesgo de teratogenicidad) y debería evitarse en mujeres que quieran quedarse embarazadas o que no utilicen métodos anticonceptivos seguros. EFV puede producir mareos, trastornos de la concentración y somnolencia, por lo que se deberá informar a los pacientes y recomendarles que, en presencia de estos síntomas, eviten tareas peligrosas como conducir o usar máquinas pesadas. Asimismo debería evitarse en pacientes con antecedentes psiquiátricos graves.
- 3) EFV está disponible para su uso en coformulación junto a TDF+FTC en un único comprimido de administración una vez al día
- 4) La NVP puede producir exantema cutáneo, con o sin fiebre y síntomas pseudogripales. Se han descrito eventos hepáticos graves e incluso fatales durante las primeras semanas de tratamiento, por lo que NVP debe administrarse con precaución en pacientes con hepatopatía crónica y transaminasas elevadas (contraindicada si las transaminasas están por encima de cinco veces el límite superior de la normalidad). Los eventos hepáticos son más frecuentes en el primer tratamiento de mujeres con CD4 >250 células/ μ L (11% frente a 0,9%) o de hombres con CD4 >400 células/ μ L (6,3% frente a 1,2%). En pacientes que reciben metadona debe tenerse especial cuidado ya que, tanto EFV como NVP, suelen inducir su metabolismo y producir síndrome de abstinencia.
- 5) La NVP ha demostrado no inferioridad con respecto a ATV/r, incluso con pacientes con CVP >100.000 copias/mL.
- 6) Existe muy escasa experiencia en cuanto a eficacia y tolerancia de la combinación ABC+3TC+NVP. Tanto ABC como NVP pueden presentar reacción de hipersensibilidad.

Recomendaciones sobre NN

- En general se recomienda EFV frente a NVP, por el mayor número de estudios y experiencia (**nivel C**)
- EFV está contraindicado durante el primer trimestre de la gestación. Se recomienda considerar otras opciones en mujeres que no utilicen métodos anticonceptivos eficaces. Así mismo, se debe evitar en pacientes que realicen

tareas peligrosas si presentan síntomas de somnolencia, mareos y/o trastornos de la concentración.

- Se desaconseja el uso de NVP en mujeres con recuento de CD4 >250 células/ μ L y en varones con recuento de CD4 >400 células/ μ L

4.5. Inhibidores de la proteasa

En España se han comercializado 9 IP: saquinavir (SQV), indinavir (IDV), ritonavir (RTV), nelfinavir (NFV), fosamprenavir (FPV), lopinavir (LPV), atazanavir (ATV), tipranavir (TPV) y darunavir (DRV). TPV/r está aprobado por la European Medicines Agency (EMA) solamente en pacientes pretratados. Sus principales características se muestran en la Tabla 7. Los IP son inductores e inhibidores del citocromo P450 y frecuentemente pueden originar interacciones farmacocinéticas. La elección final del IP se basará en datos de eficacia, tolerancia, interacciones, posología y farmacocinética. LPV/r se administra en comprimidos coformulados que no precisan refrigeración. Para el resto de IP/r se recomienda mantener las cápsulas de ritonavir refrigeradas (la ficha técnica informa que pueden permanecer hasta 30 días a temperatura no superior a 25°C).

Combinaciones de TAR que incluyan IP potenciados

Se entiende por IP potenciado la coadministración de un IP con dosis reducidas de RTV. El RTV tiene un potente efecto inhibidor del citocromo P450 que inhibe el metabolismo del segundo IP mejorando su perfil farmacocinético y el cociente C_{min}/Cl_{50} , reduciendo el riesgo de aparición de resistencias. Además al potenciar un IP se reduce el número de comprimidos, la frecuencia de dosis y las restricciones dietéticas lo que favorece la adherencia. La formulación de RTV disponible en España requiere condiciones especiales de conservación (nevera). Se ha aprobado la comercialización de RTV en una nueva presentación (comprimidos recubiertos con película) que no requiere las precauciones mencionadas. En la Tabla 7 están las combinaciones más importantes de IP y sus dosificaciones basadas en estudios farmacocinéticos.

Ensayos que avalan las recomendaciones de IP

Comparaciones entre IP

M98-863

El M98-863 es un ensayo aleatorizado, doble ciego, multicéntrico que comparó LPV/r (400/100 mg BID; n=326) frente a NFV (750 mg TID; n=327) junto a d4T+3TC. En la semana 60, se observó mejor respuesta virológica (ITT) en los pacientes tratados con LPV/r (CVP <50 copias/mL, 64% y 52%, respectivamente, p =0,001)²⁶².

Abbott 418

En el ensayo clínico Abbott 418 se evaluó la eficacia y tolerancia de LPV/r BID frente a LPV/r QD combinados con TDF y FTC. Se incluyeron 190 pacientes con una mediana de

CD4 de 214-232 células/ μ L y de CVP de 4,6-4,8 \log_{10} en cada grupo. A la semana 48 la proporción de pacientes (ITT) con CVP <50 copias/mL fue similar (70% y 64% según pauta, LPV/r QD o LPV/r BID)²⁶³.

KLEAN

El estudio KLEAN comparó FPV/r (700/100 mg BID) con LPV/r (300/100 mg BID, cápsulas) ambos con ABC/3TC coformulados, en 887 pacientes. En la semana 48 la proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL (ITT) fue 66% en el grupo de FPV/r y 65% en el de LPV/r, demostrando la no inferioridad de FPV/r frente a las cápsulas de LPV/r. No hubo diferencia significativa en cuanto a tolerancia digestiva (náuseas, vómitos, diarrea) ni alteraciones lipídicas²³³.

APV30001 - NEAT

En el estudio NEAT se evaluó la eficacia y tolerancia de FPV (1400 mg BID) frente a NFV, ambos en combinación con ABC y 3TC. Se aleatorizaron 166 pacientes a FPV y 83 a NFV. A las 48 semanas, la proporción de pacientes con CVP <400 copias/mL fue mayor en el grupo de FPV que en el de NFV (66% y 51%; ITT). En el grupo de CVP elevada (>100.000 copias/mL) la proporción fue de 67% y 35% respectivamente ($p < 0,05$)²⁶⁴.

APV30002 - SOLO

El SOLO es un ensayo clínico aleatorizado en el que compararon 322 pacientes tratados con FPV/r QD (1400/200 mg) con 327 pacientes con NFV, ambos asociados a ABC+3TC. La mediana de CD4 fue 170 células/ μ L y la CVP 4,8 \log_{10} . El 20% de los pacientes tenían <50 CD4/ μ L. A las 48 semanas no hubo diferencias (ITT) en la proporción de pacientes con CVP <400 copias/mL (69%, FPV/r frente 68%, NFV) ni con CVP <50 copias/mL (55 frente a 53%). Sin embargo, la proporción de pacientes que presentaron fallo virológico fue superior en la rama de NFV (17%) que en la de FPV/r (7%)²⁶⁵.

COL100758

El estudio COL100758 comparó FPV/r (1400/100 mg) y FPV/r (1400/200 mg) ambos QD junto con ABC/3TC coformulados. Se incluyeron 115 pacientes. A las 48 semanas la proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL (ITT) fue 79% (FPV/r 100 mg) y 63% (FPV/r 200 mg), $p = 0,061$. La adherencia fue mejor en el grupo de 100 mg de RTV²⁶⁶. En voluntarios sanos se ha demostrado que los niveles plasmáticos de FPV (1400 mg QD) no difieren si se potencia con 100 o 200 mg de RTV²⁶⁷.

ARTEMIS

El estudio ARTEMIS comparó DRV/r (800/100 mg, QD) frente a LPV/r (BID y QD) en 689 pacientes que recibieron además TDF/FTC coformulados. La dosificación de LPV/r fue variable: 77% recibieron el LPV/r BID, 15% QD y, además, el 7% cambió de BID a QD durante el estudio. El 15% recibió LPV/r en cápsulas, el 2% en comprimidos y el 83%

cambiaron de cápsulas a comprimidos durante el estudio. A las 48 semanas la proporción con CVP <50 copias/mL (ITT) fue 84% en el grupo de DRV/r y 78% en el de LPV/r (IC 95%, -0,3 a 11,2; p=0,062) demostrando la no inferioridad de DRV/r frente a LPV/r. Los pacientes tratados con DRV/r presentaron menos diarrea grado 2-4 que los tratados con LPV/r (4% frente 10%) y las elevaciones lipídicas fueron menores (triglicéridos y colesterol total)²⁶⁸. A las 96 semanas, un 79% de los pacientes en la rama de DRV/r y un 71% en la LPV/r tenían CVP <50 copias/mL confirmando no sólo la no inferioridad (diferencia estimada: 8,4%; IC 95%, 1,9 a 14,8; p <0,001), sino también la superioridad de DRV/r sobre LPV/r (ITT, P = 0,012). Dado que se trata de un objetivo secundario y de un estudio abierto, estas diferencias deben ser interpretadas con precaución. Un 4% de los pacientes de la rama de DRV/r y un 9% de los la rama de LPV/r abandonaron el tratamiento asignado²⁶⁹. A las 192 semanas, el 68,8% de los pacientes con DRV/r y el 57,2% de los tratados con LPV/r mostraron CVP <50 copias/mL corroborando la no inferioridad y superioridad del DRV/r. Se confirma así el buen perfil de tolerabilidad del DRV tras 4 años de tratamiento²⁷⁰.

GEMINI

El estudio GEMINI comparó SQV/r (1000/100 mg, BID) frente a LPV/r (300/100 mg BID, cápsulas) en 337 pacientes. Todos recibieron además TDF/FTC coformulados. A las 48 semanas la proporción con CVP <50 copias/mL (ITT) fue 64,7% en el grupo de SQV/r y de 63,5% en el grupo de LPV/r (IC 95%, -9,6 a -11,9). El estudio demostró no inferioridad de SQV/r frente a LPV/r. Las elevaciones lipídicas fueron similares con un incremento mayor de triglicéridos en el grupo de LPV/r y de C-LDL en el de SQV/r²⁷¹.

BMS-089

El estudio BMS 089 comparó ATV (400 mg QD) frente a ATV/r (300/100 mg, QD). Se incluyeron 200 pacientes que recibieron además d4T de liberación retardada (100 mg QD) y 3TC (300 mg QD). A las 48 semanas, la proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL (ITT) fue 75% (ATV/r) y 70% (ATV). En este estudio se demostró la no inferioridad de ATV/r frente a ATV sin potenciar. Las causas de fracaso terapéutico fueron diferentes en los dos brazos. Hubo más fracasos virológicos en la rama de ATV no potenciado (10 frente a 3; p: ns). Los que fracasaron en la rama de ATV/r no tuvieron mutaciones en el gen de la proteasa mientras que se detectaron en 3 de los 10 que fracasaron con ATV sin potenciar. También hubo más mutaciones a 3TC en el grupo no potenciado (7 de 10, frente a 1 de 3). Las suspensiones de tratamiento por hiperbilirrubinemia fueron más frecuentes con ATV/r. El estudio pone de manifiesto la mayor eficacia virológica y barrera genética de ATV/r²⁷².

Estudio 1182.33

El estudio 1182.33 intentó comparar dos dosis de TPV/r (500/100 BID y 500/200 BID) frente a LPV/r (400/100 BID). El comité de vigilancia decidió parar el estudio por mayor tasa de elevación asintomática de enzimas hepáticas en la rama de TPV/r 500/200 BID y por no alcanzar el criterio de no inferioridad a la semana 60 en la rama de TPV/r

500/100 BID. Debido a estos resultados no se recomienda el uso de TPV/r en terapias de inicio (Número de identificación en ClinicalTrials.gov NCT00144105)

Estudio 730

La combinación TDF+FTC+ LPV/r (comprimidos, BID) se ha comparado con la combinación TDF+FTC+LPV/r (comprimidos, QD) en 664 pacientes que recibían el primer tratamiento. Este ensayo clínico demuestra la no inferioridad de LPV/r comprimidos administrado una vez al día frente a LPV/r comprimidos administrados dos veces al día. La proporción de pacientes con cargas virales <50 copias/mL (ITT) fue del 77% en el grupo QD y del 76% en el grupo BID. Durante las primeras 8 semanas del estudio los pacientes en cada grupo fueron aleatorizados además a recibir las cápsulas o los comprimidos de LPV/r sin encontrar diferencias entre ambas presentaciones respecto a la incidencia de efectos adversos o a discontinuaciones por toxicidad²⁶³.

Estudio CASTLE

Este ensayo compara la combinación TDF+FTC+ATV/r QD con la combinación TDF+FTC+LPV/r (cápsulas) BID en 883 pacientes sin tratamiento previo, demostrando la no-inferioridad de ATV/r frente a LPV/r en su forma de cápsulas. La proporción de pacientes con cargas virales <50 copias/mL (ITT) fue de 78% en el grupo de ATV/r y de 76% en el grupo de LPV/r. ATV/r mostró mejor perfil lipídico (colesterol total, triglicéridos y colesterol no-HDL). La ictericia e hiperbilirrubinemia fueron más frecuentes en el grupo de ATV/r mientras que la diarrea y las náuseas lo fueron en el grupo de LPV/r²⁷³. A las 96 semanas, el 74% frente a 68% de los pacientes en las ramas de ATV/r y de LPV/r, respectivamente tenían una CVP <50 copias/mL (ITT, p <0,05), con lo que se confirmaba la no inferioridad de ATV/r con respecto a LPV/R. Los abandonos en ambas ramas fueron del 7%²⁷⁴.

Resumen sobre ensayos de IP en pacientes sin terapia previa

Los estudios han demostrado que la administración de un IP (LPV, SQV, FPV, ATV, DRV) potenciado tiene ventajas de eficacia y barrera genética respecto a los IP no potenciados y el principal inconveniente de la potenciación es el aumento de efectos adversos.

Recomendaciones sobre IP

- Como IP de primera elección se recomienda ATV/r QD, DRV/r QD, LPV/r BID o QD (**nivel A**). Los tres IP, que se han ordenado alfabéticamente, tienen una potencia antiviral similar y diferencias en tolerancia y perfil metabólico (**nivel A**)
- FPV/r o SAQ/r se pueden utilizar como pautas alternativas. Ambos fármacos están respaldados por un ensayo clínico comparativo con LPV/r y están aprobados por la EMA (**nivel A**)
- También se deben considerar alternativas otras dosificaciones de IP/r o IP no potenciados: ATV (200 mg BID), FPV/r (1400/200) QD o FPV/r (1400/100) QD. Estas dosificaciones carecen de ensayos clínicos con tamaño muestral adecuado que

valoren su eficacia frente a un IP de primera elección y no han sido aprobadas por la EMA

- La combinación ddi+FTC+ATV (no potenciado) no debe utilizarse en pacientes sin TAR previo por riesgo elevado de fracaso virológico **(nivel A)**
- NFV, IDV/r, TPV/r y RTV a dosis plenas no deben utilizarse en pacientes sin tratamiento previo **(nivel A)**

4.6. Inhibidores del correceptor CCR5

Los inhibidores del correceptor CCR5 actúan bloqueando la entrada de VIH en la célula diana. Estos fármacos son activos solamente si el virus tiene tropismo R5.

MVC es el inhibidor del correceptor CCR5 que ha sido aprobado para tratamientos en pacientes pretratados con tropismo R5 (Tabla 8).

Ensayo que avala la recomendación de inhibidores de CCR5

MERIT

El estudio MERIT es un ensayo que comparó MVC (300 mg, BID), con MVC (600 mg, QD) con EFV (600 mg, QD) en pacientes infectados por VIH R5-trópico y sin terapia previa. Los pacientes recibieron además ZDV+3TC. El grupo de MVC QD fue interrumpido a la semana 16 por no alcanzar el criterio virológico definido en el protocolo.

A las 48 semanas la proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL (ITT) fue 65,3% y 69,3% en el grupo de MVC y de EFV (límite inferior del IC 97,5%, -10,9%). La proporción con CVP <400 copias/mL (análisis por intención de tratar) fue 70,6 % y 73,1% en el grupo de MVC y de EFV (límite inferior del IC 97,5% ≤9,5%). El límite inferior del IC al 97,5%, de no inferioridad, que se estableció para este ensayo clínico fue de -10%. Por lo tanto el estudio demostró la no-inferioridad de MVC para el criterio de 400 copias/mL pero no para el de 50 copias/mL. La discontinuación del TAR por falta de eficacia fue más frecuente con MVC (11,9%) que con EFV (4,2%), pero por efectos adversos la discontinuación fue mayor con EFV (13,6%) que con MVC (4,2%). La recuperación inmunológica fue mayor con MVC (170 frente 144 células/ μ L)^{275, 276}. En un reanálisis post-hoc en el que se excluyeron 107 pacientes (15%), con virus no-R5 con un ensayo de tropismo más sensible, el límite inferior de no inferioridad al 97,5% para la diferencia entre tratamientos se situó por encima de -10% para cada objetivo²⁷⁶.

Recomendación sobre inhibidores correceptor CCR5

- Este comité considera que MVC sólo debe emplearse como tratamiento de inicio en pacientes con virus R5 trópico y cuando no sea posible un tratamiento con NN o con un IP. MVC no está aprobado por la EMA para su uso en pacientes sin tratamiento previo; la recomendación se basa en resultados del estudio MERIT

4.7. Inhibidores de la integrasa

Los inhibidores de la integrasa actúan alterando la integrasa viral que no pueden unir los extremos reactivos del ADN viral al ADN celular (Tabla 8).

Ensayo que avala la recomendación de inhibidores de la integrasa

STARTMRK

El estudio STARTMRK es un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico e internacional que compara EFV con RAL, ambos combinados con TDF/FTC en 566 pacientes sin TAR previo²⁷⁷. El objetivo primario de eficacia fue la consecución de una CVP <50 copias/mL a la semana 48. El margen de no inferioridad fue del 12%. El 53% de los pacientes tenían carga viral basal >100.000 copias/mL y un 47% un recuento de CD4 <200 células/ μ L. El objetivo primario del estudio se consiguió en un 86,1% de los pacientes del grupo de RAL y en el 81,9% del grupo de EFV (diferencia 4,2%; IC 95%, -1,9 a 10,3). El grupo de RAL tardó menos tiempo en alcanzar la indetectabilidad que el grupo de EFV ($p < 0,0001$). Los efectos adversos relacionados con los fármacos fueron más frecuentes en el grupo de EFV que en el de RAL ($p < 0,0001$)²⁷⁷.

Recomendación sobre inhibidores integrasa

- Este comité considera que RAL sólo debe emplearse como tratamiento de inicio cuando no sea posible un tratamiento con NN o IP (debido a su precio elevado)

4.8. Pautas libres de análogos de nucleósidos

La toxicidad inherente a los diversos AN ha llevado a la implementación de pautas que intenten ahorrar al paciente dicha toxicidad. Aunque en épocas anteriores, algunos ensayos como el DMP 006 incluyeron pautas de TAR que incluían sólo un IP potenciado con un NN, e incluso ensayos recientes como el ACTG 5142 han incluido una pauta de LPV/r+EFV. Dichas pautas presentaban una eficacia aceptable, pero en general se acompañaban de un exceso de toxicidad metabólica que las hacía desaconsejables. La aparición de los inhibidores de la integrasa, fármacos con una actividad metabólica prácticamente neutra, ha permitido retomar el diseño de pautas basadas en un IP/r+Int. Existen resultados preliminares de un estudio que ha evaluado la factibilidad de dicha combinación

Ensayo que avala la recomendación de pautas libres de AN

El estudio PROGRESS es un ensayo clínico, aleatorizado, multicéntrico e internacional que compara LPV/r+RAL con LPV/r+TDF/FTC en 206 pacientes sin TAR previo. El objetivo primario de eficacia fue la consecución de una CVP <50 copias/mL a la semana 48ª por ITT TLOVR. El margen de no inferioridad se estableció en el -20% y se estableció también que si se demostraba a ese respecto, se evaluaría la no inferioridad con respecto a un margen del -12%. El objetivo primario del estudio se consiguió en un 83,2% de los pacientes del grupo de LPV/r+RAL y en el 84,8% del grupo de LPV/r

(diferencia -1,6%; IC 95%, -12,0 a -8,8). El grupo con RAL tardó menos tiempo en alcanzar la indetectabilidad que el grupo con TDF/FTC ($p < 0,001$). Los efectos adversos relacionados con el TAR que obligaron a interrumpirlo fueron del 2,0% en la rama de LPV/r+RAL y del 1,9% en la de LPV/r+TDF/FTC²⁷⁸.

Recomendación sobre pautas libres de AN

- Este comité considera que las combinaciones de IP/r con IInt están en fase de estudio y por tanto, sólo debe considerarse en el tratamiento de inicio cuando no sea posible un tratamiento que incluya AN. RAL está aprobado por la EMA para tratamiento en pacientes sin tratamiento previo en combinación con AN. Este comité considera que a la combinación objeto de estudio debe aplicarse la misma restricción que a la de RAL con dos AN, en cuanto a su coste. Dicha limitación se basa de forma exclusiva en razones de coste/beneficio, pero no en razones de eficacia virológica o de seguridad.

4.9. Tratamiento antirretroviral en pacientes sin tratamiento previo con eventos C

Varios ensayos clínicos han estudiado el momento idóneo de iniciar el TAR en pacientes con infecciones oportunistas diagnósticas de sida. El ACTG A5164²⁷⁹ incluyó a pacientes con infecciones oportunistas diferentes de la tuberculosis y demostró que el TAR precoz (administrado antes de las 2 semanas del inicio del tratamiento del evento oportunista) redujo de forma significativa (49%) el riesgo de progresión clínica (nueva infección oportunista o muerte) con respecto a diferir el tratamiento antirretroviral (entre 30 y 270 días). Con respecto a la tuberculosis, se conocen los resultados de dos ensayos clínicos efectuados en África. El ensayo clínico SAPIT²⁸⁰ demostró que el TAR debe iniciarse durante el tratamiento de la tuberculosis, ya que los pacientes que lo iniciaron después de haberlo finalizado tuvieron una mayor mortalidad (12.1 frente a 5.4 muertes por 100 pacientes-año). El ensayo clínico CAMELIA²⁸¹ demostró en pacientes con tuberculosis que estaban muy inmunodeprimidos (mediana de linfocitos CD4 de 25 células/ μ L) que el TAR precoz (administrado antes de las 2 semanas del inicio del tratamiento de la tuberculosis) también redujo de forma significativa la mortalidad (8.3% frente a 13.8%) con respecto al inicio del TAR a partir de las 8 semanas de iniciado el tratamiento antituberculoso. En todos estos ensayos clínicos el TAR precoz se acompañó de una mayor incidencia del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune (SIRI) pero sin mortalidad. Estos excelentes resultados del TAR precoz en pacientes con infecciones oportunistas no se han podido confirmar en la meningitis tuberculosa y criptocócica. Dos ensayos clínicos efectuados respectivamente en Vietnam y en Uganda demostraron que el TAR precoz no redujo la mortalidad de la meningitis tuberculosa²⁸² y la aumentó en la meningitis criptocócica²⁸³. Se desconocen las causas, pero probablemente el peor manejo clínico de estas dos infecciones oportunistas en países pobres y el SIRI en un compartimento cerrado como el SNC podrían justificarlo.

Con respecto a las neoplasias asociadas al Sida (SK, linfoma y carcinoma de cérvix) el TAR debe iniciarse de forma precoz evitando en lo posible en los pacientes que reciban

quimioterapia la utilización de pautas con inhibidores de la proteasas debido a que aumentan su toxicidad.

Recomendaciones sobre TAR en pacientes con eventos tipo C

- En pacientes que se diagnostican con eventos C el TAR debe administrarse de forma precoz (en el primer mes e idealmente en las primeras dos semanas) (**nivel A**)
- Las excepciones son los pacientes con meningitis tuberculosa y criptocócica en los que se desconoce cuál es el mejor momento para iniciarlo y los pacientes con tuberculosis con cifras de CD4 mayores de 100 células/ μ L en los que ensayos clínicos que están en marcha indicarán si el TAR debe administrarse de forma precoz o puede diferirse a las 8 semanas, cuando se inicia la fase de mantenimiento de la tuberculosis.

5. MODIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

5.1. Fracaso del tratamiento antirretroviral

El fracaso del TAR se puede entender desde tres puntos de vista: virológico, inmunológico y clínico.

La incidencia de fracaso virológico, sus causas y el perfil de mutaciones de resistencia seleccionadas han cambiado desde el inicio de TAR paralelamente a los regímenes de TAR utilizados. Tras la introducción de los NN y los IP/r, y la sustitución de los AN timidínicos se ha reducido sustancialmente no solo la incidencia del fracaso al primer TAR sino también el tipo de mutaciones emergentes con reducción de las TAMs y las mutaciones en el gen de la proteasa¹⁸⁹. La toxicidad fue inicialmente la causa más frecuente de fracaso terapéutico por retirada del tratamiento. Con los regímenes usados actualmente se ha reducido drásticamente la frecuencia de fracaso terapéutico y las tasas de fracaso virológico (definido como >50 copias/mL) en primeras líneas de tratamiento están entre el 20-40%, aunque al menos en una cuarta parte de ellos no se consigue amplificar el estudio de resistencias genotípico debido a la presencia de cargas virales bajas (<500 copias/mL)^{254, 284}.

En la época moderna se recomienda el uso de pautas de gran eficacia, sencillas y con escasa toxicidad que combinan AN coformulados no timidínicos y NN, IP/r o RAL.

Los sucesivos fracasos terapéuticos con acumulación de mutaciones de resistencias frente a diferentes familias de fármacos antirretrovirales limitan las posibilidades de éxito del TAR, obligan al uso de regímenes más caros y complejos y se asocian con y mayor incidencia de sida y muerte²⁸⁵.

Factores que influyen en el fracaso terapéutico

Estos pueden clasificarse en 3 grupos según dependan del paciente, de los fármacos o del virus.

Entre los primeros, el más importante es la adherencia al tratamiento que es el mejor predictor de respuesta terapéutica²⁸⁶⁻²⁸⁸. Si se detecta un fracaso virológico sin mutaciones de resistencia debe valorarse la falta de adherencia como causa más

probable. La ausencia de mutaciones en este escenario, no excluye que puedan existir en poblaciones virales minoritarias no detectables por las pruebas de detección de resistencia genotípicas convencionales, especialmente frente a fármacos de baja barrera genética (3TC/FTC, NN de primera generación e inhibidores de la integrasa).

Entre los factores que dependen del fármaco se considera en primer lugar la potencia del régimen terapéutico, la falta de niveles en sangre por malabsorción o interacciones medicamentosas y los errores de dosificación.

Entre los factores que dependen del VIH, el más importante es la resistencia a los FAR que resulta de la interacción de la capacidad replicativa y diversidad del virus y la presión farmacológica. La resistencia a los FAR puede ser transmitida a otras personas, es variable según área o colectivo de pacientes estudiados y método empleado. Las cifras de infección reciente por virus resistentes varían entre en un 7,7 y 19,2 %^{289, 290}. Se estima que en nuestro medio entre 9-12 % las infecciones recientes por VIH tienen mutaciones de resistencia^{85, 88, 291-293}. Las mutaciones únicas que confieren con resistencia a NN, algunas de las que confieren resistencia a los inhibidores de la integrasa o determinadas mutaciones frente a AN comprometen la eficacia de los tratamientos de primera línea²⁹³. El uso de técnicas ultrasensibles que permiten detectar mutaciones de resistencia en variantes virales minoritarias no detectables con las técnicas convencionales (véase más adelante) podría explicar algunos de los fracasos virológicos en pacientes que inician un TAR potencialmente eficaz^{94, 95}. Dos estudios de cohortes han coincidido al describir que si se logra una CVP <50 copias/mL en el primer TAR, el rebrote de la CVP suele asociarse a mal cumplimiento o toxicidad y en muy escasas ocasiones puede atribuirse a falta de potencia, interacciones medicamentosas o problemas de absorción^{45, 294}.

El fenómeno de la inmigración obliga a valorar el origen de los pacientes con infección por VIH en situación de fracaso virológico. El uso de NVP en dosis única como profilaxis de transmisión materno-infantil, el TAR poco potente, la escasa monitorización o problemas de distribución y almacenaje de los fármacos explican el aumento de incidencia de fracaso virológico determinados países desfavorecidos²⁹⁵⁻²⁹⁷. Una elevada proporción de estos pacientes son portadores de VIH diferentes al subtipo B y por lo tanto con patrones de mutaciones de resistencia potencialmente distintos. Existe una mayor predisposición a seleccionar la mutación K65R en el subtipo C²⁹⁸ y en general hay menos experiencia con FAR en subtipos no B^{299, 300}. Por otra parte, algunos pacientes de origen subsahariano padecen infección por VIH-2 o infección dual por VIH-1 y VIH-2. EL VIH-2 desarrolla patrones diferentes de mutaciones tras exposición a AN³⁰¹.

Criterios de cambio de TAR por fracaso virológico

Las definición de fracaso virológico se ha indicado previamente (véase apartado 2.2). Ante un fracaso virológico es recomendable repetir la CVP para confirmarlo y cambiar el TAR lo antes posible para evitar el acúmulo de mutaciones y la elevación de la CVP, facilitando de este modo la respuesta al nuevo tratamiento.

Los “blips” son rebrotes o elevaciones transitorias de la CVP cerca del umbral de detección en pacientes en TAR y con CVP suprimida. En la mayoría de estudios los “blips” aislados no se asocian a mayor riesgo de fracaso^{44, 46, 47, 302, 303} aunque otros

estudios sí que han relacionado los “blips” con riesgo de fracaso virológico^{42, 49} e incluso se ha observado evolución genética y selección de resistencias en los “blips” frecuentes^{46, 302}. En un paciente con “blips” frecuentes debe evaluarse la potencia del TAR y la adherencia al tratamiento.

El fracaso inmunológico puede ir precedido de un fracaso virológico. Algunos pacientes con CVP indetectable presentan permanentemente un número bajo de CD con mayor riesgo de morbimortalidad secundaria a sida³⁰⁴ y otros procesos. Esta situación, conocida como discordancia inmunológica, no está relacionada con insuficiente potencia del TAR. En estos casos no existe ninguna prueba que demuestre que un cambio de tratamiento consiga una mayor recuperación de células CD4, por lo que no se recomienda cambiar el TAR, salvo cuando incluya combinaciones que se asocian a descenso de CD4 (p.e. ZDV o TDF + ddl).

El fracaso clínico en un paciente en TAR, es decir la aparición de eventos clínicos B o C, no siempre se asocia a fracaso virológico. Puede aparecer en los primeros meses de instauración del TAR en pacientes muy inmunodeprimidos, o relacionarse con fenómenos de restauración inmunológica pudiendo obligar a modificar el TAR³⁰⁵.

Objetivo del tratamiento tras un fracaso virológico

El objetivo terapéutico es conseguir de nuevo la supresión viral mantenida (<50 copias/mL). Para ello, se debe instaurar un nuevo régimen con tres fármacos plenamente activos siempre que esto sea posible. No hay ningún dato respecto a pautas con sólo dos fármacos activos en TAR de rescate, a pesar de que potencialmente podrían ser suficientes en algunos escenarios de rescate precoz con escasa resistencia y siempre que incluyan un IP/r activo. Cuando no pueda disponerse de 3 fármacos activos se contará con otros que conserven la mayor actividad residual (estudio de resistencias) y con la mejor tolerancia posible.

No se debe retrasar el cambio de tratamiento. A partir de datos de los estudios TORO se han establecido cuatro factores asociados a eficacia virológica del TAR de rescate: recuento de linfocitos CD4 ≥ 100 células/ μ L (OR 2,1; IC 95%, 1,5 a 3,1), CVP basal <5 log₁₀ (OR 1,8; IC 95%, 1,2 a 2,6), haber recibido ≤ 10 FAR (OR 2,4; IC 95%, 1,6 a 3,4) y disponer ≥ 2 fármacos activos en el nuevo TAR (OR 2,3; IC 95%, 1,6 a 3,3)³⁰⁶. En todos los estudios de rescate se han identificado como factores de mala respuesta, la CVP elevada (habitualmente definida como >100.000 copias/mL) y las cifras bajas de células CD4³⁰⁷⁻³¹⁶.

Para conseguir el objetivo de CVP indetectable pueden ser útiles algunas estrategias como:

- **Facilitar la adherencia al TAR.** La mala adherencia suele ser la causa de la mayoría de los fracasos virológicos. Antes de iniciar el TAR de rescate hay que identificar las causas de mala adherencia y se deben tomar medidas para corregirlas, pues en caso contrario se reproducirán tras el nuevo TAR de rescate. El nuevo tratamiento debe ser lo más cómodo y bien tolerado posible. En algunos grupos de pacientes con mala adherencia al TAR se debe procurar que el tratamiento sea directamente observado y basado en pautas QD^{317, 318}. Sin embargo, no hay datos que confirmen que la adherencia sea mejor con pautas de rescate QD que con pautas BID por lo

que nunca debe escogerse una pauta QD, si no es la óptima para esa situación de rescate, sólo para facilitar la adherencia.

- **Pruebas de resistencia.** La realización de una prueba de resistencia genotípica o fenotípica en cada fracaso, optimiza el nuevo tratamiento, aumenta su eficacia y mejora el pronóstico de los pacientes^{284, 319, 320}. Los resultados más útiles se obtienen si esta prueba se realiza mientras el paciente se encuentra con el tratamiento que ha fracasado. En España se usa habitualmente el genotipo. En su interpretación debe tenerse en cuenta que las mutaciones detectadas están presentes con seguridad. Sin embargo, las no detectadas pueden encontrarse en poblaciones minoritarias (menores al 15% de la población viral total) y pueden no detectarse en el genotipo poblacional. Cuanto más tiempo transcurra desde la suspensión del TAR y la realización del genotipo más fácil es que desaparezcan las mutaciones, especialmente las que causan mayor deterioro en la *fitness* viral. En aquellos casos en los que se disponga de estudios genotípicos previos es muy importante valorar la suma de todos los genotipos (genotipo acumulado), que ha demostrado mejorar la eficacia en la elección del nuevo régimen antirretroviral⁸⁸. En pacientes multitratados puede establecerse el Índice de Susceptibilidad Fenotípica/Genotípica -ISF/G- (número de fármacos activos según la prueba de resistencias genotípica o fenotípica) como predictor de respuesta al tratamiento³²¹. Existen ciertas discordancias según el sistema en el que se realiza la interpretación de resistencias lo que puede suponer una limitación en el uso del ISG en la práctica clínica. La concordancia mayor se observa en los NN (93%) y en los IP (84%), en cambio para los AN sólo es del 76%³²².
- **Tropismo.** Debe determinarse sistemáticamente el tropismo del VIH-1 en cada fracaso virológico, exceptuando los casos en que previamente ya se haya documentado la existencia de tropismo no R5. La determinación debe realizarse simultáneamente al genotipo estándar de la transcriptasa inversa, proteasa (e integrasa si procede).
- **Índice ponderado (score) de resistencia genotípica a IP.** La interpretación de las pruebas genotípicas a IP depende del número, tipo y patrón de mutaciones seleccionadas. En la actualidad se han desarrollado índices ponderados (scores) que definen la sensibilidad a determinados IP (ATV/r³²³, SQV/r³²⁴, LPV/r³²⁵, DRV/r³²⁶ y TPV/r³²⁷) y a la ETR (véase más adelante) basados en datos extraídos de estudios realizados en la vida real. Algunos algoritmos de interpretación, como el español de la RIS (véase más abajo) o el de REGA^a, ponderan el peso de las mutaciones para todos los antirretrovirales, incluidos los inhibidores de la integrasa. Estos scores marcan el “peso” de cada una de las mutaciones según el grado de resistencia (valores negativos) o de susceptibilidad o hipersusceptibilidad (valores positivos). Los scores puntúan cada una de las mutaciones y finalmente se obtiene un resultado de mayor o menor susceptibilidad al fármaco.
- **Cociente inhibitorio genotípico.** El cociente inhibitorio genotípico (CIG) es la razón entre las concentraciones plasmáticas del fármaco y el número de mutaciones relevantes en el gen de la proteasa. Se considera un marcador predictivo de

^a http://regaweb.med.kuleuven.be/software/reg_a_algorithm

respuesta a un IP a pesar de que todas las mutaciones cuentan por igual³²⁸⁻³³⁰. Otra aproximación es el coeficiente inhibitorio normalizado que calcula la relación entre las concentraciones mínimas plasmáticas del fármaco y el número de veces por encima de la IC₅₀ obtenido en el fenotipo viral³³¹.

- **Pruebas de resistencia genotípicas con mayor sensibilidad:** PCR alelo-específica, ensayo de ligación de oligonucleótidos, *Ultradeep-sequencing* o secuenciación de genomas individuales –SGI– (*Single genome sequencing analysis*). Son metodologías actualmente en investigación que permiten conocer el papel que juegan en el fracaso virológico las variantes virales minoritarias con mutaciones de resistencia (especialmente NN) y que están presentes antes del inicio del tratamiento pero que no son detectadas por los genotipos poblacionales convencionales^{96, 98}. Las técnicas basadas en PCR tienen la mayor sensibilidad teórica para detectar variantes minoritarias puntuales, pero presentan bastantes limitaciones. Las técnicas ultrasensibles basadas en la secuenciación aumentan la sensibilidad de detección de mutaciones minoritarias y, al disponer de secuencias completas independientes, permite establecer nítidamente su asociación, realizar estudios filogenéticos más completos y estudiar la evolución en el tiempo de las diferentes poblaciones. Está bien establecido actualmente que las mutaciones minoritarias condicionan la respuesta a un TAR basado en NN de primera generación (NVP o EFV). Esto es debido a que la presencia de una sola mutación produce resistencia de alto nivel al fármaco. Es la única situación en que hasta ahora se ha podido demostrar el impacto clínico de las mutaciones minoritarias^{91-98, 332}. Es de esperar que acabe confirmándose asimismo el impacto de las mutaciones minoritarias frente a otros fármacos de baja barrera genética, especialmente los inhibidores de la integrasa y 3TC/FTC. Asimismo, es posible que sean determinantes respecto a fármacos con mayor barrera genética, en aquellas situaciones en que, existiendo ya alguna mutación que comporte una resistencia de nivel bajo/intermedio, la detección de otras mutaciones (aunque por debajo del 15-20%) pueda comportar un incremento significativo de la resistencia, por ejemplo frente a ETR³³³. Contrariamente, la presencia de mutaciones minoritarias no tiene impacto en la respuesta a pautas basadas con IP/r en pacientes sin tratamiento previo³³⁴.
- **Monitorización plasmática de fármacos.** Poco útil en la actualidad en la optimización de un TAR de rescate debido a la existencia de datos clínicos muy sólidos con las pautas actuales de rescate, la variabilidad interindividual. En casos seleccionados, puede ayudar a optimizar el tratamiento mejorando así su eficacia (véase apartado de farmacocinética)^{317, 335, 336}.

5.1.1. Cambio de TAR tras fracaso precoz

Los ensayos clínicos aleatorizados que han evaluado la eficacia de diferentes combinaciones de FAR en tratamientos de segunda línea son escasos. El objetivo terapéutico es la resupresión de la CVP (CVP <50 copias/mL). Los cambios precoces evitan acúmulo de mutaciones y permiten secuenciar FAR incluso dentro de cada familia. Con los FAR actualmente disponibles resulta sencillo diseñar un TAR de rescate aunque siempre se debe contar con una prueba de resistencias y tropismo del VIH.

En el caso de pacientes que iniciaran el tratamiento con tres AN, la mutación más frecuente es la M184V²⁴¹ con TAMs si el esquema incluía AN timidínicos o la K65R (TDF) o L74V y Y115F (ABC) si el TAR incluía AN no timidínicos³³⁷⁻³³⁹.

Si el fracaso es con una pauta con 2AN y 1NN una única mutación (p.e. K103N) es capaz de generar resistencia de alto nivel a EFV y NVP³⁴⁰. El patrón de mutaciones es ligeramente distinto según la pauta incluyera NVP (Y181C, K103N, G190A, K101E, A98G) o EFV (K103N, L100I, Y188L, G190A, K101E)³⁴¹. El fracaso virológico se acompaña de otras mutaciones a AN (M184V, L74V o K65R) con una incidencia superior a lo que ocurre cuando el primer régimen está compuesto por 2 AN y 1 IP/r³⁴². Un cambio precoz evitaría la acumulación de mutaciones de resistencia que comprometiera la eficacia de los NN de nueva generación. En este escenario la utilización de ETR puede estar comprometida según el patrón de mutaciones seleccionado, especialmente si existen ≥ 3 mutaciones frente a NN (véase más adelante)³⁴³. Aunque ha existido debate sobre si los fracasos a NVP seleccionan mayor resistencia frente a ETR que los fracasos a EFV, en el análisis con mayor poder estadístico realizado sobre un estudio aleatorizado (estudios DUET, con 599 pacientes tratados) los fracasos previos a NVP no se asociaron con peor respuesta a ETR que los fracasos a EFV³⁰⁷.

El uso de IP/r en el primer TAR ha reducido significativamente el número de fracasos virológicos y la selección de mutaciones frente a los IP y los fármacos acompañantes. Todos los IP/r tienen una barrera genética elevada y, de hecho, sólo excepcionalmente aparecen mutaciones primarias o secundarias frente al IP en un primer fracaso virológico³⁴⁴. El desarrollo de resistencias en los IP es un proceso gradual que requiere el acúmulo de varias mutaciones en el gen de la proteasa⁷⁶. Existen mutaciones seleccionadas específicamente por un IP (no potenciado) que no presentan resistencias cruzadas (se consideran mutaciones específicas, *signature mutations*, de cada IP): D30N (NFV)¹⁰⁶, I47A y L76V (LPV)^{345, 346}, G48V (SQV)³⁴⁷, I50L (ATV)³⁴⁸ o I50V (FPV y DRV³⁴⁹) y alguna de ellas puede, por el contrario, producir hipersusceptibilidad a otros IP: la 47A confiere elevada resistencia fenotípica a LPV (>100 veces), resistencia cruzada con FPV e hipersusceptibilidad a SQV³⁴⁵; la 50L causa hipersusceptibilidad a todos los IP excepto ATV³⁵⁰, o la 50V causa resistencia a LPV, FPV y DRV e hipersusceptibilidad a TPV. La continua aparición de nuevas mutaciones obliga a consultar las bases de datos específicas con información actualizada sobre patrones de resistencia y su significado clínico (Los Álamos^b, Universidad de Stanford^c o la Plataforma de Resistencias de la RIS^d). El rescate de un tratamiento a dos AN más un IP/r debe realizarse con 3 fármacos activos que pueden incluir NN, AN, IP/r y otros de las nuevas familias. Si se pretende utilizar un IP, DRV/r ha demostrado ser más eficaz que LPV/r cuando existen mutaciones de resistencia frente a IP o no existen suficientes fármacos activos (ensayo TITAN, véase más adelante).

Con frecuencia, el fracaso virológico del primer tratamiento antirretroviral selecciona mutaciones de resistencia (M184V, K65R, L74V, etc.)³³⁷ que obliga utilizar otros AN (AZT o d4T) en los tratamientos de segunda línea que inducen toxicidad crónica y a menudo irreparable (toxicidad mitocondrial, lipoatrofia, resistencia insulínica y otras

^b http://resdb.lanl.gov/Resist_DB/default.htm

^c http://hivdb6.stanford.edu/asi/deployed/hiv_central.pl?program=hivdb&action=showMutationForm

^d http://www.retic-ris.net/default_principal.asp?idx=&idioma=2

alteraciones metabólicas). En la práctica clínica, lo usual es evitar el uso de estos análogos y utilizar fármacos de las nuevas familias en su lugar.

5.1.2. Cambio de TAR en el fracaso avanzado (TAR de rescate)

El tratamiento tras el fracaso de al menos dos líneas de TAR se ha denominado terapia de rescate **avanzado**. En esta situación la mayoría de los enfermos han experimentado fracaso con las tres familias de FAR más utilizados: AN, NN e IP. Sin embargo, en los estudios genotípicos, todavía existen algunos FAR que conservan actividad moderada o elevada frente al VIH.

Existen numerosos ensayos clínicos que han comparado diferentes tratamientos de rescate. En todos ellos se han utilizado IP/r o fármacos nuevos. Son estudios difícilmente comparables entre sí por la heterogeneidad de la población, tratamientos previos, criterios de eficacia, tiempo de seguimiento y tipo de terapia optimizada utilizada **dependiendo de los fármacos disponibles comercialmente en la época de realización del estudio**.

Inhibidores de la proteasa potenciados

Lopinavir/r

La experiencia de LPV/r en terapia de rescate se ha obtenido de los ensayos clínicos realizados por el resto de IP/r, que utilizan LPV/r como IP comparador (véase más adelante). **Tanto TPV/r como DRV/r han demostrado superioridad respecto a LPV/r en este escenario.**

Fosamprenavir

CONTEXT

El CONTEXT es un ensayo clínico aleatorizado y abierto de fase III que comparó la eficacia de FPV/r frente a LPV/r ambos con 2 AN en pacientes tratados previamente con 1 ó 2 IP. Se incluyeron 300 pacientes que se asignaron a recibir FPV/r 1400/200 mg, QD, FPV/r 700/100 mg, BID o LPV/r BID (400/100 mg, BID). Los resultados mostraron que FPV/r QD era inferior a LPV/r y no se pudo demostrar la no-inferioridad de FPV/r BID frente a LPV/r. La proporción de pacientes con CVP <400 y <50 copias/mL a las 48 semanas fue 50% y 37% para FPV/r QD, 58% y 46% para FPV/r BID y 61% y 50% para LPV/r³⁵¹. **FPV/r no es un fármaco de elección en TAR de rescate.**

Saquinavir

MaxCmin2

El estudio MaxCmin2 evaluó la eficacia de SQV/r (1000/100mg, BID) frente a LPV/r (400/100 mg, BID) en un estudio abierto y aleatorizado que incluyó 339 pacientes. A las 48 semanas (ITT, interrupción = fracaso) el 25% de los tratados con LPV/r y el 39% de los tratados con SQV/r presentaron fracaso terapéutico definido como CVP \geq 200 copias/mL en cualquier momento del estudio ($p=0,005$). El tiempo hasta el fracaso fue similar con ambas pautas ($p=0,27$)³⁵². En este estudio se utilizaron cápsulas duras con

200 mg de SQV y la adherencia, los efectos adversos y el diseño abierto probablemente resultaron negativos para el brazo con SQV/r. **SQV/r no es un fármaco de elección en TAR de rescate.**

Atazanavir

AI424 045

El estudio AI424 045 comparó ATV/r, frente a ATV más SQV y frente a LPV/r en pacientes en fracaso virológico. Se requería CVP >1000 copias/mL, que hubieran llevado al menos 2 regímenes previos y experiencia con algún fármaco de las tres clases (AN, NN e IP). Todos los pacientes recibieron además TDF y otro AN. A la semana 24 se demostró que la eficacia del brazo que combinaba ATV y SQV era inferior a LPV/r, por lo que se dio opción de cambiar el tratamiento. Tanto a las 24 como a 48 semanas, ATV/r resultó no inferior a LPV/r respecto al criterio de valoración primario (reducción de CVP) y la consecución de CVP <50 ó <400 copias/mL. Sin embargo, la proporción de pacientes con CVP <50 copias fue 38% en el grupo de ATV/r frente a 45% en el de LPV/r³⁵³. A las 96 semanas el criterio de valoración primario demostró una eficacia similar de ATV/r (-2,29 log₁₀) frente a LPV/r (-2,08 log₁₀). En los pacientes en tratamiento, la proporción con CVP indetectable fue similar en ambos brazos, pero el estudio carece de poder estadístico para demostrar diferencias para este objetivo secundario. En un subestudio³⁵⁴ que analizó la respuesta virológica a las 48 semanas según la presencia de mutaciones en las posiciones D30, V32, M36, M46, I47, G48, I50, F53, I54, A71, G73, V77, V82, I84, N88 y L90, la respuesta fue similar si había ≤4 mutaciones. Sin embargo cuando el número era ≥ 5, ningún paciente (0/9) del grupo de ATV/r y 5/18 (28%) de los de LPV/r lograron indetectabilidad. Por otra parte se identificaron mutaciones asociadas a resistencia a ambos fármacos. Las mutaciones en las posiciones M46, I54, I84, o L90 reducen la eficacia de ATV/r a menos de un 30%, al igual que las posiciones M46, I54 o I84 en LPV/r.

ATV/r no parece ser un buen fármaco en pacientes con experiencia a múltiples fármacos y mutaciones acumuladas a IP.

Tipranavir

RESIST 1 y 2

Los estudios RESIST son estudios fase III en los que se comparó TPV/r con otro IP/r elegido por cada investigador (IP/rC). Los criterios de inclusión exigían llevar una pauta con IP, estar en fracaso virológico (CVP >1000 copias/mL) y en el estudio genotípico debía haber ≥1 mutaciones primarias en los codones 30, 46, 48, 50, 82, 84 o 90, y ≤2 en los codones 33, 82, 84 ó 90. Los pacientes fueron aleatorizados a TPV/r o un IP/r comparador (IP/rC). A todos los pacientes se les administró un tratamiento optimizado que **sólo podía incluir ENF en cuanto a nuevos fármacos**. Los pacientes partían de CVP elevadas (mediana de 4,8 log₁₀ copias/mL) y CD4 bajos (mediana <200 células/μL). En el RESIST-1 la mayoría de los pacientes del IP/rC recibieron LPV/r (61%), mientras que en el RESIST-2 los más usados fueron APV/r (40%) y LPV/r (38%). La ENF se indicó en el 36% del RESIST-1 y el 12% del RESIST-2 (había pacientes tratados previamente con este fármaco)³¹⁰.

Los resultados conjuntos de ambos estudios a las 48 semanas mostraron una proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL del 22,8% y 10,2% con TPV/r y con IP/rC respectivamente. El uso de ENF mejoró los resultados en ambos brazos, alcanzando el 52% (<400 copias/mL) y 35,8% (50 copias/mL) en el brazo del TPV/r³¹⁰.

Mutaciones de resistencia a TPV

Se han identificado 19 mutaciones en 14 posiciones de aminoácidos (L10V, L24I, M36I, K43T, M46L, I47V, I50L/V, I54A/L/M/V, I54L, Q58E, T74P, L76V, V82L/T, N83D, y I84V) asociadas a resistencia a TPV. Según el peso en la respuesta al tratamiento con TPV (favorezcan la respuesta, tengan impacto reducido o gran impacto en la resistencia) se les ha dado un valor en el score actualizado (L10V, 1; L24I, -2; M36I, 2; K43T, 2; M46L, 1; I47V, 6; I50L/V, -4; I54A/M/V, 3; I54L, -7; Q58E, 5; T74P, 6; L76V, -2; V82L/T, 5; N83D, 4; y I84V, 2). En la elaboración de este score se ha tenido en cuenta la eficacia de la medicación que acompañaba al TPV. Cuando el score era ≤ 3 la respuesta en las semanas 8 y 48 es máxima y mínima si el score es >10. La proporción de pacientes que respondían aumentaba cuanto mayor era la eficacia del régimen acompañante³⁵⁵.

Darunavir

Este IP presenta una alta afinidad por la proteasa y es muy potente *in vitro* e *in vivo* frente a la cepa salvaje y mutantes con resistencias a múltiples FAR incluyendo IP^{356, 357}.

POWER 1 y 2

Los ensayos POWER compararon la eficacia y tolerancia de diferentes dosis de DRV/r (fase II) frente a un IP/r comparador (IP/rC) asociados ambos a una selección optimizada de fármacos. Los pacientes incluidos tenían CVP >1000 copias/mL, habían sido tratados previamente con fármacos de las tres familias y tenían ≥ 1 mutaciones primarias a IP. La aleatorización se estratificó por el número de mutaciones, la CVP y el uso de ENF. A las 24 semanas, la dosis de DRV/r se unificó a 600/100 mg BID. En el análisis combinado de ambos estudios, a las 48 semanas, se incluyeron solamente los pacientes que recibieron la dosis de DRV/r de 600/100 mg BID desde el principio (n=131) frente al grupo control (n=120). La variable principal de eficacia fue la respuesta virológica confirmada (reducción de la CVP $\geq 1 \log_{10}$ copias/mL y tiempo hasta la pérdida de respuesta virológica, TLOVR). En cuanto a eficacia, la reducción de la CVP se alcanzó en 61% de los pacientes del grupo de DRV/r y en 15% del grupo comparador (diferencia 46%; IC 95%, 35 a 57; p<0,0001). La proporción con CVP <50 copias/mL (ITT-TLOVR) fue 45% en los tratados con DRV/r y 10% en el grupo control. La eficacia superior de DRV/r frente al IP/r comparador se mantuvo independientemente del uso de ENF, de la CVP basal, mutaciones primarias frente a IP o número de FAR activos en la terapia optimizada. También la proporción de discontinuaciones (fracaso o abandono por cualquier motivo) fue menor en el grupo de DRV/r (21% frente a 81%)³⁰⁸. En la semana 96 el 39% de los tratados con DRV/r y el 9% del grupo comparador persistían con CVP <50 copias/mL (p<0,001, ITT-TLOVR)³¹⁵.

El estudio POWER 3 se diseñó para incrementar los datos de eficacia, seguridad y tolerancia de DRV/r (dosis de 600/100 mg, BID) ratificando los resultados obtenidos en

los estudios POWER 1 y 2 y no dispone de rama control³⁵⁸. En la semana 144, el 37% y el 9% de los pacientes respectivamente persistían con CVP < 50 copias/mL³⁵⁹.

TITAN

El TITAN es un ensayo fase III, aleatorizado, que comparó la eficacia de DRV/r frente a LPV/r, ambos con un tratamiento optimizado, en pacientes en fracaso virológico pero con menor experiencia en tratamientos que en los estudios POWER. Los criterios de inclusión fueron CVP >1000 copias/mL, duración de TAR ≥12 semanas y que nunca hubieran recibido LPV/r. Los datos deberían analizarse con criterios de no-inferioridad. No obstante, con la finalidad de realizar una comparación entre ambas opciones terapéuticas, el diseño del estudio recogía, *a priori*, que se realizaría un estudio de superioridad por ITT en caso de cumplirse la no-inferioridad. Se incluyeron 595 pacientes. A las 48 semanas se observó (ITT) que 77% de los tratados con DRV/r y 67% del grupo LPV/r alcanzaron la variable principal del estudio: CVP <400 copias/mL (diferencia media estimada 10%; IC 95% 2 a 17, p <0,001); DRV/r cumplía por tanto criterios de superioridad frente a LPV/r. También se observaron diferencias con criterios de superioridad de DRV/r cuando se analizó la proporción con CVP <50 copias/mL (71% frente a 60%, diferencia media estimada 11%; IC 95%, 3 a 19; p=0,005). En el análisis de subgrupos respecto a CVP <50 copias/mL, DRV/r resultó también superior a LPV/r si los CD4 basales eran bajos, CVP >100000 copias/mL, presencia de ≥1 mutaciones primarias a IP, *fold-change* de LPV/r >10 o *fold-change* a DRV <10. El fracaso virológico fue de 10% en el grupo de DRV/r y de 22% con LPV/r. En el análisis de las mutaciones de resistencia, sólo el 21% (6/28) de los pacientes que fracasaron con DRV/r desarrollaron mutaciones adicionales en el gen de la proteasa mientras que sí lo hizo el 36% (20/56) del grupo LPV/r. Las mutaciones frente a AN fueron menos frecuentes en el grupo con DRV/r (14% frente a 27%). La seguridad y tolerancia de DRV/r fue comparable a LPV/r, con menos diarrea de grado 2-4 y mejor perfil lipídico³⁶⁰.

GRACE

El estudio GRACE (*Gender, Race and Clinical Experience*) es un estudio en fase IIIb, multicéntrico y abierto que incluyó pacientes con experiencia previa a fármacos antirretrovirales y con CVP ≥1000 copias/mL. Todos los pacientes recibieron DRV/r 600/100mg BID con un tratamiento optimizado que incluía AN y NN, incluida ETR. El objetivo principal fue evaluar si había diferencias según el género o la raza de los pacientes respecto a la eficacia (CVP <50 copias/mL) del tratamiento a las 48 semanas. Se incluyeron 429 pacientes, de los cuales un 67% eran mujeres y un 84% eran de raza negra. Un 32,8% de las mujeres suspendieron el TAR frente a un 23,2% de los hombres (p <0,05). En la semana 48, en el análisis en ITT-TLOVR, un 50,9% de las mujeres y un 58,5% de los hombres alcanzaron una CVP <50 copias/mL. Las diferencias en la respuesta virológica ajustada por la CVP y recuento de linfocitos CD4 basales fue: -9,6 (IC 95%, -19,85 a 0,68). En el análisis en ITT-TLOVR en el que se censuraron los pacientes que fracasaron por causas diferentes al fracaso virológico, un 73% y un 73,5% de las mujeres y hombres alcanzaron una CVP <50 copias/mL, diferencia -3,9 (IC 95%, -13,89 a 6,02). Los autores resaltan la eficacia y seguridad de DRV/r en los

tratamientos de rescate tanto en hombres como en mujeres, aunque una elevada proporción de mujeres abandonan el TAR por razones distintas al fracaso virológico^{361, 362}.

ODIN

Es un estudio fase IIIb que ha comparado las dosis de DRV/r 800/100 QD frente a 600/100 BID junto a un régimen de rescate que sólo incluía AN en pacientes con fracaso a un TAR y que no presentaran ninguna mutación frente a DRV (score de la IAS-USA)³⁶³. Ha incluido 590 pacientes con CVP 1000 copias/mL y un recuento de CD4 >50 células. El objetivo primario fue la demostración de la no-inferioridad de la dosis QD de DRV/r en el porcentaje de pacientes con CVP < 50 copias/mL (ITT-TLOVR, delta predefinido del 12%). A las 48 semanas el porcentaje fue del 72,1% para la dosis QD y del 70,9% para la dosis BID (diferencia 1,2%; IC 95%, -6,1% a 8,5%), cumpliendo la no-inferioridad. La evolución del recuento de células CD4 fue similar entre ambas ramas. Solo 1/294 pacientes desarrolló una mutación de resistencia a DRV en el fracaso (ninguno en la rama BID). La tasa de efectos adversos de grados 3/4 se redujo a la mitad en el grupo QD (7,8% frente a 15,2%) y los niveles de colesterol total, LDL y triglicéridos fueron significativamente menores en la rama QD. Debe destacarse que en realidad el 46% de los pacientes incluidos no había recibido ningún IP y que la mediana de mutaciones primarias para IP fue de 0, por lo que la aplicación de los resultados de este estudio en pacientes con varias mutaciones primarias en la proteasa puede ser limitada³⁶⁴. En función de los resultados los autores sugieren que DRV/r QD podría ser una opción terapéutica en pacientes que han fracasado a un tratamiento previo y no tengan mutaciones específicas a DRV.

Mutaciones de resistencia a DRV

Se han identificado 11 mutaciones en el gen de la proteasa (V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54L o M, T74P, L76V, I84V, L89V) relacionadas con pérdida de sensibilidad a DRV. La respuesta virológica a DRV/r en TAR de rescate se va reduciendo paralelamente al número de estas mutaciones, al igual que sucede con todos los IP/r. Los porcentajes de respuesta con 0, 1, 2 y 3 mutaciones fue del 72%, 53%, 37% y 29% respectivamente en los estudios POWER (7% con ≥ 4 mutaciones)³⁶⁵.

Este dato debe ser muy tenido en cuenta para valorar el número de fármacos acompañantes en el régimen de rescate según la actividad residual de DRV cuando ésta esté comprometida.

Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos

Etravirina

Etravirina es un NN de segunda generación activo en determinados casos con infección VIH con mutaciones de resistencia frente a EFV y NVP.

Estudio TMC125-C227

Fue un estudio aleatorizado abierto en fase II en donde se intentó evaluar la utilidad de ETR en fases tempranas de tratamiento. Se incluyeron 116 pacientes que nunca habían estado expuestos a IP pero que tenían mutaciones de resistencia a NN por fracaso de un tratamiento previo con NN, interrupción de un NN o profilaxis de transmisión vertical con NN. Se utilizó una dosis de ETR de 800 mg BID de una formulación anterior a la actual, que ofrecía una farmacocinética similar a la obtenida con los 200 mg BID actuales. Los pacientes fueron aleatorizados a recibir ETR o el IP (potenciado o no) seleccionado por el investigador, siempre junto a dos AN. Si bien hubo una respuesta inicial en ambas ramas, se observó un repunte de la CVP en la rama de ETR y el estudio fue suspendido prematuramente. Los pacientes tenían hasta 7 mutaciones de AN y 4 de NN³⁴³. Este estudio es un ejemplo de la necesidad de utilizar más de dos fármacos activos y evitar la monoterapia funcional en pacientes pretratados.

DUET 1 y 2

Los ensayos clínicos en fase III DUET se diseñaron para analizar la eficacia y seguridad de ETR en pacientes con experiencia previa a FAR. Con un diseño similar, DUET 1 y 2, son ensayos multinacionales, paralelos, aleatorizados y doble ciego de ETR frente a placebo. Los criterios de inclusión eran: CVP >5000 copias/mL, TAR estable durante ≥ 8 semanas, presencia de ≥ 1 mutación frente a NN y ≥ 3 mutaciones frente a IP. Todos los pacientes recibieron DRV/r y AN según terapia optimizada. El uso de ENF fue opcional. La variable principal del estudio era una CVP <50 copias/mL en la semana 24 (análisis por ITT y TLOVR). Se incluyeron 612 pacientes en el DUET-1 y 591 en el DUET-2. Los resultados fueron: CVP <50 copias/mL en tratados con ETR, 56% y 62% (DUET-1 y DUET-2) frente a 39% y 44% (en grupos placebo) respectivamente ($p < 0,01$ y $p < 0,001$). La CVP se redujo en 2,4 y 2,3 \log_{10} en los grupos con ETR y 2,3 y 1,7 \log_{10} en los de placebo (diferencia no significativa). Entre los pacientes que recibieron ETR y ENF en el tratamiento optimizado, 60% y 73% alcanzaron CVP <50 copias/mL, frente a 56% y 68% en los del grupo placebo^{313, 314}. Los resultados conjuntos de ambos estudios a las 48 semanas confirman los datos previos con 61% de los pacientes con ETR alcanzaron CVP <50 copias/mL frente al 40% de los pacientes asignados al grupo placebo ($p < 0,0001$); el descenso de la CVP era de -2,25 \log_{10} y -1,49 \log_{10} respectivamente³⁰⁷. En la semana 96, el análisis combinado de ambos estudios señala que la eficacia de ETR más terapia optimizada fue superior al grupo comparador: 57% frente al 36% respectivamente ($p < 0,001$). El 91% de los pacientes asignados a ETR que alcanzaron una CVP <50 copias en la semana 48 persistían con la misma eficacia virológica en la semana 96³⁶⁶. Por otra parte el número de eventos clínicos asociados a sida o muerte fue menor en el grupo que recibió ETR ($p = 0,06$) y alcanzó diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon los pacientes de ambos grupos que además utilizaban ENF habiéndola utilizado previamente (5,9% en el grupo ETR frente 10,1% en el grupo placebo, $p = 0,02$)³⁶⁷.

La tolerancia a la ETR fue buena, el efecto secundario más frecuente fue un exantema leve o moderado. Lo manifestaron el 19% de los tratados con ETR frente al 12% del grupo control ($p < 0,0001$); apareció en las primeras semanas, la mayoría de grado leve-moderado (el 1% se consideró grado 3) y sólo en el 2% se retiró el tratamiento.

La ETR tiene pocas interacciones medicamentosas (véase más adelante).

Mutaciones de resistencia a ETR

El fabricante ha identificado 17 mutaciones en su *score* ponderado que pueden disminuir la respuesta a ETR: V90I, A98G, L100I, K101E/H/P, V106I, E138A, V179D/F/T, Y181C/I/V, G190A/S y M230L. Entre estas mutaciones, la presencia de la Y181I o la Y181V seguidas de la L100I, K101P, Y181C y M230L son las que generan una mayor resistencia a ETR. Estas mutaciones tienen, en general, una baja prevalencia en la población VIH con fracaso virológico a NN de primera generación, aunque siempre que vaya a usarse ETR debe evaluarse su actividad si existen mutaciones para NN³⁶⁸. La puntuación obtenida con la suma de cada mutación se ha correlacionado con respuesta virológica observada en los estudios DUET.

Por otra parte Monogram ha desarrollado un *score* que asigna a cada mutación un valor en función de su peso (Valor 4: L100I, K101P, Y181C/I/V; valor 3: E138A/G, V179E, G190Q, M230L, K238N, valor 2: K101E, V106A/I, E138K, V179L, Y188L, G190S; y valor 1: V90I, A98G, K101H, K103R, V106M, E138Q, V179D/F/I/M/T, Y181F, Y189I, G190A/E/T, H221Y, P225H, K238T). En este *score* la puntuación obtenida con la suma de los puntos de cada mutación se correlaciona con el fenotipo. Si el resultado es inferior a 4, la ETR tiene un 90% de probabilidades de ser eficaz (*“fold change”* <2,9)^{369, 370}. La Plataforma de resistencias de la Red de Investigación en sida (RIS), adjudica 2 puntos a las mutaciones Y181C/I/V, L100I, K101P, V179F, G190E, M230L y un punto al resto, considerando resistencia un *score* ≥ 3 ³⁶⁸.

Inhibidores de la unión

Enfuvirtida

La ENF inhibe la fusión del VIH evitando su penetración y replicación. Se administra por vía subcutánea dos veces al día y su principal efecto adverso es la reacción en el punto de inyección (Tabla 9).

TORO I y II

Los estudios TORO son dos ensayos fase III en los que se comparó la actividad antiviral de la ENF en combinación con una pauta optimizada frente a una pauta optimizada en pacientes en fracaso viral con múltiples tratamientos previos. Se incluyeron alrededor de 1000 pacientes, con una mediana de CVP basal >100000 copias/mL y de CD4 <100 células/ μ L. A las 24 semanas el descenso de la CVP fue mayor en los tratados con ENF que en los tratados con la pauta optimizada. ENF produjo un descenso de CVP de -0,93 \log_{10} (TORO I) y -0,78 \log_{10} (TORO II) ($p < 0,0001$)^{311, 312}. A la semana 48, en el análisis combinado de los dos estudios, el descenso de la CVP fue de -1,48 \log_{10} copias/mL (ENF) y -0,63 \log_{10} copias/mL en el tratamiento optimizado ($p < 0,0001$). La probabilidad de alcanzar una respuesta virológica fue más del doble en el grupo de ENF (descenso CVP >1 \log_{10} 37% frente 17%; CVP <400 copias/mL, 30% frente 12% y CVP <50 copias/mL, 18% frente a 8% ($p < 0,0001$)). El tiempo hasta el fracaso del grupo con ENF triplicó al grupo control (32 y 11 semanas, $p < 0,0001$)³⁷¹. Es decir, tanto el análisis primario de eficacia como el resto de análisis secundarios predefinidos, demostraron que el tratamiento de rescate era más eficaz cuando se utilizaba ENF.

Se han identificado mutaciones en la región HR1 de la gp41 del virus que reducen la sensibilidad al ENF (G36D/S, I37V, V38A/M/E, Q39R, Q40H, N42T, N43D. Otras mutaciones o polimorfismos en otras regiones de la envoltura, como por ejemplo la región HR2) podrían disminuir la sensibilidad a ENF³⁴⁹. Por ello, secuenciar sólo las mutaciones de la región HR1 podría ser inadecuado cuando se sospecha resistencia a ENF. **La barrera genética de ENF es típicamente baja, desarrollando resistencia al fármaco con solo una mutación.**

Un consenso español recomienda su uso en pacientes en los que no se pueda confeccionar un tratamiento óptimo con 3 fármacos activos³⁷².

Inhibidores del correceptor CCR5

Maraviroc

MVC es un antagonista del correceptor CCR5 e impide la entrada del virus con tropismo R5. Presenta una actividad potente frente a cepas con tropismo R5 tanto silvestres como con mutaciones para AN, NN o IP³⁷³.

MOTIVATE 1 y 2

Los estudios MOTIVATE (1 y 2) son dos ensayos clínicos en fase III, paralelos y doble ciego, donde se aleatorizó a los pacientes incluidos a recibir MVC (QD o BID) frente a placebo y añadiendo a cada uno de los brazos un tratamiento optimizado. Los criterios de inclusión fueron CVP >5000 copias/mL, tropismo R5 y resistencia a ≥ 1 FAR o ≥ 2 IP. Los pacientes se estratificaron según uso de ENF y CVP. Se incluyó a más de 1000 pacientes de los que 209 recibieron placebo, 414 MVC, QD (150 ó 300 mg) y 426 MVC BID (150 ó 300 mg). La variable principal del estudio fue la reducción de la CVP en la semana 48 y la proporción de pacientes con CVP <400 ó 50 copias/mL fue una variable secundaria.

Los resultados combinados de ambos estudios a las 48 semanas muestran que el descenso de CVP fue: MVC QD: -1,68 log, MVC BID: -1,84 log y grupo placebo: -0,78 log; la proporción de pacientes con CVP <400 copias/mL: 51,7%, 56,1% y 22,5% respectivamente (valor p frente a placebo <0,0001); y CVP <50 copias/mL: 43,2%, 45,5% y 16,7% (valor p frente a placebo <0,001). El incremento de linfocitos CD4 fue también significativamente mayor y más precoz en los grupos que recibieron MVC³⁷⁴. Esta ventaja en la recuperación inmunológica ha sido también demostrada con independencia de la eficacia virológica³⁷⁵. La eficacia (CVP <50 copias/mL) fue también superior cuando los pacientes recibieron ENF por primera vez: 64% y 61% en los grupos que recibieron MVC y 27% en los grupos que recibieron placebo con ENF³⁷⁶. En la semana 96, el 41,3% de los pacientes que recibieron MVC en pauta BID persistían con una CVP <50 copias frente al 7,2% de los pacientes del grupo placebo³⁷⁷. **En cuanto variables de desenlace clínicas, el tratamiento con MVC se asoció de manera significativa con mayor tiempo hasta la aparición de eventos de categoría C en comparación con el placebo (p=0,042)³⁷⁵; siendo hasta la fecha el único estudio en rescate que ha podido demostrar este beneficio clínico incluyendo solo uno de los nuevos fármacos activos.**

Los efectos adversos producidos por MVC no fueron superiores a los del grupo placebo. Los temores iniciales acerca de un posible mayor riesgo de hepatotoxicidad o

de una mayor incidencia de tumores, asociada al bloqueo del correceptor humano CCR5, no solo no se han confirmado sino que la incidencia de determinados eventos clínicos es menor en la rama tratada con MVC^{376, 378, 379}.

Se analizó retrospectivamente la relación del fracaso virológico en los pacientes de los MOTIVATE con el tropismo viral. Dos tercios de los pacientes con MVC que fracasaron tenían un tropismo dual (R5/X4) o bien el tropismo varió entre la selección y el inicio del tratamiento. El cambio de tropismo del R5 a dual o X4 se observó en el 7,5% de los pacientes que fracasaban con MVC y sólo el 1,9% del grupo placebo. No se observó cambio de tropismo en el 4% de los fracasos a MVC. En los pacientes que fracasaron en los estudios MOTIVATE, los sujetos que recibieron MVC asociado a ≥ 2 fármacos activos presentaron una tasa de cambio de tropismo R5 a D/M o X4 similar a los tratados con placebo. Tras la retirada del MVC las cepas revertían rápidamente a R5. Todos los pacientes que recibían MVC presentaron un incremento significativo de los linfocitos CD4³⁸⁰.

Resistencia a Maraviroc

La eficacia de MVC exige la presencia de tropismo viral R5 y no es activo cuando las poblaciones virales presentan tropismo viral X4 o dual (R5/X4). Algunos casos de FV durante el tratamiento con MVC corresponden a un sobre crecimiento de poblaciones virales con tropismo X4 preexistentes y no detectadas por la baja sensibilidad de la prueba basal (TrofileTM, detectaba virus X4 con una certeza del 100% sólo cuando la proporción era ≥ 10 % de la población viral y la CVP >1000 copias/mL). La técnica de TrofileTM ES que se realiza actualmente detecta poblaciones minoritarias con tropismo X4 hasta en una proporción del 0,1%. Asimismo el tropismo puede detectarse por métodos genotípicos. Recientemente se ha comunicado una predicción del tropismo y de respuesta a MVC similar con el genotipo poblacional tanto en pacientes sin tratamiento previo como en rescate^{123, 124}. Se han redactado unas guías españolas para la determinación del tropismo que favorecen la realización de pruebas genotípicas para su determinación¹²⁵.

Además, se han identificado mutaciones en la molécula gp120 que permite al virus unirse al receptor R5 en presencia de MVC sin cambiar de tropismo durante el tratamiento³⁴⁹. El perfil de mutaciones seleccionadas por MVC es complejo y todavía no se conoce su importancia y frecuencia de aparición.

MVC es un sustrato de la glicoproteína-P y su metabolismo se realiza a través del CYP3A4; por lo que presenta un potencial importante de interacciones con fármacos que utilizan la misma vía metabólica (véase capítulo interacciones).

Inhibidores de la integrasa

Raltegravir

La integrasa es una de las tres enzimas fundamentales del ciclo de replicación del VIH. Su función es catalizar la inserción del ADN proviral en el genoma de la célula huésped. El RAL es un fármaco capaz de inhibir la integrasa, es activo frente a cepas de VIH con mutaciones de resistencia a las tres familias clásicas y frente a cepa silvestre³⁸¹.

BENCHMRK 1 y 2

Los ensayos clínicos en fase III BENCHMRK (1 y 2) son estudios paralelos, aleatorizados y doble ciego diseñados para analizar la eficacia de RAL en rescate de pacientes expuestos a múltiples FAR y en fracaso virológico. Los criterios de inclusión fueron CVP >1000 copias/mL, resistencia genotípica o fenotípica al menos a un fármaco de cada una de las tres clases (AN, NN e IP). Se incluyeron 350 pacientes (BENCHMRK-1) y 349 (BENCHMRK-2) en situación clínica muy avanzada (82% con criterios de sida) y que habían recibido una mediana de 12 FAR durante 9,9 años. Los pacientes fueron aleatorizados (2:1) a recibir RAL o placebo ambos con terapia optimizada. En los resultados combinados de ambos estudios a las 48 semanas, la proporción de CVP <400 copias/mL fue de 72,1 % en el grupo RAL y 37,1 % en placebo ($p < 0,001$). La CVP <50 copias/mL fue del 62,1 % en el grupo RAL y 32,9 % en el placebo ($p < 0,001$)³¹⁶. La eficacia de RAL fue superior a placebo independiente de la CVP, de los CD4+ o del índice GSS/PSS ≥ 2 .

Cuando en la terapia optimizada se asoció DRV/r y ENF la proporción de CVP <400 copias/mL fue 98% (RAL) y de 87% (placebo); si solamente recibían ENF el 90% (rama RAL) y 63% (rama placebo) tenían <400 copias/mL, mientras que si sólo recibían DRV/r las proporciones fueron de 90% y 55%³⁰⁹. La seguridad y tolerabilidad de RAL resultó comparable al placebo. Se observó una mayor incidencia de neoplasias en el grupo asignado a RAL (3,5% frente a 1,7%), aunque no fue estadísticamente significativa ni se ha comunicado ninguna relación directa con el fármaco. Estudios posteriores que analizan la incidencia de neoplasias en ensayos clínicos y programas de acceso expandido no se observa una mayor incidencia de cáncer en los pacientes que reciben RAL³⁸².

El análisis combinado en la semana 96 de los estudios BENCHMRK demostró la eficacia duradera de RAL. El 58% de los pacientes que recibieron RAL persistían con CVP <50 copias/mL frente al 26% de los pacientes del grupo placebo. Este porcentaje se incrementó al 79% cuando los pacientes recibían además otros fármacos activos³⁸³.

RAL se metaboliza por glucuronización hepática; no es inductor o inhibidor de las isoenzimas del citocromo P450 por lo que su potencial de interacciones farmacológicas es bajo (véase capítulo interacciones)

Estudio TRIO

Estudio abierto no comparativo que tiene como objetivo evaluar la eficacia y seguridad de un tratamiento antirretroviral de rescate que contenía RAL + DRV/r + ETR. Incluyó 103 pacientes con: edad ≥ 18 años, CVP >1000 copias/mL, sin tratamiento previo con fármacos en investigación, con historia de fracaso virológico a NN, e infección por VIH multiresistente definida como: ≥ 3 mutaciones primarias de resistencia a IP; ≥ 3 mutaciones a AN; ≤ 3 mutaciones a DRV; y ≤ 3 mutaciones a NN. En la semana 24, 93 pacientes (90%; IC 95%, 85 a 96%) y en la semana 48, 89 pacientes (86%; IC 95%, 80 a 93%) lograron una CVP <50 copias/mL. La mediana de descenso de la CVP en la semana 48 respecto al valor basal fue de $-2,4$ log (IQR, $-2,9$ a $-1,9$). La mediana de ascenso de los linfocitos CD4 respecto al valor basal fue de $108/\mu\text{L}$ (IQR: 58-169). Durante el periodo del estudio, sólo un paciente tuvo que suspender el tratamiento por toxicidad³⁸⁴.

Mutaciones de resistencia a RAL

En estudios *in vitro* se han identificado hasta 41 mutaciones del gen de la integrasa asociadas a resistencia. Un total de 105 pacientes de 462 que recibieron RAL en los estudios BENCHMRK desarrollaron fracaso virológico en la semana 48, aunque sólo en 94 se pudo realizar estudio de resistencias. En 64/94 (68%) se detectaron mutaciones de resistencia RAL con 3 patrones de resistencia: (1) N155H + L74M, E92Q, T97A, V151I, G163R; (2) Q148K/R/H + G140S/A, E138K y (3) Y143R/C + L74A/I, T97A, I203M, S230R. RAL es un fármaco de barrera genética baja o intermedia, siendo necesarias 2 mutaciones para la resistencia completa.

Opciones de tratamiento en pacientes con múltiples fracasos virológicos y sin opciones terapéuticas. Tratamientos con pautas de TAR no supresoras

Con los fármacos disponibles actualmente debe perseguirse siempre la supresión virológica completa y duradera (<50 copias/mL) en todos los pacientes con fracaso virológico, por avanzado que sea. El fracaso virológico en el paciente multitratado no siempre conduce de forma rápida al fracaso inmunológico y progresión clínica^{25, 385, 386}. De hecho, muchos pacientes continúan con recuentos de CD4 relativamente estables y aproximadamente sólo un tercio experimenta un descenso³⁸⁷. Este último hecho se observa más frecuentemente cuando la CVP es elevada, habitualmente >10000-20000 copias/mL.

En un paciente en el que resulte imposible construir un TAR potencialmente eficaz con al menos dos fármacos activos más otros fármacos activos por problemas de resistencia, toxicidad, comorbilidad grave o problemas de adherencia o tolerancia, pueden plantearse otras opciones diferentes al tratamiento de rescate si la situación inmunitaria del paciente lo permite.

Diversos estudios han demostrado los efectos beneficiosos de mantener un tratamiento no supresor en caso infección avanzada multiresistente sin opciones de iniciar una pauta supresora³⁸⁸. En pacientes con un recuento de linfocitos CD4 <50/μL, el riesgo de desarrollar una enfermedad oportunista tipo sida era un 22% inferior si el paciente continuaba con el TAR a pesar de presentar fracaso virológico respecto a los que lo suspendieron³⁸⁹. Esto se relaciona con la persistencia de una población viral VIH-1 con baja capacidad replicativa y probablemente menos lesiva.

El tratamiento de un paciente con escasas opciones terapéuticas puede ser un tratamiento no supresor. Deben ser tratamientos cómodos, poco tóxicos y que disminuyan la capacidad replicativa viral. No se recomienda continuar con pautas no supresoras que contengan IP, NN o lInt, ya que la acumulación de resistencias frente a estos fármacos dificultaría la eficacia de futuros fármacos de estas familias. Pautas con 2 ó 3 AN, que incluyan 3TC o FTC, podrían resultar parcialmente eficaces en algunos pacientes, aunque obligaría a una monitorización frecuente del recuento de linfocitos CD4 y deben reemplazarse por un régimen de rescate supresor con 3 fármacos activos en cuanto sea posible³⁹⁰.

La mutación M184V compromete la capacidad replicativa del VIH. Un ensayo que incluía pacientes multirresistentes con esta mutación, aleatorizados a continuar sólo con 3TC o a suspender el tratamiento, mostró en la semana 48, que 69% (IC 95%, 51 a 83%) del grupo que interrumpió frente a 41% (IC 95%, 26 a 59%) de los que continuaron con 3TC, presentaron un evento clínico o fracaso inmunológico. En los que recibían 3TC el fracaso fue más tardío ($p=0,01$) y el descenso de CD4, rebrote de CVP y aumento de capacidad replicativa fueron menores³⁹¹. En función de estos estudios, se propone que el tratamiento de pacientes con múltiples fracasos contenga 3TC o FTC para mantener en la población viral la mutación M184V y reducir su capacidad replicativa³⁹². Sin embargo, este dato no se ha confirmado cuando se usan pautas de rescate supresoras que consiguen CVP indetectables.

Replicación viral baja en pacientes multitratados

Con las recomendaciones actuales sobre tratamiento antirretroviral, dos determinaciones sucesivas de CVP >50 copias/mL tras 6 meses de iniciado el TAR o tras haber conseguido previamente una CVP <50 copias/mL se considera fracaso virológico. En los ensayos clínicos realizados en pacientes sin tratamiento previo como en los realizados en pacientes con fracasos virológicos, un número no desdeñable de pacientes consiguen un descenso significativo importante de la CVP (<400 copias/mL) pero no alcanzan la máxima supresión viral. Esta proporción se incrementa en pacientes con fracasos previos y acumulación de mutaciones de resistencia frente a diferentes FAR. Con frecuencia, los pacientes con replicación viral baja (RVB) y persistente del VIH y que podemos definir como una CVP entre 50-500/1000 copias/mL, mantienen el número de linfocitos CD4. A pesar de que el tratamiento de elección es un régimen que consiga nuevamente la supresión mantenida por debajo de 50 copias/mL, la ausencia, o complejidad de otras alternativas terapéuticas, la conservación de la inmunidad y la dificultad de obtener resultados válidos con pruebas de resistencia genotípicas o determinación del tropismo viral por la baja viremia plasmática dificultan el manejo de estos pacientes. Si la pauta presenta una barrera genética elevada y el riesgo de selección de resistencias es muy bajo, puede en determinados casos mantenerse al paciente con el mismo tratamiento. En este escenario se han propuesto diferentes estrategias terapéuticas, aunque ninguna de ellas ha sido evaluada en estudios prospectivos longitudinales y comparativos. Algunos autores han demostrado que la intensificación de la terapia podría conseguir de nuevo valores de CVP <50 copias/mL³⁹³ aunque podría constituir un tratamiento subóptimo al añadir un solo fármaco activo nuevo, especialmente si se utilizan fármacos con barrera genética baja. Otra posibilidad consistiría en realizar una pruebas más sensibles de resistencias genotípicas que permiten detectar mutaciones a pesar de la CVP baja^{394, 395}. Si la pauta de tratamiento antirretroviral presenta una baja barrera genética es más prudente sustituirla bajo criterio clínico por otra con barrera genética elevada basada en un IP/r, independientemente de que no se consiga demostrar la presencia de mutaciones. No está bien establecida cuál es la mejor actitud en pacientes con RVB, aunque se conoce que los pacientes con RVB pueden seleccionar nuevas mutaciones de resistencia, fracasos^{394, 395} y contribuir a la diseminación de la infección a otras personas³⁹⁶. La tolerancia al tratamiento, la posibilidad de realizar pruebas de resistencia o tropismo viral, las alternativas disponibles y sobretodo la posibilidad de

cambiar el TAR a un régimen que incluya al menos dos fármacos antirretrovirales plenamente activos condicionan la actitud del clínico en este escenario clínico.

Suspensión del TAR

La interrupción del tratamiento en pacientes multirresistentes se planteó ante la hipótesis de que la reaparición de la cepa silvestre permitiría una mejor respuesta tras la reintroducción del tratamiento. Los ensayos clínicos realizados para evaluar esta estrategia han evidenciado un descenso importante del número de CD4 durante la interrupción frente a los que continúan con TAR^{397, 398}.

Recomendaciones sobre cambio de TAR por fracaso virológico

- Se debe conseguir CVP indetectable (<50 copias/mL) en cualquier tratamiento de rescate **(nivel A)**
- El TAR nuevo debe contener 3 fármacos antirretrovirales totalmente activos **(nivel A)**
- Se debe realizar un estudio de resistencias y una prueba de tropismo para confeccionar el mejor régimen alternativo **(nivel B)**. La prueba de resistencias debe realizarse mientras el paciente está recibiendo el tratamiento fallido o lo más precoz tras la suspensión. Si se dispone de tests genotípicos previos, se debe tener en cuenta el conjunto de mutaciones detectadas (genotipo acumulado)
- Si es imposible diseñar un TAR de rescate con tres fármacos activos, la combinación de dos plenamente activos y otros que conserven cierta actividad puede resultar eficaz en una elevada proporción de pacientes
- El cambio del TAR por fracaso virológico debe efectuarse de modo precoz para evitar el acúmulo de mutaciones y facilitar la respuesta al nuevo tratamiento **(nivel B)**
- En la elección del nuevo TAR se deben analizar las causas que motivaron el fracaso (adherencia o interacciones medicamentosas), la historia farmacológica, las toxicidades que haya presentado y las mutaciones de resistencia previas **(nivel C)**
- El nuevo TAR debe ser cómodo, bien tolerado por el paciente y lo menos tóxico posible. Debe insistirse en la adherencia antes de iniciar un rescate y subsanar específicamente las causas que motivaron el fracaso de la pauta anterior rescate **(nivel C)**
- Debe evitarse los análogos de timidina, especialmente d4T, si existen otras alternativas en cualquiera de las líneas del tratamiento de rescate **(nivel C)**
- No se deben realizar interrupciones estructuradas del tratamiento antirretroviral en situaciones de fracaso virológico con el objetivo de aumentar la eficacia del tratamiento de rescate **(nivel A)**
- No se recomienda suspender el TAR en pacientes en situación de fracaso virológico y sin opciones terapéuticas de rescate **(nivel B)**. En esta situación debe buscarse un tratamiento basado en fármacos que disminuyan la capacidad replicativa viral y no

añadan más resistencia a la ya existente (p.e. 3TC o FTC o TDF) y deben vigilarse estrechamente las cifras de linfocitos CD4 y la CVP (**nivel C**)

- Es recomendable, en determinadas circunstancias, consultar con un clínico o virólogo con experiencia en resistencias y TAR de rescate o remitir al paciente a otro centro hospitalario que disponga de experiencia y fármacos suficientes (en ocasiones de uso restringido a través de programas de acceso expandido) para conseguir un TAR con las máximas posibilidades de éxito (**nivel C**)

5.2. SIMPLIFICACION DEL TAR

Se entiende por simplificación del TAR el cambio de un esquema terapéutico que ha conseguido la supresión de la replicación viral por otro más sencillo que sigue manteniendo dicha supresión. Sus objetivos son mejorar la calidad de vida, facilitar la adherencia y prevenir o revertir algunos efectos adversos.

Con la simplificación se consigue reducir el número de comprimidos o la frecuencia de tomas, aprovechar la comodidad de las coformulaciones, eliminar las restricciones alimentarias, mejorar los efectos secundarios y reducir o eliminar las interacciones.

Esta estrategia empezó a utilizarse con la aparición de los NN. La mayoría de los estudios de simplificación iniciales se efectuó a partir de pautas con IP no potenciados. La potenciación con RTV de los IP fue el primer paso para elaborar regímenes terapéuticos que no presentan los problemas de complejidad y tolerancia de los IP iniciales. Los IP de segunda generación y las nuevas formulaciones de los antiguos, así como las coformulaciones y los fármacos de nuevas clases han contribuido también a construir tratamientos sencillos.

En la actualidad la mayoría de pacientes inician tratamiento con combinaciones sencillas y con posterioridad, cuando éstas fracasan, pasan a tratamientos más complejos. La simplificación ha sido una estrategia muy utilizada durante un periodo largo de tiempo, pero en la actualidad las pautas con tratamientos sencillos desde el principio, son la práctica habitual, quedando pocos para simplificar.

Se puede simplificar el TAR reduciendo el número de fármacos, el número de comprimidos o el número de tomas.

Reducción del número de fármacos

Los primeros estudios de simplificación del TAR tuvieron como objetivo la reducción del número de fármacos en lo que se denominó estrategia de inducción-mantenimiento consistente en una primera fase de inducción con tres o cuatro antirretrovirales seguida del mantenimiento con menos de tres fármacos.

Esta estrategia se cuestionó por el fracaso de algunos ensayos iniciales. Algún estudio posterior no encontró diferencias en la proporción de pacientes con <50 copias/mL (79% frente 77%) a las 48 semanas entre la rama de simplificación y la de mantenimiento del TAR inicial, las reacciones adversas fueron menos frecuentes en el grupo de simplificación (15%, frente a 6%) y mejoró el perfil lipídico y la adherencia³⁹⁹.

Se ha explorado la estrategia de simplificar a monoterapia con LPV/r, tras un tiempo de inducción con triple terapia que incluye a este fármaco. El estudio OK04 que incluye a 205 pacientes con CVP indetectable durante al menos 6 meses (mediana de 28), que estaban tomando un TAR que incluía LPV/r asociado a dos AN. Es un estudio aleatorizado, abierto, de no inferioridad que comparaba la estrategia de continuación del tratamiento triple frente a la monoterapia con LPV/r, considerando válida la reinducción con 2 AN si aparecía rebrote viral. A las 48 semanas el porcentaje de pacientes sin fracaso virológico fue de 90 y 94% respectivamente, (diferencia, -4%; límite superior del IC 95% para la diferencia 3,4%, cumpliendo el criterio de no inferioridad de la monoterapia con o sin reintroducción de los AN frente al tratamiento triple). El porcentaje de pacientes con CVP <50 copias/mL a las 48 semanas (ITT), considerando las reinducciones como fallos, fue del 85% en el grupo de monoterapia y 90% en el de continuación (p=0,31). Los episodios de viremia de bajo nivel, entre 50 y 500 copias/mL fueron más frecuentes en los pacientes tratados con monoterapia (4 frente a ninguno)⁴⁰⁰.

Con los pacientes de estos dos estudios se efectuó un análisis multivariante de los factores predictores de pérdida de respuesta virológica del grupo tratado con LPV/r en monoterapia. El fracaso virológico se relacionó con falta de adherencia, niveles bajos de hemoglobina y nadir de CD4 <100 células/ μ L⁴⁰¹.

En otro estudio de simplificación a monoterapia con LPV/r la estrategia fue algo distinta. Se incluyeron 155 pacientes sin tratamiento previo a los que se aleatorizó 2:1 a iniciar tratamiento con ZDV/3TC junto con LPV/r (n=104) o con EFV (n=51). Entre las 24 y 48 semanas de tratamiento y tras al menos 3 controles con CVP <50 copias/mL, los pacientes que tomaban LPV/r pasaron a mantenimiento con LPV/r en monoterapia. Considerando fracaso a cualquier viremia positiva, a las 96 semanas de seguimiento, un 48% de los pacientes en tratamiento con LPV/r y un 61% con EFV presentaban CVP <50 copias/mL (IC 95% de la diferencia, -29% a 4%; p=0,17). En un nuevo análisis en el que se incluyeron como respondedores a los pacientes que tras reintroducir los mismos AN consiguieron de nuevo CVP <50 copias/mL, el 60% de pacientes en tratamiento con LPV/r y el 63% con EFV respondieron al tratamiento (IC 95%, -19% a 13%, p=0,73). Se objetivaron viremias de bajo nivel en los pacientes en monoterapia. En cuanto a la seguridad, se observó lipoatrofia en el 5% del brazo de monoterapia, frente a un 34% del grupo de EFV. No se observaron diferencias en cuanto a la lipohipertrofia. Las alteraciones lipídicas grado 3-4 fueron más frecuentes en el grupo del LPV/r⁴⁰².

En estos dos estudios se pone de manifiesto la importancia del periodo durante el cual la CVP permanece indetectable previo al paso a monoterapia. Otros estudios como el KalMo confirman estos resultados⁴⁰³, pero en el caso del MOST⁴⁰⁴ tuvo que detenerse precozmente. Se trataba de un ensayo clínico en el que se incluía a pacientes con carga viral indetectable que se aleatorizan a continuar con el mismo tratamiento o a pasar a monoterapia con LPV/r. El objetivo primario era el fallo virológico en sistema nervioso central y/o tracto genital. El fallo virológico a nivel sanguíneo se definió como la presencia de dos cargas virales consecutivas superiores a 400 células/ μ L. Se incluyeron 60 pacientes, 6 pacientes de la rama de monoterapia presentaron fallo virológico, todos ellos con nadir de CD4 <200 células/ μ L y en las primeras 24 semanas de tratamiento. Además 5 de ellos tenían CV elevada en LCR y 4 sintomatología

neurológica. Los autores concluyeron que esta es una estrategia que no se puede recomendar de forma general y que hay que seleccionar a los pacientes de forma adecuada.

Esta misma estrategia se está explorando con ATV/r⁴⁰⁵ y DRV/r⁴⁰⁶⁻⁴¹².

Se han publicado los resultados a 48 semanas de un estudio piloto, abierto de un solo brazo de simplificación a ATV/r, el ACTG 5201⁴⁰⁵. Se incluyeron en el mismo a 34 pacientes que habían iniciado tratamiento con 2 AN y IP, que estaban con carga viral indetectable (<50 copias/mL), durante al menos 48 semanas, no habían no habían sido tratados con NN ni fallo virológico previo y eran HBsAg negativos. En el momento de entrar en el estudio se sustituía el IP que estaban tomando por ATV/r y 6 semanas después se suspendían los AN. El objetivo primario del estudio era el tiempo hasta el fallo virológico. A las 48 semanas, 30 pacientes (88%) seguían con carga viral indetectable. En los que presentaron fallo virológico no se detectaron mutaciones de resistencia. Además, en el análisis de la viremia residual se observó que no se modificaba en los pacientes en los que no hubo fallo virológico, pero aumentaba progresivamente en los que lo tuvieron detectándose desde 4-12 semanas antes de que se confirmara el fracaso. Más recientemente se han comunicado datos del estudio OREY. Se trata de un estudio piloto, abierto, multicéntrico de brazo único y 96 semanas de seguimiento que evalúa la monoterapia con ATV/r. Se incluyeron 61 pacientes que estaban recibiendo TAR, que no habían tenido ningún fracaso previo (CVP <50 copias/mL al menos 24 semanas) y en tratamiento con ATV/r y 2 AN al menos las 8 semanas antes de su inclusión. En el análisis a las 48 semanas, la mayoría de los pacientes mantuvieron la supresión virológica (79% <400 copias/mL) tras cambiar a monoterapia, la reintroducción de la triple terapia fue generalmente satisfactoria (7 de 9 pacientes). El desarrollo de mutaciones primarias a IP fue raro⁴¹³.

En cuanto al DRV/r, se han comunicado dos ensayos clínicos que exploran dos escenarios distintos en los que se evalúa la eficacia y la seguridad de la administración de DRV/r en monoterapia. El estudio MONET⁴⁰⁶ tiene un diseño similar al OK. En él se incluyeron 256 pacientes en tratamiento antirretroviral con 2 AN y un NN o un IP/r sin experiencia previa a DRV/r ni historia de fallo virológico, con carga viral indetectable (<50 copias/mL) durante al menos 6 meses. Se les aleatorizó a tomar bien DRV/r (800/100 QD) (n= 129) e monoterapia o junto a 2 AN optimizados (n= 127). Se trata de un estudio de no inferioridad en el que el objetivo primario es el tiempo hasta la pérdida de la respuesta virológica (TLOVR). Se definió fracaso terapéutico a la presencia de dos determinaciones consecutivas de cargas virales superiores a 50 copias/mL antes de la semana 48 o por la suspensión del tratamiento en estudio. En el análisis a la semana 48 se confirmaba la no inferioridad de la rama de DRV/r en monoterapia. En el análisis por intención de tratar, considerando cambio de tratamiento como un fracaso, el 85,3% de los pacientes que tomaban DRV/r frente al 84,3% de los que tomaban además 2 AN presentaban CVP indetectable (-1; límite del IC 95%, -9,9). En cuanto a la aparición de resistencias, se ha detectado un paciente por rama con evidencia de resistencia genotípica, pero no fenotípica a DRV. Recientemente se han comunicado los resultados a la semana 96. No se ha podido demostrar la no inferioridad de la rama de monoterapia. En el análisis primario de eficacia se ha observado una tasa de blips y discontinuaciones ligeramente superior en la rama de monoterapia, si bien en la mayoría de los casos se observó una resupresión

posterior con el mismo tratamiento o tras intensificación⁴⁰⁷. En un análisis multivariante de los factores relacionados con la pérdida de respuesta al tratamiento, el único factor encontrado ha sido la coinfección VIH-VHC.

En el estudio MONOI⁴¹⁰ el diseño es distinto. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado abierto en el que se incluyeron a pacientes que habían recibido tratamiento antirretroviral durante al menos 18 meses, que presentaban CVP <400 copias/mL durante los 18 meses previos y CVP <50 copias/mL en el momento de la inclusión, que no habían presentado fallo virológico a IP y no habían recibido nunca DRV/r. Consta de dos fases, en la primera se introduce en el tratamiento DRV/r en la semana -8 y en la segunda en la que se aleatoriza 1:1 a DRV/r (600/100 mg BID) o a DRV/r (600/100 mg BID) + 2 AN. Es un estudio de no inferioridad de la pauta de monoterapia frente a la triterapia y el objetivo primario es el porcentaje de pacientes que mantienen respuesta virológica en la semana 48, aunque el seguimiento programado es más prolongado. En la fase inicial se incluyeron 242 pacientes, se aleatorizaron 226. Se han comunicado los datos a la semana 48 (110 pacientes en triple terapia y 109 con DRV/r). En los resultados por protocolo DRV/r en monoterapia muestra no inferioridad frente a la triple terapia (94,1% frente a 99,0% de CVP <50 copias/mL); en el análisis por ITT se obtienen resultados similares (87,5% frente a 92%): Se objetivaron tres fracasos virológicos (>400 copias/mL) en pacientes con DRV/r en monoterapia, sin detectarse mutaciones de resistencia para DRV, y con posterior resupresión viral tras la reintroducción de los AN. Si bien 2 pacientes con CVP indetectable presentaron síntomas neurológicos (cefalea y crisis convulsiva en un paciente con epilepsia no tratada); el análisis citobioquímico del LCR era normal, pero la carga viral era detectable en el LCR. Este hallazgo cuestiona la capacidad de la monoterapia para mantener la supresión del VIH en sistema nervioso central. Recientemente se han presentado los datos de redistribución de grasa corporal observándose un menor índice de las mismas en la rama que no llevaba AN, al igual que en otros estudios⁴¹⁰.

Igualmente se han presentado datos de varios estudios en los que se explora la posibilidad de realizar otro tipo de inducción-mantenimiento que consiste en iniciar un tratamiento con ATV/r y posteriormente suspender el RTV. Esta estrategia se ha planteado para evitar los efectos secundarios que produce el RTV incluso a dosis bajas. Los estudios más significativos son el INDUMA y el ARIES. El INDUMA⁴¹⁴ es un estudio aleatorizado, abierto, multicéntrico de no inferioridad, en el que se incluyeron 252 pacientes sin tratamiento previo que iniciaron tratamiento de inducción con 2AN + ATV/r y que en la semana 26-30, los que tenían CVP <50 copias/mL y seguían con el tratamiento (172) se aleatorizan 1:1 a continuar con el mismo tratamiento o a tomar 2 AN + ATV 400 mg QD con un seguimiento de 48 semanas. El objetivo primario era la proporción de pacientes que mantenían CVP <50 copias/mL a las 48 semanas. Objetivos secundarios eran el porcentaje de pacientes con CVP <400 copias/mL, la cifra de CD4 y los datos de seguridad. La mitad de los pacientes llevaban como pareja de AN, ABC/3TC. En la semana 48 la rama de ATV demostró no inferioridad con respecto a la de ATV/r (proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL es de 75 % en la rama de ATV/r (n= 85) y de 78% en la rama de ATV (n=87); con una diferencia de 2,9 y un IC 95%, -9,8 a 15,5. En cuanto al perfil de seguridad, se produjeron menos casos de hiperbilirrubinemia y de dislipemia en la rama de ATV. Los autores concluyen que ésta es una opción en pacientes que no toman tenofovir. No se detectaron resistencias frente a IP en ninguno de los brazos entre los pacientes que presentaron fracaso

virológico. El estudio ARIES^{415, 416} es un estudio similar. Se trata de un ensayo clínico abierto, multicéntrico, de no inferioridad en el que se incluye a pacientes sin tratamiento previo a los que se pauta ABC/3TC + ATV/r y posteriormente, en la semana 36, se aleatorizan (1:1) a seguir con el mismo tratamiento o a suspender el ritonavir durante 48 semanas, si su CVP es <50 copias/mL y no han presentado fallo virológico previo. Se aleatorizaron 419 pacientes, incluyéndose en el análisis a los 379 (90%) que completaron las 84 semanas de seguimiento. El objetivo primario era la proporción de pacientes con CVP < 50 copias/mL en la semana 84 (TLOVR). Los autores observan que la eficacia de ambos tratamientos es similar y sostenida independientemente de la CVP basal, siendo infrecuente el fallo virológico (2%) que se mantiene a las 120 semanas⁴¹⁷.

Reducción del número de comprimidos y/o de dosis

La reducción del número de comprimidos y/o de dosis se consigue sustituyendo el IP por un fármaco de otro grupo o incluso utilizando fármacos que se presentan coformulados en un número único o reducido de comprimidos. La primera estrategia, ampliamente estudiada, se ha evaluado sustitución del IP/r por EFV, NVP o ABC y también por otro IP/r que se pueda administrar en QD.

Simplificación con EFV

Se han realizado múltiples estudios al respecto, pero pocos de ellos son comparativos.

En los estudios DMP-049 y -027 se aleatorizaron a pacientes que estaban tomando un TAR con IP a seguir con el mismo o sustituirlo por EFV. En los dos el fracaso virológico fue menor en el grupo de EFV^{418, 419}.

En otro estudio se comparó el cambio de IP por EFV (n=25), NVP (n=26) o continuar con el IP (n=26), en pacientes en TAR con IP con CD4 >300 células/ μ L y CVP <80 copias/mL mantenida más de 9 meses. A las 48 semanas (ITT) no hubo diferencia en la proporción de pacientes con CVP indetectable con EFV (80%) o IP (77%)⁴²⁰.

En un estudio con diseño combinado (caso-control y aleatorizado) se comparó la evolución de 167 pacientes (a los que tras suspender el IP se aleatorizaron a EFV o ABC), con otros 167 pacientes que continuaron con IP (control). A las 48 semanas (ITT) el 70% de los tratados con EFV y el 54% con IP presentaban CVP <500 copias/mL ($p < 0,05$)⁴²¹.

En un estudio que incluyó 262 pacientes en TAR basado en IP/r y con CVP <50 copias/mL, se cambió el TAR a EFV en una pauta QD (EFV+ddi+3TC) o BID (EFV con los AN de base). El estudio era abierto, aleatorizado y de no inferioridad y su objetivo primario era el mantenimiento de supresión virológica en la semana 48. La pauta QD no era inferior a la BID. En general, ambas pautas se asociaban con baja tasa de fallo virológico y con una mejora importante en la satisfacción de los pacientes, en la adherencia y la calidad de vida. Los autores concluyen que el cambio de un IP/r a EFV es seguro y bien tolerado⁴²².

Simplificación con NVP

Existen varios estudios aleatorizados y un estudio con diseño caso-control en los que se compara seguir con un IP con cambiar a NVP.

En varios estudios aleatorizados a seguir con el mismo tratamiento o simplificar a IP, la eficacia terapéutica a las 24-48 semanas, fue similar en las dos ramas y se observó una mejoría del perfil lipídico⁴²³⁻⁴²⁵. En uno de los estudios se observó una mayor eficacia virológica en el grupo de simplificación⁴²⁶.

En un estudio caso-control de una cohorte de pacientes que recibieron un IP en su primer TAR y que sustituyeron por NVP (n=125) o por otro IP (cambio a nueva formulación de SQV o IP/r (n=321), se encontró a las 48 semanas que el riesgo relativo de fracasar por cambio de tratamiento fue 5 veces superior con el IP que con NVP sin que existieran diferencias en el riesgo de fracaso virológico⁴²⁷.

Con un diseño distinto, en otro estudio español (MULTINEKA) se aleatorizó a 67 pacientes en tratamiento estable y con CVP<50 copias durante al menos 6 meses a recibir LPV/r con NVP o con dos AN. A las 48 semanas de tratamiento, no se detectó fracaso virológico en ninguno de los pacientes. Se describió un posible beneficio en la toxicidad mitocondrial, en los pacientes con NVP⁴²⁸.

La NVP está contraindicada en mujeres con CD4 >250 células/ μ L y en varones con >400 por riesgo de hepatotoxicidad grave. Sin embargo, varios estudios independientes⁴²⁹⁻⁴³⁵ coinciden en señalar que no se ha objetivado un incremento de la hepatotoxicidad o del exantema en pacientes en los que se introduce NVP como estrategia de simplificación o sustitución por toxicidad independientemente del número de CD4. **Estos resultados son muy consistentes por el número de pacientes, por lo que se ha modificado la ficha técnica en el sentido de que no importa el número de CD4 cuando se simplifica un TAR a NVP (véase ficha técnica).**

Simplificación con abacavir

Se han realizado múltiples estudios aleatorizados y un estudio caso-control prospectivo que analizan esta estrategia. Los resultados son dispares.

En uno de ellos la eficacia terapéutica fue superior en la rama del ABC. En los otros, incluido el estudio TRIZAL y el COLA30305, la eficacia fue similar, pero se observó una mayor incidencia de fracasos en aquellos pacientes que habían pasado a tomar ABC y previamente habían tomado tratamientos subóptimos^{421, 436-438}.

En el estudio de diseño combinado (caso-control y aleatorizado) que comparaba IP con EFV o ABC, el 65% de los pacientes tratados con ABC y el 54% de los que continuaron con IP presentaron CVP <500 copias/mL (p<0,05) a las 48 semanas⁴³⁹.

En otro estudio, 209 pacientes fueron aleatorizados a recibir ZDV/3TC/ABC en combinación fija con EFV o LPV/r, durante 24-36 semanas. Los pacientes que tuvieron CVP <50 copias/mL en ambos brazos continuaron con ZDV/3TC/ABC. A las 72 semanas por intención de tratamiento un 31% y un 43% mantuvieron la CVP indetectable, pero el 34% y 25% de ellos cambiaron la pauta por toxicidad⁴⁴⁰.

En distintos estudios se ha puesto de manifiesto la existencia de un riesgo elevado de fracaso terapéutico y desarrollo de mutaciones a AN cuando se utilizan pautas de

simplificación con 3TC/ABC+TDF⁴⁴¹ y 3TC+ddl+TDF por lo que se desaconsejan como estrategia de simplificación pese a su sencillez.

Comparación directa de EFV, NVP y ABC en simplificación de TAR

El NEFA es un estudio prospectivo en el que se aleatorizaron 460 pacientes en tratamiento con dos AN más un IP, con CVP <200 copias/mL durante ≥ 6 meses⁴⁴². Se sustituía el IP por NVP (n=155), EFV (n=156) o ABC (n=149). El 50%, 58% y 46% de pacientes respectivamente habían recibido tratamientos previos subóptimos con uno o dos AN. La eficacia terapéutica (ITT) a las 48 semanas (CVP <200 copias/mL) fue similar en los tres grupos (77%, 72% y 77%; p=NS). EL fracaso virológico fue superior en el grupo de ABC (6%, 4% y 12%; p<0,05) y ocurría en los pacientes que habían recibido tratamiento subóptimo. Estos resultados se han confirmado a los 3 años⁴⁴³. El análisis genotípico de las cepas de los pacientes con fracaso virológico evidenció un número mayor de mutaciones de resistencias a AN en los que recibieron ABC⁴⁴⁴. El número de pacientes que suspendió el tratamiento por efectos adversos fue menor en el grupo de ABC (17%, 17% y 6%; p<0,01). La simplificación a cualquiera de los NN, sobre todo a NVP, produjo beneficios en el perfil lipídico, con reducción de colesterol-no-HDL con ABC. Los niveles de triglicéridos se redujeron en los tres brazos. Los marcadores de resistencia a la insulina mostraron una tendencia a la mejoría. Sin embargo, no mejoraron las alteraciones en la distribución de la grasa^{445, 446}.

Un estudio de cohortes con los datos de la *French Hospital Database on HIV* trata de reproducir los datos del estudio NEFA pero en la vida real. Se incluyeron 2462 pacientes seguidos durante 12 meses y en los que el primer tratamiento incluyera un IP; se cambió el IP por EFV, NVP o ABC. Los factores predictivos de rebrote de la CVP fueron: sexo femenino, menor edad, exposición subóptima previa a antirretrovirales, CPV elevada, uso de ddl/d4T tras el cambio y cambio a NVP o ABC (si se había recibido tratamientos subóptimos). Las diferencias respecto al NEFA probablemente se deban a diferencias metodológicas⁴⁴⁷.

Comparando la simplificación a tres AN (ZDV/3TC/ABC coformulados) frente a la combinación de dos AN (ZDV/3TC coformulados) más NVP, en el análisis (ITT) a las 48 semanas no hubo diferencias significativas en cuanto CVP indetectable⁴⁴⁸.

Simplificación con atazanavir

El ATV es un IP de dosificación QD, bien tolerado, con buen perfil metabólico y pocos comprimidos que ha permitido una nueva estrategia de simplificación en la que un IP sustituye a otro.

El SWAN es un estudio abierto en fase IIIb, en el que 419 pacientes en tratamiento estable con IP (potenciado o no) y con CVP indetectable se aleatorizaron (2:1) a ATV 400 mg QD (en caso de tomar TDF se pautó ATV/r 300/100 mg) (n=278) o continuar con el IP (n=141). A la semana 48 el fracaso virológico fue menor en los que simplificaron (7% frente a 16%; p<0,01). La eficacia virológica fue superior en los pacientes que pasaron de tomar un IP no potenciado a ATV (22% frente a 5%; p<0,001); no hubo diferencias entre los que siguieron con IP/r y los que pasaron de IP/r a ATV (11% frente a 8%; p=NS)⁴⁴⁹. En cuanto a la seguridad, la suspensión de

tratamiento fue mayor en los pacientes del grupo control (21% frente a 34%; $p < 0,01$) y el perfil lipídico fue mejor en el grupo que simplificó a ATV. Los datos de los estudios ATAZIP y SIMPATAZ confirman la seguridad y eficacia de esta estrategia de simplificación, en este caso cambiando LPV/r por ATV/r^{450, 451}.

El estudio REAL, del que se han presentado datos a las 48 semanas, es un ensayo clínico en el que se incluye a pacientes en TAR estable al menos durante 12 semanas que contiene un IP administrado BID, con CVP indetectable y lipohipertrofia, a los que se aleatoriza a continuar con el mismo tratamiento o cambiar el IP a ATV/r 300/100 mg. El control inmuno-virológico se mantuvo, se observó una mejoría del perfil lipídico en la rama de ATV pero no se objetivaron diferencias en cuanto a la composición corporal⁴⁵².

Otra estrategia es la desarrollada en el ensayo clínico AI424-067 a 48 semanas⁴⁵³. Se trata de un estudio aleatorizado, abierto, prospectivo, en el que se incluyeron 246 pacientes en tratamiento con IP/r y con hiperlipidemia y CVP < 50 copias/mL. Se aleatorizaron los pacientes a cambiar a ATV (400 mg) en el día 1 (cambio inmediato) o mantener su tratamiento y cambiar a ATV (400 mg) a las 24 semanas (cambio retrasado). A las 12 semanas ambos grupos mantenían un control virológico similar y aquellos pacientes que tomaban ATV mostraron una mejoría significativa de las cifras de LDL-colesterol (-15 y +1%; $p < 0,0001$). Los autores concluyen que el cambio inmediato o diferido de un IP potenciado o no a ATV no potenciado en pacientes con hiperlipemia se asocia con mejoría en los parámetros lipídicos sin pérdida de supresión virológica.

Simplificación a regímenes de administración en una vez al día

El cambio a un régimen QD es otra forma de simplificación en pacientes que estén bien controlados. Varios ensayos han comprobado la validez de esta estrategia.

En un ensayo clínico se aleatorizaron 355 pacientes a seguir con su TAR o cambiar a una terapia QD (ddl+FTC+EFV). A la semana 48 seguían con CVP indetectable el 87% de la rama QD y el 79% de los que no habían cambiado ($p < 0,05$)⁴⁵⁴. En otro estudio no aleatorizado en el que se incluyeron 169 pacientes, 84 siguieron su TAR y 85 se cambiaron a ddl +TDF+ NVP QD; la eficacia virológica fue buena (76 frente a 86%, ITT) pero los linfocitos CD4 disminuyeron en la rama QD con un decremento medio de 95 células/ μL ⁴⁵⁵.

La combinación ddl+TDF ha demostrado eficacia virológica pero pobre recuperación de linfocitos CD4 o incluso descenso de su número aunque la CVP esté suprimida. Este descenso era más patente cuando se administraban las dosis estándar (plenas) de ddl⁴⁵⁶. Los regímenes de administración QD que contengan la combinación ddl+TDF deben evitarse. De hacerlo se debe reducir la dosis de ddl a 250 mg/día en pacientes con más de 60 Kg de peso y a 200 mg/día en pacientes por debajo de dicho peso.

Con la aparición de las combinaciones a dosis fijas de AN administrados QD se ha simplificado aún más la situación. Está cada vez más claro su papel en terapia de inicio y ya se han puesto en marcha ensayos para valorar su uso en regímenes más sencillos. El SWEET es un ensayo clínico en el que 234 pacientes en tratamiento durante al menos 6 meses con ZDV/3TC (coformulados) + EFV y con CVP < 50 copias/mL, se aleatorizaron a TDF+FTC (coformulados) + EFV o a seguir con el mismo tratamiento. A

las 24 semanas se observó una mejoría en las cifras de hemoglobina y en el perfil lipídico en la rama TDF+FTC, manteniéndose la respuesta al tratamiento (CVP <50 copias/mL, 93% frente a 88%; $p=0,26$). Recientemente se han publicado los resultados a 48 semanas⁴⁵⁷ a las que han llegado 206 pacientes. Un 5% de los pacientes que continuaron con el mismo tratamiento y un 3% de los que lo cambiaron, discontinuaron el estudio por efectos adversos. No se objetivaron diferencias significativas entre las dos ramas (85% de los pacientes que continuaron el tratamiento frente al 88% de los que cambiaron tenían CVP <50 copias/mL, ITT). En el subestudio de 100 pacientes a los que se ha realizado DEXA del tejido graso, se observa que la grasa se mantiene o aumenta en los pacientes que cambian el tratamiento, pero disminuye en el grupo que continúa (diferencia media de 448 g; IC 95%, 57 a 839 g; $p=0,025$). Al igual que en otros estudios, el incremento de grasa es menor en aquellos pacientes que tomaban ZDV y en los que presentaban menor cantidad de grasa periférica. No se observaron diferencias entre grupos en cuanto a toxicidad renal. Los investigadores concluyen que el cambio de ZDV/3TC por TDF/FTC en pacientes en tratamiento con EFV y respuesta virológica mantenida es seguro desde el punto de vista virológico y se asocia con un incremento de la cifra de hemoglobina y una mejoría de los parámetros lipídicos y de la distribución de la grasa corporal.

En otro ensayo clínico aleatorizado, abierto que incluye a 80 pacientes con CVP <50 copias/mL y que están en tratamiento con ZDV/3TC (+ IP ó NN), a los que se aleatoriza a seguir con ZDV/3TC o cambiar a TDF/FTC (RECOMB), en la semana 24 el 85% de los pacientes en tratamiento con TDF-FTC, presentaban CVP <50 copias/mL frente a un 80% con ZDV/3TC ($p=0,77$)⁴⁵⁸. Se observó además un incremento significativo de grasa en las extremidades en los pacientes cuya masa grasa era <7,2 kg basalmente. Por último mejoraron las cifras de colesterol-LDL en la rama de TDF/FTC. En los datos a 72 semanas⁴⁵⁹, no se ha observado ningún fallo virológico; el 90% de la rama de TDF/FTC frente a un 83% de la rama de AZT/3TC presentan CVP <50 copias/mL ($p= 0,52$); la mediana de incremento de la cifra de CD4 fue similar. Además, en estos pacientes se objetiva una mejoría significativa, incremento progresivo de grasa en las extremidades, sobre todo si el IMC basal es >25 Kg/m² y llevan más de 5 años con AZT/3TC. El análisis se realiza según el IMC basal sea superior o no a 25 Kg/m² y el número de años en tratamiento con AZT/3TC y en todos los escenarios la mejoría de grasa periférica es estadísticamente significativa en la rama de TDF/FTC. Los autores concluyen que ésta es una estrategia segura desde el punto de vista inmuno-virológico y de efectos adversos, que mejora la lipoatrofia y distintos parámetros bioquímicos (hemoglobina, hematocrito y colesterol-LDL). Otro ensayo similar es el TOTEM, en el que se incluye a 91 pacientes con CVP <400 copias/mL y dislipemia, a los que se aleatoriza a seguir con el mismo tratamiento o cambiar a TDF/FTC. En los pacientes que cambiaron se observó una mejoría significativa en el perfil lipídico a las 12 semanas⁴⁶⁰. Se conoce igualmente los resultados del BICOMBO, estudio aleatorizado y abierto que incluyó a 335 pacientes que recibían tratamiento con un régimen que incluía 3TC, con supresión virológica durante ≥ 6 meses y que fueron aleatorizados a sustituir los AN por las combinaciones coformuladas ABC/3TC ($n= 167$) o TDF/FTC ($n= 168$)⁴⁶¹. El estudio se diseñó para evaluar la no inferioridad de ambas combinaciones respecto a fracaso terapéutico o virológico. En el grupo de TDF+FTC, el fracaso terapéutico fue de 13,3% frente a 19,2% en el de ABC+3TC, no demostrándose la no inferioridad de ABC+3TC frente a TDF+FTC (IC 95%, -2 a 14%). Sin embargo ABC+3TC demostró la no inferioridad

frente a TDF+FTC en el objetivo de fracaso virológico (2,4% frente a 0%; IC 95%, 0,05 a 6%). Las suspensiones por eventos adversos fueron de 10% del grupo de ABC+3TC frente al 5% del grupo TDF+FTC (p=0,004). En cuanto al perfil lipídico, las reducciones del colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos fueron mayores en la rama TDF+FTC. El incremento en la grasa periférica y las alteraciones en la función renal o la densidad mineral ósea fueron similares. La toxicidad hepática fue muy baja en ambos grupos. Por el contrario, la respuesta inmunológica fue mejor en el grupo de ABC+3TC. La determinación previa del HLA B*5701 podría haber modificado estos resultados.

Existe otro estudio aleatorizado, abierto, programado para 96 semanas, en el que se ha realizado el HLA B*5701 en el que se incluyeron pacientes HLA B*5701 negativos con CVP<50 copias/mL, a los que se aleatoriza a sustituir la base de análogos por los combos ABC/3TC o TDF/FTC. El objetivo primario es el fallo virológico (dos determinaciones consecutivas <400 copias/mL en ITT). Los objetivos secundarios incluían SIDA, muerte, efectos adversos, eventos serios no SIDA, alteraciones metabólicas y composición corporal. En este caso se incluye a 357 pacientes, el fallo virológico es poco frecuente (5,6% en pacientes con ABC/3TC y 3,9% con TDF/FTC; p=ns). La combinación con ABC/3TC se asoció con eventos no SIDA más serios, sobre todo cardiovasculares⁴⁶².

En otro ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, controlado, abierto, multicéntrico, se incluye pacientes en tratamiento con CVP indetectable a los que se aleatoriza a seguir con el mismo tratamiento o tomar TDF/FTC/EFV coformulados con un seguimiento a 48 semanas⁴⁶³, demostrando la misma eficacia en las dos ramas. Se incluyó a 300 pacientes que presentaban CVP <200 copias/mL durante ≥ 3 meses y sin ningún cambio de tratamiento. Se estratificaron según estuvieran tomando NN o IP y aleatorizaron 2:1 a simplificar el tratamiento (tomar la tableta única) o seguir con su mismo tratamiento. Se evaluó la eficacia y la seguridad en el momento basal y a las semanas 4, 12, 24, 36 y 48. Además a los pacientes se les realizó una valoración de la calidad de vida así como de sus preferencias en cuanto a los fármacos. De los 300 pacientes incluidos, 97 continuaron con el mismo tratamiento. A las 48 semanas, el 89% de los pacientes con TDF/FTC/EFV frente a 88% con el mismo tratamiento presentaban CVP <200 copias/mL (TLOVR; IC 95%) con una diferencia entre ramas de 1,1% (-6,7% a 8,8%), indicando no inferioridad de la rama de TDF/FTC/EFV. El 87% de los pacientes que cambiaron a TDF/FTC/EFV frente a 85% de los que no cambiaron el tratamiento presentaban CVP <50 copias/mL analizados de la misma manera: diferencia entre las dos ramas de 2,6% (IC 95%, -5,9% a 11,1%). Las tasas de discontinuación fueron similares, aunque la suspensión por efectos adversos fue superior en la rama de TDF/FTC/EFV (5% frente a 1%), sobre todo por sintomatología relacionada con el SNC. No se objetivaron diferencias en cuanto a tasa de filtrado glomerular, ni en la adherencia. Sí se observó una mejoría en la cifra de triglicéridos en la rama de TDF/FTC/EFV (-20 frente a -3 mg/dl; p= 0,035). En cuanto a los datos de calidad de vida⁴⁶⁴, los pacientes que simplificaron referían mejoría en muchos de los síntomas relacionados con el VIH, encontraban el nuevo tratamiento más fácil de tomar y seguir y lo preferían frente a los tratamientos previos. El estudio ADONE confirma estos resultados⁴⁶⁵.

Desde la publicación del estudio NODY⁴⁶⁶ disponemos de una nueva opción para simplificar a una terapia QD, ya que ha demostrado la eficacia y la seguridad de la simplificación de NVP administrada dos veces al día a una vez al día. Se trata de un

estudio con una duración de 48 semanas, abierto, aleatorizado, multicéntrico en el que se incluyeron 298 pacientes estables que estaban tomando nevirapina dos veces al día durante al menos 12-18 semanas y presentaban CVP <50 copias/mL. Estos pacientes se aleatorizaron a continuar con el mismo tratamiento o a tomar nevirapina QD. El objetivo primario del estudio era valorar la seguridad hepática del tratamiento QD, analizando la proporción de pacientes con ALT/AST grado 3-4; y los objetivos secundarios eran el desarrollo de hepatitis clínica y la eficacia inmuno-virológica y clínica. El estudio demostró no inferioridad por protocolo frente a mantener la pauta inicial, habiéndose predefinido la no inferioridad como un margen del 10% para hepatotoxicidad que era el objetivo primario.

Una de las grandes cuestiones por resolver es si el impacto de no tomar una dosis de medicación por olvido o incumplimiento puede ser mayor en un régimen QD que en un régimen de varias dosis diarias en cuanto a la aparición de mutaciones de resistencia⁴⁶⁷. En la actualidad disponemos de múltiples fármacos que se pueden administrar una vez al día, con una vida media suficientemente larga como para evitar este problema.

Otros tipos de simplificación

Con la aparición de nuevos fármacos de nuevas familias, se ha podido simplificar el tratamiento administrado a pacientes multitratados. Esta simplificación no radica en el número de comprimidos sino en la forma de administración de los fármacos. Así se han presentado ya estudios en los que se sustituye el ENF por RAL, manteniéndose la eficacia del tratamiento⁴⁶⁸⁻⁴⁷³. Aunque la mayoría de trabajos son observacionales, ya se ha realizado un ensayo clínico⁴⁷⁰ en el que se incluyó a 170 pacientes con VIH resistente a los tres grupos de fármacos y CVP <400 copias/mL durante al menos 3 meses en tratamiento con ENF. Se les aleatorizó 1:1 a seguir con ENF o cambiar a RAL. El objetivo primario era la proporción acumulada de pacientes con fallo virológico definido como CVP \geq 400 copias/mL hasta la semana 24. Se observó fallo virológico en un paciente por rama. La conclusión de los autores es que el cambio a raltegravir es eficaz y bien tolerado a las 24 semanas del mismo, que ofrece la ventaja de la simplicidad, un mismo perfil de seguridad y que se necesita un seguimiento más a largo plazo. No se podría utilizar MVC en el contexto de la simplificación, en estudios similares a los ya realizados ya que en estas circunstancias no se puede realizar el test de tropismo.

También se ha explorado con éxito la sustitución de enfuvirtida por otros fármacos como la ETR⁴⁷⁴.

Pero la simplificación a veces no es tan sencilla y no debe realizarse si puede comprometer la eficacia del tratamiento. Como ejemplo, destacan dos ensayos clínicos presentados recientemente, SWITCHMRK 1 y 2⁴⁷⁵. Se trata de dos ensayos clínicos paralelos, multicéntricos, doble ciego, aleatorizados en los que se incluyó a pacientes virológicamente controlados, en tratamiento del que formaba parte lopinavir/r de forma estable, no se excluyó a pacientes que habían fracasado a otros regímenes terapéuticos, siempre que en el momento de inclusión presentaran CVP <50 copias/mL durante al menos 3 meses. Los pacientes se aleatorizaron 1:1 a mantener LPV/r o cambiar a RAL, con la misma base de análogos. Los objetivos primarios eran:

porcentaje de cambio en las cifras de lípidos en la semana 12, proporción de pacientes con CVP <50 copias/mL en la semana 24 así como eficacia y seguridad a las 24 semanas. En el SWITCHMRK 2, se aleatorizaron 355 pacientes y se trató a 354 (176 con RAL y 178 con LPV/r). Tras el cambio, el RAL se confirmó como bien tolerado y se produjo una mejoría significativa de los parámetros lipídicos, pero no demostró no inferioridad desde el punto de vista virológico en la semana 24: 154 de 175 pacientes (88%) frente a 167 de 178 (93,8%) tenían CVP <50 copias/mL en los grupos de RAL y LPV/r respectivamente; la diferencia observada entre los dos tratamientos es de -5,8 % (IC 95%, -12,2 a 0,22; ITT). Probablemente estos resultados son debidos a los criterios de inclusión de los pacientes y más en concreto a permitir la entrada en el estudio de pacientes con fracaso virológico previo cuando se plantea sustituir el LPV/R por RAL que tienen distinta barrera genética. La enseñanza de este estudio es que se debe elegir muy bien a los pacientes cuyo tratamiento se simplifica y la estrategia de simplificación a seguir.

En el estudio SPIRAL los resultados son muy distintos⁴⁷⁶. En este caso se trata de un ensayo clínico abierto, multicéntrico a 48 semanas, en el que se incluye a 273 pacientes en tratamiento con un régimen que contiene IP/r con carga viral <50 copias/mL durante al menos 6 meses, a los que se aleatoriza 1:1 a seguir con el mismo tratamiento o cambiar el IP/r a raltegravir. El objetivo primario fue la proporción de pacientes sin fallo virológico a las 48 semanas. Es un estudio de no inferioridad con un margen de -12,5%. En este caso, sí que se cumplió el criterio de no inferioridad: a las 48 semanas el 89,2% de pacientes con raltegravir y el 86,6% de pacientes con IP/r no habían fracasado (diferencia 2,6%; IC 95%, -5,2 a 10,6). Además el cambio a RAL supuso una mejoría significativa del perfil lipídico. La diferencia entre los resultados de ambos estudios se relaciona con el diseño y sobre todo con la duración de la supresión virológica previa al cambio de tratamiento.

También se ha explorado la posibilidad de utilizar el RAL sólo una vez al día como simplificación. Se ha presentado el estudio ODIS⁴⁷⁷ en el que se incluye a 222 pacientes en tratamiento con IP/r+TDF/FTC o ABC/3TC con CVP <50 copias/mL al menos 24 semanas, a los que se aleatoriza en proporción 1:2 a sustituir el IP/r por RAL 400 mg BID (n=73) o RAL 800 mg QD (n=149). Además, a la semana 12, si no existían diferencias entre las dos ramas en cuanto a eficacia, los pacientes incluidos en la rama BID podían ser de nuevo aleatorizados a seguir BID (n=35) o pasar a QD (n=38). Los datos presentados corresponden a las 24 semanas. Las conclusiones de los autores son que en pacientes estables en tratamiento con IP, la sustitución del IP por raltegravir se asocia con bajo riesgo de fallo virológico en la semana 24 si no existe historia previa de resistencia a AN. La eficacia y la seguridad de las dos ramas son similares. Existe mayor riesgo de fallo virológico en la rama QD aunque las diferencias no son estadísticamente significativas. Estos resultados ponen de nuevo de manifiesto la importancia de elegir adecuadamente los pacientes a los que se va a simplificar. Este mismo análisis es discutido en una editorial que acompaña la publicación del estudio SWITCHMRK⁴⁷⁸.

Sin embargo, el estudio fase III que comparaba la eficacia y seguridad de la dosificación RAL 800 mg QD frente a RAL 400 mg BID (ambos combinados con TDF/FTC) en pacientes sin tratamiento previo ha sido interrumpido ya que RAL QD no ha podido demostrar la no inferioridad frente a la dosificación BID (identificador de ClinicalTrials.gov NCT00745823; Nota de prensa de MERCK).

Recomendaciones sobre simplificación del TAR

- Es importante seleccionar muy bien los pacientes a los que se debe simplificar y la estrategia a seguir. La simplificación no se puede realizar a costa de la pérdida de eficacia virológica. Sólo se puede plantear una simplificación si no ha existido fracaso previo o si se utilizan fármacos plenamente activos para mantener el éxito virológico⁴⁷⁹ **(nivel A)**
- En pacientes, sin historia de fracaso previo a IP, con CVP indetectable al menos 6 meses y signos o síntomas de toxicidad por los AN es posible la simplificación a LPV/r (BID) o DRV/r en monoterapia^{402, 480-482} **(nivel A)**
- Si no ha existido fracaso previo a AN se puede sustituir el IP por EFV, NVP o ABC. No se recomienda simplificar de un IP a ABC si el paciente ha recibido tratamientos subóptimos previos con AN **(Nivel A)**⁴⁴³
- Está contraindicada la simplificación a ABC asociado a TDF y 3TC o a TDF y ddi^{441, 455, 456, 483} **(nivel B)**
- En pacientes con riesgo cardiovascular elevado la simplificación a ATV o ATV/r, NVP o RAL puede añadir ventajas metabólicas^{453, 455, 468, 484} **(nivel A)**
- En pacientes en su primera pauta terapéutica con IP y con CVP indetectable se puede simplificar a una pauta QD como EFV +TDF+3TC (o FTC), EFV+ddi+3TC (o FTC), o ATV/r (o ATV)+TDF+FTC^{449, 463} **(nivel A)**
- La sustitución de ENF por RAL en pacientes suprimidos virológicamente se ha demostrado como eficaz y segura⁴⁷² **(nivel A)**
- Otras posibles simplificaciones deben ser realizadas en el seno de ensayos clínicos, no en la práctica clínica **(nivel C)**

6. ADHERENCIA

Se entiende por adherencia al TAR la capacidad del paciente para implicarse correctamente en la elección, inicio y cumplimiento del mismo a fin de conseguir una adecuada supresión de la replicación viral.

El control virológico depende de múltiples factores pero la adherencia incorrecta es la primera causa de fracaso terapéutico, relacionándose con mala respuesta virológica⁴⁸⁵ peor reconstitución inmune⁴⁸⁶, y mayor riesgo de mortalidad^{487, 488}. Por tanto, es muy importante que los pacientes sean conscientes de su enfermedad, entiendan claramente el objetivo del TAR, participen en la decisión de iniciarlo, se sientan capaces de cumplir dicho tratamiento y comprendan la enorme importancia que tiene una toma continuada y correcta de la medicación.

Durante los últimos años se ha intentado conocer los factores asociados a mala adherencia. Las diferencias entre los estudios, muchos de ellos carentes del adecuado rigor metodológico, hacen difícil realizar generalizaciones con alto grado de evidencia⁴⁸⁹. Se han identificado varios factores asociados con mala adherencia, entre los que destacan la mala relación médico-paciente, consumo activo de drogas,

enfermedad mental, edad más joven, nivel educativo del paciente, idioma, falta de apoyo social, complejidad del tratamiento, efectos secundarios y, más recientemente, temor acerca de la aparición de alteraciones metabólicas y morfológicas^{8, 490, 491}. Un tema controvertido es la relación de la adherencia con la edad; su importancia va ser creciente dado el envejecimiento de la población infectada por el VIH; se ha encontrado peor cumplimiento en pacientes muy jóvenes y mejor cumplimiento en pacientes mayores de 65 años²⁰⁴. El uso concomitante de otros fármacos, la mayor prevalencia de efectos adversos, de interacciones, la depresión y las alteraciones de memoria podrían causar menor adherencia en los mayores⁴⁹². Lo que parece claro es que los trastornos neurocognitivos, más frecuentes en la población de más edad, suponen un factor negativo para la adherencia⁴⁹³ y que este aspecto deberá ser estudiado y atendido en los próximos años. Por el contrario, el apoyo emocional y vital, la capacidad para incluir la medicación en las actividades de la vida diaria sin ocultarla y la comprensión de la relación entre adherencia y desarrollo de resistencias son factores que predicen una adherencia correcta. Corregir los primeros e incrementar los segundos forma parte de la optimización del TAR y debe incorporarse a la rutina de seguimientos de los pacientes con infección por VIH (Tabla 10).

El inicio del TAR no es urgente en los pacientes con infección crónica. Antes de iniciar la terapia conviene preparar al paciente, identificar las situaciones que puedan dificultar la adherencia correcta e intentar corregirlas⁴⁹⁴. Es importante conocer los factores dependientes del paciente (laborales, restricciones dietéticas, etc.) para diseñar un TAR a la medida. Cuando se inicie el TAR es imprescindible que se ofrezca una información detallada, soporte y accesibilidad en los aspectos relacionados con el tratamiento. En este sentido el uso de un teléfono directo puede facilitar el contacto entre el paciente y los profesionales.

Durante el TAR es fundamental evaluar periódicamente la adherencia, que debe tenerse en cuenta en las decisiones terapéuticas. Dado que no existe un método fiable de evaluación, se recomienda utilizar varias técnicas como la entrevista, pasar un cuestionario estructurado (existen cuestionarios disponibles validados en España^{495, 496}) recuento de medicación sobrante y registro de recogida de la medicación en la farmacia así como la evolución clínica y virológica. Para ello es indispensable que exista una buena coordinación entre todos los estamentos implicados y en particular entre clínicos y farmacéuticos.

La entrevista y los cuestionarios estructurados, son de fácil acceso en cualquier ámbito asistencial, sin embargo, no son muy precisos, y en determinadas circunstancias pueden arrojar resultados no válidos. Los métodos más sofisticados y caros para evaluar la adherencia como determinación de los niveles plasmáticos de fármacos⁴⁹⁷ o dispositivos electrónicos que registran la toma de medicación (MEMS o *Medication Event Monitoring System*), se circunscriben al campo de la investigación⁴⁹⁸. Con ninguno de ellos hay información suficiente como para recomendar su utilización rutinaria en clínica.

Las características virológicas del VIH determinan que cuando existen niveles subterapéuticos de los FAR el virus pueda replicarse y desarrollar resistencias. Los datos obtenidos durante los primeros tratamientos combinados, basados en IP sin potenciar constataron que la máxima eficacia requería una adherencia prácticamente perfecta, clásicamente >95%²⁸⁶. Estudios recientes sugieren que con niveles menores

se pueden alcanzar los objetivos terapéuticos en regímenes basados en NN o IP/r, especialmente en pacientes que consiguen viremias indetectables⁴⁹⁹⁻⁵⁰¹. Debe destacarse que no sólo es importante el porcentaje de dosis omitidas sino también los patrones de adhesión subóptima. Las interrupciones de tratamiento (más de dos días sin tomar ningún fármaco) presentan mayor repercusión en la respuesta virológica que la omisión ocasional de dosis⁵⁰². En terapia de inicio, también se ha demostrado una relación lineal entre nivel de adherencia y efectividad: en tratamientos basados en NN, por cada 10 % de incremento en el cumplimiento, se observó un 10 % más de pacientes que consiguen viremias indetectables sostenidas⁵⁰³. También pudieron evidenciarse diferencias entre distintos IP/r y su relación entre adherencia y efectividad, la adherencia subóptima a DRV/r tuvo un impacto menor comparado con LPV/r en pacientes sin tratamiento previo en el estudio aleatorizado ARTEMIS⁵⁰⁴.

La relación entre adherencia y desarrollo de resistencias es más compleja que la idea establecida de que “la no adherencia aumenta el riesgo de resistencias”. Se han encontrado diferencias en función de las familias de fármacos; así en pautas basadas en IP no potenciados se comprobó la aparición de resistencias con niveles altos de cumplimiento, mientras que en pautas con NN las resistencias son inusuales en los pacientes muy cumplidores, dándose en los poco adherentes y especialmente en los pacientes con interrupciones prolongadas del tratamiento⁵⁰⁵; por el contrario, en el caso de los IP potenciados, la aparición de resistencias es mucho más difícil con cualquier nivel de adherencia debido a su elevada barrera genética^{506, 507}. En cualquier caso, ante un paciente con alta sospecha de presentar dificultades para el cumplimiento terapéutico, es mejor evitar las pautas basadas en NN e iniciar TAR con pautas basadas en IP/r, que evitan el riesgo de seleccionar resistencias relevantes en caso de incumplimiento y fracaso virológico.

Si se detecta una falta de adherencia debe intervenir de forma activa para corregirla. La monitorización de la adherencia no debe utilizarse para explicar un fracaso o el desarrollo de resistencias, sino para prevenir que éstos se produzcan mediante la detección precoz de los problemas e implementar rápidamente medidas correctoras⁵⁰⁸. A modo de ejemplo, cuando se analizó la adherencia fármaco por fármaco, en lugar de hacerlo de forma global, se detectó que en un 30 % de los pacientes tenía falta de adherencia diferencial, es decir a alguno de los componentes del tratamiento y esta falta de adherencia se relacionó con fracaso virológico⁵⁰⁹. La coformulación de fármacos simplifica el TAR y podría prevenir y corregir este problema, mejorando la adherencia global⁵¹⁰ e impidiendo la adherencia selectiva en pacientes que reciben tratamiento triple. De este modo se reducen las posibilidades de selección de resistencias por monoterapia encubierta.

Las estrategias son múltiples, algunas basadas en teorías psicológicas y la mayoría dirigidas a paliar los condicionantes sociales o individuales de los pacientes. Desde esta perspectiva cabe analizar las intervenciones sobre adherencia mediante las denominadas “entrevistas motivacionales”⁵¹¹, las visitas domiciliarias y la intervención específica sobre la pareja del paciente, todas ellas relativamente complejas, sin resultados definitivos y sin grandes diferencias frente al grupo control asesorado acorde a una buena práctica clínica. Las intervenciones dirigidas a ciertas poblaciones especiales – mujeres, latinos en EEUU, y pacientes con historia previa de alcoholismo – no han logrado mejorar la adherencia al tratamiento⁴⁸⁹.

Las intervenciones sencillas de educación y soporte en aspectos prácticos del tratamiento han demostrado ser beneficiosas⁵¹². Probablemente la intervención que ha demostrado mayor eficacia ha sido el soporte interpersonal estructurado, en el que personal sanitario entrenado emplea estrategias individualizadas.

Respecto al tratamiento directamente observado (TDO), en un metaanálisis de 17 estudios se ha demostrado que incrementa la probabilidad de conseguir CVP indetectable (*HR* 1,24; IC 95%, 1,08 a 1,41), mayor incremento de CD4, y adherencia >95%. Este beneficio es incluso mayor cuando se aplica a determinadas poblaciones con grandes dificultades para un cumplimiento óptimo, como usuarios de drogas o en prisiones, pero no parece mantenerse a largo plazo tras cesar la intervención⁵¹³.

La adhesión al tratamiento puede decaer con el tiempo y por tanto las estrategias diseñadas para optimizarla deben dirigirse no sólo a incrementarla sino a mantenerla constante⁵¹⁴.

GESIDA y el PNS, conjuntamente con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria⁸ han revisado los factores que influyen en la adherencia, los métodos de evaluación y las posibles estrategias de intervención y actuación de un equipo multidisciplinar que debe ser integrado por médicos, farmacéuticos, enfermeras, psicólogos y personal de soporte. Remitimos a ese documento para profundizar en el tema de la adherencia al TAR.

Recomendaciones sobre adherencia

- Antes de iniciar el TAR se debe preparar al paciente, identificar y corregir las causas que pueden limitar su adherencia. Si el paciente no está preparado, en general es mejor retrasar el inicio del TAR **(nivel C)**
- Una vez iniciado el TAR se recomienda efectuar un primer control a las 2-4 semanas para corregir los factores inherentes al tratamiento o del propio paciente que puedan limitar la adherencia **(nivel C)**
- Si la adherencia es correcta, debe monitorizarse y reforzarse, coincidiendo con las visitas clínicas **(nivel C)**
- El control de la adherencia debe realizarse por un equipo multidisciplinar, y en él deben estar implicados no sólo el médico sino también la enfermería, los profesionales de apoyo psicológico y la farmacia hospitalaria **(nivel C)**
- Cada unidad asistencial debiera realizar un seguimiento periódico de la adherencia, no sólo con vistas a detectar las faltas individuales de cumplimiento sino para conocer la magnitud del problema en su ámbito de trabajo; el análisis de los datos permitirá determinar las causas de los problemas detectados (abandonos, vacaciones terapéuticas, incumplimientos...) y elaborar estrategias concretas de actuación, tanto con los enfermos como en la estructura y funcionamiento del equipo asistencial **(nivel C)**
- En pacientes con cumplimiento irregular es preferible utilizar pautas basadas en IP/r frente a las que se basan en NN para dificultar la selección de resistencias **(nivel C)**

7. EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

Los FAR pueden producir numerosos efectos secundarios que se presentan al inicio del tratamiento o a medio-largo plazo. En este último caso suelen asociarse a procesos fisiológicos o comorbilidades relacionados con el envejecimiento. Algunos de ellos son específicos de fármacos y otros de grupo. En las tablas 11-15 se muestra la toxicidad característica de cada familia y se resume la toxicidad por órganos y aparatos, la patogenia, la relación individual con cada fármaco, el diagnóstico y el tratamiento de los mismos. A continuación se comentan los que, por su frecuencia y/o potencial gravedad, tienen mayor relevancia clínica.

Toxicidad mitocondrial

En la Tabla 11 se exponen los posibles efectos adversos debidos al daño mitocondrial producido por la inhibición de la enzima ADN-polimerasa mitocondrial. El más grave de ellos, una combinación de acidosis láctica y esteatosis hepática (ALEH), es inducido por d4T y, en menor medida, por ZDV y ddl. Su incidencia es baja, pero si no se diagnostica a tiempo puede ser mortal⁵¹⁵. Las manifestaciones clínicas, subagudas e inespecíficas (astenia, disnea e insuficiencia hepática), o la acidosis aparecen cuando el lactato es >5-10 mmol/L. Debe tenerse un alto grado de sospecha y realizar el diagnóstico antes de que aparezca acidosis, pues en esta fase (hiperlactatemia asintomática) la mortalidad es muy inferior a la de la ALEH. Su tratamiento consiste en retirar los AN responsables y monitorizar los niveles plasmáticos de lactato.

La lipoatrofia, aunque también es secundaria a toxicidad mitocondrial, se comenta en el apartado de anomalías de la distribución de la grasa corporal⁵¹⁶.

Reacciones de hipersensibilidad

Aunque todos los FAR pueden provocar RHS, que son mucho más frecuentes con ABC y los NN (la RHS a ABC se ha descrito más arriba)^{111, 517}.

Las RHS frente a los NN suelen presentarse con un exantema cutáneo y rara vez con un cuadro sistémico grave o con síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica (Tabla 12).

Hepatotoxicidad

Es, junto al exantema, el efecto adverso específico de grupo más importante de los NN, si bien su intensidad suele ser leve o moderada y son raros los casos de hepatitis sintomática. NVP provoca elevación de transaminasas con mayor frecuencia y se desaconseja su uso en mujeres con >250 CD4/μL y varones con >400 CD4/μL debido a un mayor riesgo de hepatotoxicidad grave^{433, 435}. No obstante, parece ser que los pacientes pre-tratados, especialmente en el contexto de una simplificación del TAR, tienen un riesgo similar al de los pacientes que nunca llevaron TAR con inmunodepresión más profunda^{432, 518} lo que ha llevado a un cambio en la ficha técnica

de NVP. Los IP potenciados que se usan actualmente y los FAR de otras familias tienen unas tasas de hepatotoxicidad más reducidas que los NN⁵¹⁹⁻⁵²¹ (Tabla 12).

Trastornos neuropsiquiátricos

EFV produce diversos síntomas neuropsiquiátricos (mareo, somnolencia, insomnio, sueños vívidos, confusión, ansiedad, despersonalización, etc.) en más del 50% de los casos, los cuales, aunque suelen remitir en las primeras 2-4 semanas, obligan a interrumpir el tratamiento en un pequeño porcentaje de los casos^{522, 523} (Tabla 12). Se aconseja evitar este fármaco en pacientes con trastornos psiquiátricos mayores, aunque en un estudio aleatorizado el riesgo de depresión fue similar con EFV que con los IP⁵²⁴. Aunque otros FAR, como ZDV, pueden provocar síntomas neurológicos, éstos son mucho menos frecuentes y predecibles que los de EFV.

Nefrotoxicidad

TDF puede inducir toxicidad renal en una pequeña proporción de pacientes. Su incidencia en estudios de cohorte^{525, 526} es mayor que la observada en ensayos clínicos, en los que solamente se ha encontrado una reducción discreta ($\approx 10\%$) y no progresiva del filtrado glomerular^{216, 527}. Esta complicación consiste en una disfunción tubular y se manifiesta como un síndrome de Fanconi acompañado de una disminución del filtrado glomerular⁵²⁸. Es más frecuente cuando coincide con otros factores de riesgo (insuficiencia renal previa o concomitante, diabetes, hipertensión arterial, fármacos nefrotóxicos, edad avanzada, bajo peso corporal y cifras bajas de CD4)^{214, 216, 219, 528, 529}. La nefrotoxicidad por TDF suele revertir al retirar el fármaco, aunque la reversión puede no ser completa⁵³⁰. IDV y ATV, éste último con mucha menor frecuencia, producen nefrolitiasis por depósito tubular de cristales (Tabla 12).

Trastornos metabólicos y riesgo cardiovascular

Este grupo de trastornos incluye dislipemia, resistencia a la insulina y diabetes mellitus, todos los cuales son más frecuentes con los IP clásicos que con los IP potenciados actualmente utilizados y con los análogos de timidina que con los demás AN. Asimismo, todas estas anomalías son más comunes en los pacientes con redistribución de la grasa corporal.

La dislipemia caracterizada por aumento de los niveles plasmáticos de colesterol total, colesterol-LDL y, sobre todo, triglicéridos, es la anomalía metabólica que con mayor frecuencia se asocia al TAR. Aunque tradicionalmente se ha relacionado esta dislipemia con los IP, no todos ellos tienen el mismo impacto sobre los lípidos y otros FAR, especialmente los análogos de timidina, también inducen dislipemia^{257, 272, 531-533}. ABC o la formulación a dosis fija ABC/3TC aumenta los lípidos plasmáticos mientras que TDF o la formulación a dosis fija TDF/FTC los disminuye, aunque el cociente colesterol total/colesterol-HDL se mantiene por igual con ambos^{225, 534}. Respecto a los IP, diversos ensayos clínicos han revelado que ATV, y FPV, sobre todo sin potenciar, tienen un mejor perfil lipídico; ATV/r, SQV/r (1500/100 BID ó 1500/100 QD) y DRV/r (600/100 BID u 800/100 QD) presentan perfiles intermedios; mientras que FPV/r (1400/100 QD o 700/100 BID), LPV/r (400/100 BID) y TPV/r (500/200 BID) tienen perfiles más

desfavorables, sobre todo en lo que respecta a los triglicéridos^{233, 269, 273, 308, 313, 314, 353, 449, 535-538}. El manejo de la dislipemia se comenta en las tablas 13-15⁵³⁹⁻⁵⁴³.

Los IP pueden disminuir la disponibilidad de la glucosa periférica y la secreción pancreática de insulina de forma aguda y pueden descompensar o desencadenar una diabetes en pacientes ya diabéticos o en personas predispuestas a serlo. En general, estas alteraciones no se mantienen a medio-largo plazo, por lo que deben existir mecanismos compensadores de las mismas^{544, 545}. IDV y RTV a dosis plenas son los que se han relacionado con el desarrollo de resistencia a la insulina⁵⁴⁶⁻⁵⁴⁸, mientras que los demás IP parecen tener poco o ningún efecto clínicamente significativo sobre la homeostasis de la glucosa. La diabetes mellitus es menos común (Tabla 14) y su asociación con los IP no es constante en todos los estudios^{544, 546, 548}. El tratamiento con análogos de la timidina (en particular d4T) y ddl, constituye un factor de riesgo para el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes mellitus⁵⁴⁹. Los inhibidores de la integrasa y los antagonistas del CCR5 tienen un perfil metabólico favorable^{277, 550}.

Al igual que en la población general, los factores de riesgo tradicionales son los que determinan principalmente el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en los pacientes infectados por el VIH. En éstos, no obstante, la infección por VIH no controlada y ciertos regímenes de TAR incrementan también dicho riesgo, aunque es muy probable que la contribución de estos últimos sea menor que la de los otros factores anteriormente mencionados. Aunque algunos estudios de cohortes han puesto de manifiesto que la duración del tratamiento con IP es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cardiopatía isquémica⁵⁵¹⁻⁵⁵³, otros, en su mayoría retrospectivos y con poco tiempo de seguimiento, han obtenido resultados contrapuestos⁵⁵³⁻⁵⁵⁶. El efecto sobre el riesgo cardiovascular de los IP como familia está mediado, al menos en parte, por la dislipemia asociada con el uso de estos fármacos. Además, un análisis de la cohorte D:A:D ha revelado que determinados IP (IDV, LPV/r) están relacionados con un mayor riesgo de infarto de miocardio, que no puede ser exclusivamente justificado por dicha anomalía metabólica⁵⁵⁷. Este mismo estudio ha mostrado también que el uso reciente (últimos seis meses) de ABC o ddl se asocia con un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio, especialmente en los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular más elevado⁵⁵⁷. No obstante, la relación entre ABC e infarto de miocardio es un motivo de controversia, pues, aunque ha sido constatada también en el estudio SMART²³¹ y en sendos estudios de casos y controles^{558, 559}, ni un análisis conjunto de 52 ensayos clínicos aleatorizados que incluían un brazo de tratamiento con ABC²³² ni otros ensayos clínicos y estudios de cohorte han observado tal asociación⁵⁶⁰⁻⁵⁶² así como tampoco ninguna relación de ABC con potenciales mecanismos patogénicos que pudieran explicarla⁵⁶³⁻⁵⁶⁵. La controversia existente pone de manifiesto que no es posible controlar de forma adecuada posibles sesgos en los estudios que han implicado a ABC o ddl y ponen en duda la contribución causal de los mencionados AN en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular.

Anomalías de la distribución de la grasa corporal

El síndrome de lipodistrofia se caracteriza por la presencia, combinada o no, de pérdida de grasa periférica (lipoatrofia) y de acúmulo de grasa perivisceral y/o en abdomen, mamas y cuello (lipoacumulación). La lipoatrofia, el efecto adverso más

temido por los pacientes, se relaciona particularmente con los análogos de la timidina^{213, 214, 216, 219, 516, 531, 542, 543}. Aunque en su aparición pueden influir múltiples factores, las pautas con d4T y ZDV (particularmente junto con IP clásicos y EFV) han evidenciado un mayor riesgo de lipoatrofia y su sustitución por ABC o TDF o por pautas sin AN se asocia a una mejoría de la misma^{216, 219, 527, 529, 531, 537, 540-543} (Tabla 12). Los resultados de dos estudios comparativos entre EFV y LPV/r sugieren que el uso de EFV puede asociarse a una mayor pérdida de grasa subcutánea en comparación con LPV/r cuando el régimen incluye análogos de timidina^{402, 566}. Esta diferencia no se observa en el estudio ACTG 5224s (subestudio metabólico del ACTG 5202) que compara EFV con ATV/r asociado a 2 AN (ABC/3TC o FTC/TDF) en el que hay una ganancia global de grasa, pero hasta el 16,3% tiene una pérdida de grasa igual o superior al 10%, pero sin diferencias en función del tratamiento⁵⁶⁷. El que no se haya observado lipoatrofia en otros ensayos en los que EFV tampoco se asociaba a análogos de timidina^{216, 219, 527, 537, 543}, indica que EFV no parece estar directamente implicado en un mayor riesgo de lipoatrofia. En la Tabla 15 se comentan la evaluación y opciones terapéuticas para las anomalías de la distribución de la grasa corporal⁵⁶⁸⁻⁵⁷¹.

Otros efectos adversos

La osteopenia y la osteoporosis son más frecuentes en los pacientes infectados por el VIH, pero se desconoce la importancia relativa de los distintos factores invocados como favorecedores de la misma, entre los que se incluyen el propio VIH y el TAR. Aunque el TAR podría jugar un papel patogénico en el desarrollo de estos trastornos los datos disponibles no son concluyentes^{572, 573}. Al iniciar el TAR hay un aumento de la osteopenia que posteriormente se recupera en parte. Se ha comparado el efecto de TDF y ABC sobre la densidad mineral ósea y el TDF produce mayor osteopenia de cadera^{567, 574}. La presunta relación entre el TAR y la osteonecrosis es aún más ambigua⁵⁷⁵.

Por último, EFV es teratogénico, por lo que está contraindicado su uso durante el primer trimestre de la gestación.⁵⁷⁶

Recomendaciones sobre efectos adversos del TAR

- Se debe monitorizar la tolerancia y las reacciones adversas agudas del TAR durante las primeras 2-4 semanas, particularmente en aquellos pacientes que tengan comorbilidades predisponentes o tomen concomitantemente otros fármacos cuyas interacciones puedan tener consecuencias clínicas, y llevar a cabo una eventual modificación del tratamiento según la gravedad de la reacción adversa y el fármaco implicado. Para ello debe facilitarse el contacto entre el paciente y los profesionales **(Nivel C)**
- Se deben evitar fármacos que puedan reagudizar o empeorar enfermedades preexistentes **(Nivel C)**
- Se recomienda monitorizar la glucemia y los lípidos plasmáticos (colesterol total, colesterol-HDL, colesterol-LDL y triglicéridos) **en ayunas** en cada visita de control **(nivel C)**^{541, 544, 577}
- Se recomienda calcular el riesgo cardiovascular al menos una vez al año **(nivel C)**

- Se recomienda efectuar un estudio elemental de orina con proteinuria y calcular la tasa de filtrado glomerular renal (fórmula MDRD o Cockcroft-Gault) en la primera visita y luego una vez al año si no hay factores de riesgo para el desarrollo de nefrotoxicidad o cada seis meses si éstos están presentes así como también antes de iniciar el TAR (**nivel A**)^{578, 579}. En los pacientes que ya reciben TAR se recomienda efectuar este estudio en todas las revisiones (**nivel B**), en especial si toman TDF (**nivel C**)⁵⁷⁹. Si el filtrado glomerular es <50 mL/min o hay proteinuria manifiesta no se deben usar TDF ni IDV y se deben ajustar las dosis o intervalos de los AN excepto ABC (**nivel C**)^{578, 579}. No se recomienda usar TDF en aquellos pacientes en los que el deterioro de la función renal sea agudo o esté directamente relacionado con este fármaco (**nivel C**)⁵⁷⁹

8. INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS Y FARMACODINÁMICAS

Las interacciones de los fármacos antirretrovirales (FAR) entre sí o con otros medicamentos constituyen un problema de primera magnitud en el tratamiento de los pacientes con infección por el VIH ya que sus consecuencias pueden tener una importante repercusión clínica⁵⁸⁰⁻⁵⁸³. Las más relevantes suelen ser las interacciones farmacocinéticas, especialmente a nivel del metabolismo de los fármacos. Diferentes sistemas enzimáticos están implicados en dicho metabolismo y en todos ellos pueden producirse interacciones. Los FAR son sustratos de uno o varios de estos sistemas enzimáticos y a la vez pueden comportarse como inductores y/o inhibidores de cualquiera de ellos. La inducción del metabolismo producirá una disminución de las concentraciones del fármaco en el lugar de acción, pudiendo disminuir la eficacia del tratamiento, mientras que la inhibición ocasionará un aumento de las concentraciones con un mayor riesgo de toxicidad. En general, la inducción se produce por un aumento de la síntesis proteica (enzimas), siendo un proceso lento que requiere días o semanas, mientras que la inhibición suele ser competitiva y se produce de manera rápida, dependiendo de la concentración del inhibidor, pudiendo aparecer los efectos tóxicos de los sustratos en pocas horas. Dado que ambos mecanismos son diferentes e independientes, algunos fármacos pueden ser inhibidores e inductores al mismo tiempo, predominando uno u otro efecto.

El sistema metabólico más importante es el citocromo P450 (CYP) y su principal isoenzima el CYP3A4. Muchos FAR, especialmente los IP y NN, y muchos otros fármacos que a menudo reciben los pacientes con infección por el VIH son inhibidores o inductores de diferentes isoenzimas de CYP. La potente inhibición enzimática que produce RTV se utiliza para potenciar la farmacocinética de otros IP (sustratos de CYP3A4), logrando concentraciones plasmáticas más eficaces y menos susceptibles al efecto inductor de otros fármacos (ej. NN) y al mismo tiempo pautas más simples, con menos restricciones dietéticas. Se están investigando nuevos potenciadores farmacocinéticos que carecen de eficacia antirretroviral, de los cuales el que se encuentra en fases más avanzadas de investigación es el cobicistat (GS-9350). La potenciación ejercida sobre ATV y DRV por 150 mg c/24h de cobicistat fue similar a la obtenida con 100 mg c/24h de RTV. Cobicistat se está desarrollando fundamentalmente como potenciador del nuevo inhibidor de la integrasa elvitegravir.

La formulación QUAD contiene en un sólo comprimido EVT 150 mg/GS-9350 150 mg/FTC 200 mg y TDF 300 mg⁵⁸⁴⁻⁵⁸⁸.

Otra vía metabólica es la conjugación de los FAR o de sus metabolitos procedentes de la oxidación del fármaco por el CYP. Diversos FAR son inductores o inhibidores del complejo enzimático de las uridindifosfato-glucuroniltransferasas (UDPGT) (glucuronización). A menudo los inductores del CYP son también inductores de la UDPGT y los inhibidores del CYP son inhibidores de la UDPGT, pero algunos inhibidores del CYP son inductores de la glucuronización y viceversa. Así, por ejemplo, RTV y, en menor medida, NFV inhiben varias subfamilias del citocromo P450 y son inductores de la UDPGT. La combinación TPV/r muestra un efecto inductor de la glucuronización. ATV inhibe ambos sistemas enzimáticos.

Cada vez están adquiriendo mayor protagonismo una serie de proteínas transportadoras transmembrana, tales como la glicoproteína-P (P-gp), capaces de alterar la biodisponibilidad de diversos FAR y su distribución por el organismo. Estas proteínas pueden ser inducidas o inhibidas por diversos fármacos. Habitualmente la inducción o la inhibición del CYP y de la P-gp van en el mismo sentido, pero al igual que sucede con la glucuronización ambos efectos pueden ser discordantes.

En las Tablas 5 a 9 se detallan las interacciones de los diferentes FAR:

- Los AN tienen pocas interacciones metabólicas. ZDV y ABC se glucuronizan. 3TC, FTC, d4T y TDF se eliminan principalmente por vía renal y son poco susceptibles de padecer interacciones metabólicas relevantes. Se ha descrito aumento del riesgo de toxicidad renal al asociar TDF a algunos IP/r⁵⁸⁹⁻⁵⁹⁵.
- En cuanto a los NN, NVP se comporta como inductor del CYP3A y del CYP2B6; EFV es fundamentalmente un inductor del CYP3A4 y de la UGT1A1⁵⁹⁶, aunque *in vitro* se comporta también como inhibidor de éste y de otros isoenzimas del CYP (CYP2C9, 2C19). ETR actúa como sustrato e inductor del CYP3A4 y como inhibidor del CYP2C9 y 2C19^{597, 598}.
- Por lo que respecta a los IP, RTV es un potente inhibidor de los isoenzimas CYP3A4, 2D6 y también tiene un efecto inductor de varios isoenzimas del CYP (1A2, 3A4, 2B6, 2C9, 2C19)⁵⁹⁹, así como de la glucuronización; además es capaz de autoinducir su propio metabolismo. NFV es inhibidor del CYP3A4 y de forma más débil de CYP2C19, 2D6, 1A2 y 2B6; en cambio, es inductor de la glucuronización. IDV es un inhibidor del CYP3A4. SQV es un inhibidor débil del CYP3A4. FPV puede ser inhibidor o inductor del CYP3A4. LPV/r inhibe el CYP3A4 *in vitro* y, en menor proporción, el CYP 2D6; *in vivo* induce su propio metabolismo, los CYP2C9 y 2C19⁶⁰⁰ y la glucuronización. ATV es inhibidor del CYP3A4 y de la UDPGT1A1 (enzima encargado de la glucuronización de la bilirrubina). TPV/r *in vivo* y en estado de equilibrio es un inductor de CYP2C9, CYP1A2 y de la glucuronización e inhibidor del CYP3A4 y 2D6⁶⁰¹. Respecto a su efecto sobre la P-gp, los datos sugieren que el efecto neto de la combinación TPV/r en estado de equilibrio es de inducción leve de la P-gp. Debido al efecto antagónico de inhibición del CYP3A4 e inducción de la P-gp, es difícil predecir el efecto neto de TPV/r sobre fármacos que sean sustratos de ambos.
- Inhibidores del correceptor CCR5. MVC es sustrato de CYP3A4, pero no es inhibidor ni inductor⁶⁰². Los inhibidores e inductores de CYP3A4 alteran los parámetros

farmacocinéticos de MVC, recomendándose cambios en su dosis (Tabla 8). En general se ajustarán las dosis como sigue: 150 mg BID cuando se administra con inhibidores del CYP3A4 como por ejemplo IP/r (con excepción de TPV/r y FPV/r); 600 mg BID cuando se administra con fármacos inductores como EFV o rifampicina (con excepción de NVP), en ausencia de inhibidores potentes, en cuya presencia predomina el efecto inhibitor y se administrarán 150 mg BID; 300 mg BID con otros fármacos (incluyendo TPV/r y FPV/r)⁶⁰²⁻⁶⁰⁵.

- Inhibidores de la integrasa. RAL no es sustrato ni influye en la actividad del CYP. Se metaboliza por glucuronización, sin inhibir ni inducir esta enzima. Los inhibidores e inductores de UGT1A1 modifican los parámetros farmacocinéticos de RAL, pero en la mayoría de los casos no se recomienda cambio en su dosificación por su amplio margen terapéutico (Tabla 8)⁶⁰⁶⁻⁶⁰⁹.
- Inhibidores de la fusión. ENF se metaboliza a través de las vías catabólicas de las proteínas y aminoácidos. No es sustrato ni influye en la actividad de ninguno de los sistemas metabólicos de los otros FAR. No es susceptible de presentar interacciones metabólicas relevantes.

En las tablas 6 a 8 se especifican las dosis de los FAR cuando se administran en combinación con otros FAR^{595, 610-635}, antituberculosos⁶³⁶⁻⁶⁵³, metadona⁶⁵⁴⁻⁶⁶², estatinas⁶⁶³⁻⁶⁷², fármacos para el tratamiento de la hepatitis C⁶⁷³⁻⁶⁸⁰, otros fármacos^{583, 623, 681-723}, productos naturales⁷²⁴⁻⁷²⁸ y asociaciones contraindicadas o no recomendadas)*. Debido a que la información científica relacionada con los FAR se renueva constantemente, se recomienda consultar la ficha técnica y la información actualizada de las compañías farmacéuticas y las autoridades sanitarias.

En la tabla 16 se especifican los ajustes de dosis de los FAR en caso de insuficiencia renal, hemodiálisis o diálisis peritoneal o insuficiencia hepática⁷²⁹⁻⁷⁷³.

Algunas interacciones farmacodinámicas son de interés, como el antagonismo en la fosforilación intracelular que se produce entre ZDV y d4T. Desde el punto de vista de la coinfección con el VHC tiene interés conocer que ribavirina ha mostrado antagonismo *in vitro* con ZDV y d4T. Sin embargo en el subestudio farmacocinético del APRICOT esta interacción no se produjo *in vivo*.

La ribavirina y ddl producen toxicidad mitocondrial. Su incidencia se multiplicó por 5 en comparación con uso de ribavirina y otros AN. Tres de los 23 casos comunicados a la FDA fueron mortales, por lo que se recomienda evitar esta asociación. En lo posible se evitará también el uso simultáneo de ribavirina con ZDV o d4T por toxicidad hematológica o mitocondrial.

Recomendaciones sobre interacciones medicamentosas

- Se debe reseñar en la historia clínica todos los medicamentos, productos naturales y medicinas alternativas, para evaluar posibles interacciones
- Se deben tener en cuenta las contraindicaciones y realizar los ajustes de dosis correspondientes cuando sea necesario

* Se han incluido solamente las referencias sobre interacciones de los últimos 3 años, el resto pueden consultarse en la página web <http://www.interaccioneshiv.com>

- Se debe considerar la monitorización de los niveles plasmáticos cuando se administren dos o más fármacos con posibles interacciones farmacocinéticas relevantes para evitar toxicidad o ineficacia terapéutica **(nivel C)**

9. HEPATOPATIA CRONICA Y TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

La hepatopatía crónica por virus de la hepatitis es la comorbilidad más relevante que presentan los sujetos infectados por el VIH en España por su frecuencia, por la progresión a enfermedad hepática terminal y por aumentar la hepatotoxicidad del TAR.

9. 1. Infección VIH, TAR e historia natural de la hepatitis crónica por VHC y VHB

En pacientes coinfectados por VIH y virus hepatotropos la buena situación inmunológica, el control de la replicación viral del VIH y el recibir TAR se asocian con un mejor pronóstico global, menor velocidad de progresión de la enfermedad hepática y menor riesgo de complicaciones y muerte por causa hepática⁷⁷⁴⁻⁷⁸¹. Se ha descrito la capacidad del VIH para infectar células estrelladas hepáticas y promover su activación con incremento de la síntesis de colágeno, lo que sugiere que la replicación del VIH puede contribuir directamente al mayor desarrollo de la fibrosis hepática en pacientes coinfectados⁷⁸². Por ello, aun en ausencia de ensayos clínicos o estudios de observación prospectiva que valoren el impacto del TAR en la evolución de la fibrosis hepática en cohortes de pacientes coinfectados, las evidencias anteriormente descritas respaldan el control precoz de la replicación del VIH y el mantenimiento de una buena situación inmunológica en estos pacientes.

Recomendaciones sobre VIH, TAR e historia natural de las hepatitis

- En pacientes coinfectados por el VHC se debe recomendar el inicio de TAR independientemente de la cifra de linfocitos T CD4+ individualizando la decisión en función de variables virológicas, histológicas y de motivación del paciente **(nivel C)**
- En pacientes coinfectados por el VHB el TAR se debe iniciar independientemente de la cifra de linfocitos T CD4 **(nivel C)**

9. 2. Toxicidad hepática de los FAR en pacientes con hepatopatía

La toxicidad hepática se ha descrito con todas las familias de FAR aunque con incidencia y mecanismos patogénicos diferentes⁷⁸³⁻⁷⁸⁶. La incidencia real es difícil de estimar por problemas metodológicos⁷⁸⁷. En primer lugar el diagnóstico de toxicidad hepática por un fármaco implica una relación temporal y la exclusión de otras causas de elevación de enzimas hepáticas (EEH) y estos criterios no se cumplen en la mayoría de pacientes coinfectados por VIH y VHC/VHB con EEH. En segundo lugar, la definición de los distintos grados de hepatotoxicidad no es uniforme. En los ensayos clínicos se suele definir como hepatotoxicidad grave a una elevación mayor de 5 veces el límite superior de la normalidad de ALT y/o AST⁷⁸⁸. Sin embargo esta definición está limitada al no considerar el fallo hepático, no tener en cuenta la hepatotoxicidad colestásica o mixta y ser más sensible para detectar hepatotoxicidad en pacientes con valores

basales de transaminasas elevados. Para resolver este último problema se acepta considerar EEH grave asintomática a los incrementos de ALT y/o AST superiores a 3,5 veces la cifra basal para los pacientes con de niveles elevados transaminasa basales⁷⁸⁹.

En pacientes infectados por el VIH la coinfección por VHC/VHB aumenta de 2 a 10 veces las posibilidades de desarrollar EEH durante el TAR, aunque el desarrollo de fallo hepático debido a la hepatotoxicidad por TAR es raro, y generalmente sucede en pacientes con hepatopatía avanzada subyacente. La incidencia de hepatotoxicidad aumenta en pacientes con hepatopatía previa⁷⁸⁹⁻⁷⁹¹. De este modo en pacientes coinfectados por VIH/VHC tratados con TAR, la frecuencia de EEH grave asintomática es superior en los que presentan una fibrosis avanzada (estadios F3 y F4, F \geq 3)⁷⁹².

En pacientes coinfectados por VIH y VHC el tratamiento de la hepatitis C reduce de modo notable el riesgo de toxicidad hepática^{793, 794}.

Recomendaciones sobre hepatotoxicidad de los FAR en las hepatitis

- No se puede contraindicar ningún FAR en caso de coinfección con VHC o VHB si la función hepática está preservada (**nivel B**), pero se debe priorizar el uso de FAR con el menor potencial de hepatotoxicidad (**nivel C**)⁷⁸³⁻⁷⁸⁶
- Se debe retirar el TAR en caso de hepatitis sintomática, y en la asintomática si se sospecha que se debe a toxicidad mitocondrial, reacción de hipersensibilidad o hipertransaminemia grado 4 (**nivel C**)^{785, 786}
- En caso de hepatitis asintomática con hipertransaminemia grado 3, se debe considerar la suspensión del TAR en función de la situación clínica, inmunológica y virológica, de los fármacos utilizados y de la historia previa de exposición a FAR (**nivel C**)^{785, 786}

9. 3. Uso de antirretrovirales en pacientes con hepatopatía

La hepatopatía crónica puede alterar el metabolismo y la biodisponibilidad de los FAR con incremento de toxicidad o alteración de la actividad antiviral^{731, 755, 764, 795-799}. Se sabe que la hepatitis crónica sin insuficiencia hepatocelular es una situación muy frecuente y la experiencia acumulada sugiere que se pueden usar los FAR a las dosis habituales y que su eficacia no está comprometida. Sin embargo en la insuficiencia hepatocelular se reduce el metabolismo de fármacos vía P450 y la glucuronoconjugación. No hay datos sobre el TAR en casos de hepatitis aguda.

Recomendaciones sobre uso de FAR en hepatopatías

- Se debe evaluar el grado de fibrosis hepática y el grado de función hepática en los pacientes coinfectados por virus hepatotropos ya que pueden condicionar la elección del TAR, las dosis prescritas de los FAR y la estrategia de monitorización de su eficacia y toxicidad (**nivel C**)⁷⁸⁹⁻⁷⁹²
- Los FAR se pueden usar a las dosis habituales en caso de hepatitis crónica sin insuficiencia hepatocelular o con insuficiencia hepatocelular leve (Child A) extremando la vigilancia por el mayor riesgo de toxicidad (**nivel B**)^{731, 755, 764, 795-799}

- En caso de hepatopatía crónica con signos de insuficiencia hepatocelular se deberá ajustar la dosis de los fármacos, idealmente mediante la determinación de niveles plasmáticos, o en su ausencia, mediante las recomendaciones de la Tabla 16 **(nivel C)** ^{731, 755, 764, 795-799}
- En caso de hepatitis aguda grave debe interrumpirse el TAR y reintroducirlo una vez superado el problema **(nivel C)** ^{731, 755, 764, 795-799}

9. 4. TAR en pacientes en tratamiento de la hepatitis por virus C

El tratamiento recomendado de la hepatitis crónica por VHC en pacientes coinfectados por el VIH es la combinación de interferón pegilado y ribavirina⁸⁰⁰⁻⁸⁰⁸. Por otro lado, se han descrito brotes de hepatitis aguda C en homosexuales infectados por VIH⁸⁰⁹⁻⁸¹², para cuyo tratamiento se recomienda interferón pegilado, en caso de que la viremia C persista detectable a las 12 semanas⁸¹³⁻⁸¹⁶. La duración óptima del tratamiento en ambos casos está por definir⁸¹⁵. Un aspecto importante cuando se inicia tratamiento con interferón y ribavirina en pacientes coinfectados es la selección de los FAR. Estos pueden contribuir al incremento del riesgo de los efectos adversos por la vía de toxicidades aditivas o sinérgicas como por ejemplo anemia y/o neutropenia si se utiliza zidovudina^{817, 818}, aumento de la toxicidad mitocondrial con la didanosina y la estavudina⁸¹⁹⁻⁸²¹ pancreatitis, acidosis láctica y descompensación de la cirrosis con didanosina⁸²⁰⁻⁸²³. Un segundo mecanismo potencial por el que los AN pueden influir el tratamiento de la hepatitis C es por la vía de interferencia con la acción de la RBV frente al VHC. En este contexto, el uso de abacavir se ha visto asociado a una menor respuesta al tratamiento con interferón pegilado y RBV en algunos estudios⁸²⁴⁻⁸²⁶, pero no en otros^{673, 827, 828}.

Los niveles plasmáticos de EFV aumentan en pacientes cirróticos por encima del dintel de toxicidad del sistema nervioso central en un alto porcentaje de pacientes^{731, 829} por lo que, si se usa EFV en este escenario, debería hacerse con monitorización de niveles de fármaco, para evitar la sobreexposición al mismo. Por último se ha comunicado que una sustancial proporción de pacientes en tratamiento estable con ATV experimentan hiperbilirrubinemia e ictericia tras el inicio de tratamiento para la hepatitis C con interferón más ribavirina. Este hecho podría ser debido al incremento de bilirrubina asociado a la hemólisis por ribavirina y al compromiso del normal aclaramiento de bilirrubina debido a la inhibición competitiva de ATV⁸³⁰.

Recomendaciones sobre tratamiento simultáneo del VIH y VHC

- El TAR no debe iniciarse simultáneamente con el tratamiento del VHC **(nivel C)**⁸¹⁶
- Cuando se traten simultáneamente el VIH y el VHC, debe realizarse un seguimiento estrecho del paciente para detectar reacciones adversas **(nivel B)** ^{815, 831, 832}
- No se debe asociar la ribavirina con ddl **(nivel B)**⁸¹⁶
- Se evitará el uso simultáneo de ribavirina con ZDV **(nivel B)**⁸¹⁶

9. 5. Tratamiento de la hepatitis crónica B en pacientes coinfectados

Los FAR activos frente al VIH y al VHB son 3TC, FTC y TDF^{781, 833-841}. Si alguno de ellos se retirara de un TAR que fracasase puede originar en coinfectados por VHB un rebrote del virus con daño hepatocelular⁸⁴². El tratamiento de la hepatitis por VHB con 3TC o FTC en monoterapia facilita la aparición de resistencias al VIH⁸³⁶⁻⁸⁴¹. Entecavir, fármaco activo frente al VHB, ha demostrado actividad frente a VIH y capacidad para inducir igualmente mutaciones, como la M184V^{836, 838}.

Recomendaciones sobre tratamiento hepatitis B en infectados con VIH

- Se recomienda iniciar el TAR usando la asociación de TDF + FTC (o 3TC) como AN en pacientes coinfectados que requieran tratamiento de VIH o VHB **(nivel C)**^{781, 838}
- Si se requiere tratamiento del VHB y se decide no tratar el VIH se recomienda usar fármacos que no induzcan resistencias al VIH **(nivel C)**^{781, 838}
- No debe usarse entecavir en pacientes infectados por el VIH salvo que su replicación esté controlada con otros fármacos **(Nivel B)**^{781, 838}
- En pacientes coinfectados en los que por cualquier motivo se suspenda 3TC, FTC o TDF, se debe incluir en el TAR otro fármaco con actividad anti-VHB **(nivel C)**^{781, 838}

10. TAR EN LA MUJER, EN EL EMBARAZO Y COMO PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO-FETAL

Más del 50% de la población mundial infectada por el VIH son mujeres. En Europa están aumentando las nuevas infecciones en la población femenina, sobre todo por vía sexual y en los estratos sociales más desfavorecidos, como en los inmigrantes⁸⁴³. En España, sin embargo, datos recientes de la cohorte CoRis, muestran una discreta disminución (24,3%) en los nuevos casos, aunque confirman cambios en los patrones de infección, afectando especialmente a la población inmigrante⁸⁴⁴.

Las incógnitas por resolver son muchas dado que las mujeres no han sido incorporadas a los ensayos clínicos hasta 1993 y aún en los más recientes su número no sobrepasa el 30%. Las diferencias biológicas y de composición corporal, por citar algunas, podrían suponer cambios tanto en la evolución de la enfermedad, como en la respuesta a la terapia o a las toxicidades farmacológicas que no han sido suficientemente exploradas^{845, 846}.

10.1 Consideraciones especiales del TAR en la mujer

Varios estudios de cohortes han descrito en las mujeres datos discordantes, *tanto* en los parámetros inmuno- virológicos, como en la progresión de la enfermedad⁸⁴⁷⁻⁸⁴⁹. No obstante, no han sido observadas diferencias por género en la eficacia de los fármacos⁸⁵⁰. El inicio y la elección del TAR en la mujer tienen las mismas indicaciones y objetivos que en el hombre, con la única salvedad del número de linfocitos CD4 (menor de 250 células/ μ L), si la combinación antirretroviral incluye NVP.

Existen, sin embargo, aspectos específicos de género que obligan a modificaciones en el TAR y deben ser tenidos en cuenta. Por un lado hay una mayor incidencia de ciertos efectos secundarios a los fármacos en las mujeres⁸⁴⁹ lo que conduce a un abandono

más frecuente del TAR³⁶¹. Y sobre todo, el potencial reproductivo de la mujer, en sus distintas etapas, condiciona una cuidadosa aproximación multidisciplinar, con el fin no solo de evitar la transmisión vertical, sino además la prevención de otras ETS, embarazos no deseados y comorbilidades específicas (infección por HPV y carcinoma de cérvix), y las alteraciones asociadas a la menopausia que se agravan con frecuencia por la infección por el VIH y con su terapia.

10.2 Diferencias en efectos adversos

La mayor incidencia de toxicidad farmacológica en las mujeres, descrita de forma casi unánime por los investigadores, y es, sin duda, un tema preocupante. A las evidencias aportadas por el grupo ICONA y otras cohortes⁸⁴⁵ se suman los resultados de Ensayos Clínicos como el FIRST⁸⁴⁸.

De sobra conocido y con reflejo específico en las directrices, es el incremento de la susceptibilidad femenina al exantema y la hepatotoxicidad grave con NVP^{849, 851}, la mayor incidencia de acidosis láctica, sobre todo durante el embarazo⁸⁵² y a la más intensa presencia de alteraciones metabólicas^{853, 854}, incluida la resistencia a la insulina⁸⁵⁵ y la redistribución grasa^{856, 857}, con características especiales en las mujeres, y mayor repercusión psicológica⁸⁵⁸.

También los efectos tóxicos del EFV sobre el SNC son más frecuentes en las mujeres y condicionan, en ocasiones, un abandono precoz de la terapia^{859, 860}. Además, no podemos olvidar que tanto la depresión como otros trastornos psiquiátricos son ya más comunes en las mujeres portadoras del VIH respecto a la población general^{861, 862}.

Teniendo en cuenta que la osteoporosis/ osteopenia, se asocia, entre otros factores, al bajo IMC e hipertrigliceridemia, más comunes en las personas VIH+, es comprensible el aumento de su prevalencia en esta población^{863, 864}. En las mujeres VIH+ la densidad ósea es menor que en las no portadoras del virus pero es clínicamente irrelevante en la pre menopausia⁸⁶⁵⁻⁸⁶⁷ cobrando mayor importancia en la postmenopausia⁸⁶⁵. Este aspecto no es baladí en una población que envejece, con mayor velocidad y con mayor concomitancia de factores de riesgo, que la de referencia, y puede determinar cambios en el TAR.

10.3 Otras diferencias de género que pueden afectar la eficacia del TAR

Han sido descritos peores resultados en cuanto a género, en relación a los objetivos del TAR³⁶¹. Podemos identificar, sin embargo, factores de confusión potenciales que explicarían parte de estas diferencias. Aspectos socio-culturales, (la desigualdad de la mujer en algunos sectores como inmigrantes, minorías étnicas, etc.), una superior incidencia de problemas psicológicos/ psiquiátricos, un mayor temor a la estigmatización, una excesiva preocupación por la confidencialidad... Todo lo cual, contribuye a dificultades en el acceso al sistema sanitario, al retraso en el inicio del TAR y a una peor adherencia.

10.4 Mujer en periodo fértil: interacciones con anticonceptivos hormonales

Aproximadamente el 70% de las mujeres que participan en estudios sobre el VIH son sexualmente activas, muchas de ellas en edad fértil. El uso del preservativo es el método de elección, tanto por su eficacia (con una tasa de fallos del 3%)⁸⁶⁸, como por prevención simultánea de otras ETS. En la práctica real, el uso de métodos anticonceptivos es variable y la anticoncepción hormonal puede ser más frecuente en

muchas pacientes debido a influencias culturales u otros factores. Además, en ocasiones son prescritos sin conocimiento del experto en VIH, por médicos de familia o ginecólogos desconocedores de los riesgos potenciales. Los métodos anticonceptivos hormonales e intrauterinos en general se han mostrado seguros en mujeres con infección VIH⁸⁶⁹⁻⁸⁷².

Aunque la anticoncepción hormonal no parece interferir en la progresión de la enfermedad, ni con la eficacia del TAR⁸⁷¹, muchos de los fármacos antirretrovirales de uso común, interaccionan⁸⁷³⁻⁸⁷⁹ con los anticonceptivos hormonales aumentando o disminuyendo los niveles en sangre del etinilestradiol y/o de noretindrona, conduciendo a la intensificación de su toxicidad (como por ejemplo el tromboembolismo), o a la disminución de su eficacia respectivamente, (para más detalles véase el capítulo de interacciones y tablas 5 a 9). Cuando se usan estos fármacos se recomienda la utilización de medios alternativos o adicionales de contracepción.

Debería considerarse el efecto del acetato de medroxiprogesterona depot (Depo-Progevera) en pacientes con osteoporosis establecida o con factores de riesgo para sufrirla, por su efecto negativo sobre la densidad mineral ósea⁸⁸⁰. Aunque, por razones no aclaradas, el uso de este fármaco se asocia en estudios epidemiológicos, con un mayor riesgo de adquisición de VIH en mujeres jóvenes (18-24 años)⁸⁸¹.

Hay muy pocos datos respecto a otros tipos de anticoncepción hormonal combinada (parches de larga duración, anillos vaginales con componente hormonal, etc.), por ello se recomienda también el uso de medios combinados de contracepción. También son pocos los estudios con el acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA), que no parece ver afectados sus niveles por el NFV, la NVP o el EFV^{882, 883}.

Recomendaciones sobre TAR en mujeres

- El inicio y los objetivos del TAR son los mismos en las mujeres que en los hombres **(Nivel A)**
- La mayor incidencia de toxicidades, como el exantema y la hepatotoxicidad por NVP condicionan modificaciones en su uso en mujeres (CD4<250 células/ μ L) **(Nivel A)**
- La prescripción de antirretrovirales debe tener en cuenta el uso actual o planificado de anticonceptivos. Los contraceptivos hormonales interaccionan con muchos fármacos antirretrovirales por lo que deben ser sustituidos o complementados por otros métodos anticonceptivos **(Nivel A)**

10.5 TAR en el embarazo y prevención de la transmisión materno-fetal

La transmisión materno-fetal es la causa de prácticamente la totalidad de los casos de infección por VIH en niños. El periodo fetal más vulnerable es durante la gestación temprana, por lo que todas las mujeres deben recibir información previa sobre la teratogenicidad de los fármacos como parte de su control clínico y adecuar el TAR ante el deseo de embarazo⁸⁸⁴.

A continuación se resumen las evidencias sobre las que se basan las recomendaciones del TAR en el embarazo y prevención de la transmisión vertical. Si se quiere más

información se aconseja la lectura de los documentos más amplios incluidos en la bibliografía^{884, 885}.

Se recomienda realizar la serología frente al VIH a todas las embarazadas independientemente de sus antecedentes epidemiológicos. El riesgo de transmisión vertical depende de varios factores (maternos, virales, placentarios, obstétricos, lactancia, fetales, neonatales, etc.) pero la CVP de la madre durante el embarazo y en el parto es el factor determinante, sin que exista un dintel mínimo que evite la transmisión⁸⁸⁶.

Ante una mujer infectada por el VIH, la prevención de la transmisión vertical se basa en los siguientes principios: el TAR, por baja que sea la CVP, el test de resistencias, el tratamiento con AZT endovenoso durante el parto, la cesárea programada (cuando la CVP es >1000 copias/mL, el tratamiento con AZT del niño durante 6 semanas y evitar la lactancia^{884, 887}.

El objetivo del TAR en el embarazo es conseguir y mantener CVP indetectable.

El test de resistencia genotípico está recomendado para todas las embarazadas antes de comenzar el TAR, así como para aquellas que, estando en terapia, tengan CVP detectable. En ocasiones, es necesario iniciar el TAR aún sin disponer del resultado del test, sujeto a modificación posterior, en el caso de que éste refleje mutaciones de resistencias a los fármacos elegidos⁸⁸⁴.

10.6 Consideraciones a tener en cuenta respecto al TAR

El embarazo en la mujer VIH+ es una situación excepcional que no debe impedir la optimización de la terapia, pero que implica unas elecciones específicas que afectan tanto a los fármacos y sus dosis (los niveles de algunos fármacos disminuyen en el segundo y tercer trimestre, por lo que pueden tener que ser aumentados, recomendándose su monitorización), al momento del inicio del TAR, a los efectos adversos por toxicidad durante el embarazo y a los potenciales riesgos para el neonato, muchos de los cuales son desconocidos con la mayoría de los fármacos.

Los datos de seguridad de los FAR para el feto son limitados (Tabla 17). De los datos disponibles, se puede destacar:

- 1) ZDV es segura al menos a corto y medio plazo, aunque un estudio sugirió riesgo de toxicidad mitocondrial en niños;
- 2) EFV es un fármaco potencialmente teratógeno, por lo que está contraindicado al menos durante el primer trimestre;
- 3) Es posible que los IP se asocien con bajo peso al nacer⁸⁸⁸ o prematuridad⁸⁸⁹;
- 4) La seguridad de otros fármacos es aún peor conocida, y aunque se catalogan como categoría "B" o "C" de la FDA (Tabla 17), los datos disponibles de seguridad, especialmente a largo plazo, son limitados. Se tiene escasa información de TDF, ATV, FPV e IDV y muy escasa de TPV, DRV, RAL⁸⁹⁰⁻⁸⁹², ETR y MVC. Por ello se deben evitar estos fármacos, salvo en pacientes embarazadas en fracaso, en cuyo caso deberemos orientarnos en función de la poca información disponible.

Existe un registro establecido en 1989 que recoge de forma prospectiva la prevalencia en malformaciones entre los expuestos durante el primer trimestre, que es del 2,9%, similar al de la población no expuesta (2,7%)⁸⁸⁹.

En cuanto a la madre, cabe reseñar que se han descrito casos de toxicidad mitocondrial y acidosis láctica en gestantes, las cuales pueden estar más predispuestas a esta complicación. Estos efectos secundarios se asociaron inicialmente a ZDV pero posteriormente se han descrito casos relacionados con d4T. La FDA ha comunicado tres muertes maternas por acidosis láctica y tres muertes fetales en mujeres tratadas con d4T y ddl como AN, por lo que desaconseja esta combinación. La acidosis láctica grave, no letal, se ha comunicado con otros AN⁸⁵². Además se ha descrito que la hepatotoxicidad por NVP sería 12 veces más frecuente en gestantes con CD4 >250 células/ μ L⁸⁹³.

La elección del TAR en la embarazada y sus particularidades se explica detalladamente en las directrices específicas nacionales o internacionales^{884, 885}.

Los datos disponibles de la eficacia de la cesárea programada (semana 38) como instrumento potencial para reducir la transmisión vertical sugieren que si en el momento del parto la CVP es <1000 copias/mL la cesárea electiva no disminuye el riesgo de transmisión del parto vaginal (0,8% frente a 0,7%)^{884, 893, 894}. La morbilidad relacionada con la cesárea en los países desarrollados no parece ser importante⁸⁹⁵. La lactancia está contraindicada.

Recomendaciones sobre TAR y gestación

- El test de VIH debe efectuarse a toda mujer embarazada (**nivel B**). Si hay prácticas de riesgo debe repetirse en el tercer trimestre (**nivel C**)
- En las mujeres que llegan al parto sin conocer su estado respecto al VIH, se debe hacer un test rápido, ya que la cesárea electiva reduce la transmisión un 50% (**nivel B**)
- El objetivo del TAR es conseguir CVP indetectable (**nivel B**). Uno de los fármacos a incluir en el TARGA, siempre que no haya resistencia o toxicidad severa previa documentadas, o dudas respecto a la adherencia si hay que cambiar de otro fármaco posológicamente más cómodo, debe ser ZDV que se administrará durante el embarazo, en el parto (vía endovenosa) y al recién nacido (**nivel A**)
- Debe ser realizado un test de resistencias en todas las mujeres VIH+ embarazadas sin TAR o en las que la CVP sea detectable (**nivel A**)
- Es fundamental planificar el control de la CVP antes del parto, hacia la semana 32-36 para decidir si se va a realizar cesárea electiva o no (**niveles B y C**)
- No deben utilizarse fármacos con riesgo teratogénico y deben evitarse, en la medida de lo posible, fármacos cuyo riesgo no es bien conocido (FPV, TDF, ATV, DRV, TPV, ENF, MVC, ETR y RAL) (**nivel C**)
- Se desaconseja la combinación de d4T+ddl por el riesgo de acidosis láctica (**nivel B**)
- Si no se consigue una CVP suficientemente baja (<1000 copias/mL) se debe indicar una cesárea programada en la semana 37-38 (**nivel A**)

11. PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH

La epidemia de la infección VIH sigue en expansión, se calcula que en el año 2009 hubo 2.600.000 nuevas infecciones⁸⁹⁶. A lo largo de las últimas décadas se han realizado múltiples intervenciones biomédicas para disminuir la transmisión del VIH. Se han conseguido algunos éxitos con los programas de intercambio de jeringuillas y tratamiento sustitutivo con metadona en los UDVP, así como la disminución de nuevas infecciones en un 50-60% en varones mediante la circuncisión masculina, la difusión del uso del preservativo, el control de las ETS, sobre todo del HSV, la espectacular disminución de la transmisión vertical, y la disminución de la transmisión en parejas serodiscordantes⁸⁹⁷⁻⁹⁰⁰.

Sin embargo, las actuaciones destinadas a lograr modificaciones de conducta no han logrado sus frutos, fundamentalmente por la diferente percepción del riesgo, sobre todo a nivel heterosexual en los países en vías de desarrollo y en los varones que realizan sexo con varones en los países desarrollados⁹⁰¹. Una de las principales dificultades en la disminución de la transmisión sexual del VIH se debe a la infección VIH aguda, que se asocia con una capacidad de transmisión hasta 26 veces superior, relacionado con las elevadas CVP comparada con la infección en el período asintomático⁹⁰². Sin embargo la detección precoz de la infección aguda es difícil en la práctica médica. Así mismo el diagnóstico tardío de la infección VIH en los países desarrollados contribuye a la transmisión sexual⁹⁰³.

Papel del TAR en prevención de la transmisión del VIH

Por las mismas razones que el TAR disminuyó la transmisión vertical del VIH de forma espectacular⁹⁰⁴, puede disminuir la incidencia de la transmisión heterosexual⁹⁰⁰. Así se ha visto como el TAR también disminuye la CVP en las secreciones genitales, y contribuirá a la reducción de la transmisión sexual. En un meta-análisis se observó un riesgo cero con una CVP <400 copias/mL. El riesgo de transmisión de una persona en TAR es de 0,5 por 100 personas/año y de un 5,6 por 100 personas/año de los pacientes no tratados²⁰⁹.

Varios estudios observacionales realizados en África han demostrado una disminución de la transmisión en un 80-92% en 6.374 parejas serodiscordantes tras el inicio de TAR en las personas infectadas^{905, 906} y que tiende a cero en una cohorte de Madrid⁹⁰⁷. En la actualidad se encuentra en marcha un estudio aleatorizado (HPTN 052) con 1.750 parejas discordantes para recibir TAR o no en pacientes con CD4: 350-500/ μ L. Este estudio pretende responder a las preguntas sobre el efecto de TAR precoz y la prevención en las parejas serodiscordantes durante 5 años⁹⁰⁸.

Estos datos sugieren que una difusión amplia de TAR podría reducir la transmisión por vía sexual. Un modelo matemático basado en la detección precoz de la infección, mediante una prueba universal voluntaria, y el inicio de TAR precoz en todas las personas recién diagnosticadas, mostró una disminución de la incidencia y de la mortalidad a <1 caso/1000 personas/año en 10 años⁹⁰⁹. Otro modelo similar realizado en San Francisco en varones con prácticas sexuales con varones, mostró una disminución del 91% en la incidencia en 10 años⁹¹⁰. Recientemente se han comunicado efectos beneficiosos indirectos de TAR en la comunidad. Tanto en San Francisco como en Vancouver se observó una relación entre la generalización del TAR y la disminución

de nuevos casos de infección VIH^{911, 912}. A nivel de Salud Pública, se deberá determinar el beneficio del TAR en la prevención de la transmisión del VIH en la comunidad^{913, 914}.

Profilaxis Pre-Exposición

En los últimos años se está desarrollando una intensa investigación sobre la profilaxis primaria con TAR, basada fundamentalmente en la evidencia de la eficacia de la profilaxis primaria en otras áreas médicas, como la malaria, tuberculosis, profilaxis antibiótica quirúrgica, y en estudios animales realizados sobre todo con TDF. Se ha diseñado una estrategia denominada profilaxis pre-exposición (PrEP) con TDF o con TDF/FTC, por vía oral o tópica, en grupos específicos con un elevado riesgo de transmisión, como trabajadores del sexo, mujeres y varones en parejas discordantes, varones que realizan sexo con varones y UDVP. Han sido incluidos 20.000 hombres y mujeres no infectados por el VIH en los diferentes estudios que finalizarán en los dos próximos años⁹¹⁵. Este año ha tenido una importante repercusión mediática la comunicación de la eficacia de TDF al 1% en gel, utilizado antes y después del coito, con una disminución de la incidencia de la transmisión del VIH en un 39% en mujeres de alto riesgo en Sudáfrica (estudio CAPRISA 004)⁹¹⁶. Otro estudio interesante compara la eficacia de TDF al 1% en gel usado diariamente frente a TDF/FTC por vía oral (estudio VOICE, Identificador en Clinicaltrials.gov NCT00705679). Un estudio de profilaxis pre-exposición publicado recientemente demostró que la pauta de TDF/FTC diaria por vía oral tenía una eficacia global del 44% frente a placebo en varones con relaciones homosexuales, aunque la adherencia al tratamiento era muy baja⁹¹⁷.

La PrEP puede ser una estrategia apropiada, pero precisará una valoración final después de la finalización de los estudios, aunque se perfila una dificultad en su implementación a largo plazo, sobre todo relacionado con los posibles cambios en las conductas sexuales, la adherencia, el desarrollo de resistencias y su coste-efectividad^{918, 919}. Con el actual estado de los conocimientos no pueden emitirse recomendaciones concretas.

Profilaxis post-exposición ocupacional

El uso de TAR tras una exposición profesional al VIH reduce el riesgo de transmisión del mismo, aunque se han documentado transmisiones a pesar de una PPE correcta con tres fármacos. El riesgo de transmisión del VIH tras exposición percutánea a sangre infectada oscila entre 0,24 a 0,65 % y es del 0,09% tras un contacto con mucosas o piel no intacta⁹²⁰. Los factores asociados a un mayor riesgo de transmisión del VIH son: pinchazo profundo (OR 15; IC 95%, 6,0 a 41), con sangre visible en el dispositivo (OR 6,2; IC 95%, 2,2 a 21), recién extraído de vena o arteria (OR 4,3; IC 95%, 1,7 a 12) en paciente fuente con enfermedad avanzada (OR 5,6; IC 95%, 2 a 16). La PPE con monoterapia (ZDV) reduce la transmisión un 81% (OR 0,19; IC 95%, 0,06 a 0,52)⁹²¹. No existen estudios comparados que permitan establecer recomendaciones firmes sobre el momento de inicio, la duración o los fármacos o combinaciones a emplear tras una exposición accidental.

Por modelos animales, y estudios de caso-control sabemos que la PPE es tanto más eficaz cuanto antes se inicie⁹²². Su duración no está establecida pero en modelos animales los periodos de 3 ó 10 días son menos eficaces que 28 días, por ello se ha

consensuado recomendar 4 semanas. No existen estudios que demuestren que la PPE con 3 fármacos sea mejor que con 2, aunque prevalece la opción de indicar triple terapia de modo similar al TAR de inicio. La elección de los FAR dependerá de los efectos adversos potenciales y de las preferencias de los sanitarios teniendo en cuenta que la intolerancia a los FAR entre el personal sanitario es muy elevada (50%)^{923, 924}.

Para establecer la necesidad de profilaxis debemos conocer el tipo de exposición y solicitar, tras consentimiento informado, serología rápida frente al VIH, VHB y VHC del paciente-fuente y del trabajador.

En las exposiciones que precisen profilaxis se recomienda un TAR que incluya dos AN, con un IP potenciado. En los casos que no pueda administrarse un TAR basado en IP, o que sea intolerante, la sustitución de éste por EFV, recordando que no puede administrarse en embarazadas, o la combinación de ZDV+3TC+TDF podrían ser buenas opciones^{210, 214, 923, 924}. La NVP no es aconsejable por las posible toxicidad cutánea o hepática⁹²⁵.

Las recomendaciones para la PPE ocupacional están bien implementadas en la mayoría de los países occidentales, sin embargo debemos recordar que el número de pacientes con infección VIH ha aumentado significativamente y probablemente también se incrementarán las exposiciones de los sanitarios al VIH. La transmisión ocupacional del VIH es muy rara y la evidencia muestra que la PPE modifica los riesgos de transmisión. Aunque conviene recordar que ninguna pauta de PPE será eficaz al 100%⁹²⁶. En el Reino Unido, un estudio reciente de la Health Protection Agency (HPA), mostró que en un 20% de casos con exposición manifiesta a pacientes con infección VIH no se realizó la PPE. El conocimiento de las recomendaciones por parte de los sanitarios era bueno, pero existían diferencias en la percepción del riesgo de la transmisión en los diversos estamentos sanitarios a la hora de iniciar una PPE tras una exposición⁹²⁷.

En caso de conocer o sospechar que el paciente fuente tiene un virus resistente, se deben seleccionar FAR sin resistencia cruzada. Se ha demostrado que una elevada proporción no desdeñable de virus de los casos fuente pueden presentar mutaciones de resistencia, especialmente a AN y NN⁹²⁸. MVC, RAL o T20 no se recomiendan para PPE, salvo en casos excepcionales de multiresistencia. El PNS/Gesida⁹²⁹ la European AIDS Clinical Society⁹³⁰, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC)⁹³¹ y otros organismos han actualizado las recomendaciones de tratamiento antirretroviral postexposición ocupacional y no ocupacional cuyo texto está disponible en sus respectivas páginas web.

El estado de New York ha realizado recientemente unas recomendaciones más estrictas, haciendo énfasis en el inicio de la PPE antes de las dos horas tras la exposición y no efectuarla más allá de las 36 horas. Recomiendan una pauta de tres FAR, tres AN para cualquier exposición significativa. En aras a mejorar la adherencia recomiendan utilizar las asociaciones coformuladas (TDF/FTC+ZDV o AZT/3TC+TDF), y utilizan los IP/r y NN en los usos alternativos⁹³².

A toda persona que se haya evaluado por PPE debe ofrecérsele un plan de seguimiento que incluirá información, apoyo psicológico y control de los posibles síntomas de primoinfección. Si se prescribió PPE se deben controlar dentro de las primeras 72 horas para revalorar la necesidad de profilaxis y conocer si el trabajador ha presentado reacciones adversas, interacciones y problemas de adherencia. Se programarán controles analíticos y serológicos a las 4 semanas y a los 3 y 6 meses.

Recomendaciones sobre profilaxis postexposición ocupacional

- Los servicios sanitarios deben disponer de un manual escrito sobre las actuaciones y derivaciones a seguir en el caso de exposición al VIH, profesional o no, con disponibilidad de diagnóstico serológico rápido y con accesibilidad de 24 horas a los fármacos utilizados en la PPE **(Nivel C)**
- Se debe valorar el caso fuente (VIH confirmado o sospechoso), el estado serológico de la persona expuesta y las características de la exposición para indicar la PPE **(Nivel C)**
- La administración de PPE debe iniciarse lo antes posible, mejor en las primeras cuatro horas, y hasta las 72 horas. No está indicada después de 72 horas y su duración será de 4 semanas **(Nivel C)**
- Cuando esté indicada la PPE se recomienda una pauta convencional con tres FAR. Se recomiendan combinaciones fijas (TDF+FTC o ZDV+3TC), asociadas a un IP/r. Si no se puede administrar TAR basado en IP/r, podría sustituirse el IP/r por EFV o bien una terapia con 3 AN: ZDV/3TC + TDF o TDF/FTC+ZDV **(Nivel B)**
- Si se sospecha que el virus del caso índice puede tener resistencia a uno o varios fármacos, la profilaxis no debe retrasarse y debe incluir medicamentos sin resistencia cruzada **(Nivel C)**
- En caso de duda sobre la indicación de la PPE, se recomienda administrar la primera dosis de forma inmediata y valorar su continuidad en las 24 h posteriores por un experto en infección VIH **(Nivel C)**
- El seguimiento debe incluir la revaloración de la indicación a las 24-72 horas del inicio del TAR y control del cumplimiento y tolerabilidad del TAR así como serología al VIH, VHB y VHC (estos en caso de fuente infectada o con sospecha) en los meses 1, 3 y 6 tras la exposición **(Nivel C)**

Profilaxis post-exposición no ocupacional

La indicación de la PPE no-ocupacional se basa en la patogenia de la infección VIH, en estudios observacionales realizados principalmente en mujeres víctimas de violaciones, en hombres con prácticas sexuales **de alto riesgo** con otros hombres, la información procedente de otras profilaxis frente al VIH (exposición ocupacional, transmisión vertical) y de datos de experimentación animal. **No hay datos sobre la eficacia de esta estrategia, pero los datos disponibles sobre la accesibilidad y seguridad han conducido a una amplia aceptación**⁹³³.

El mayor riesgo de transmisión es la relación anal receptiva no protegida (0,5-3%) con varón VIH+, seguido del intercambio de jeringuillas (0,67%), de la punción percutánea con VIH+ (0,3%), la relación vaginal receptiva (0,05-0,8), o la vaginal o anal insertiva (0,05-0,065). La relación orogenital receptiva e insertiva tiene un riesgo menor (0,005-0,01)^{929, 934, 935}. Sin embargo recientemente se ha estudiado el riesgo de transmisión por acto sexual en 1.381 varones homosexuales entre los años 2001-2004. La transmisión en la relación anal receptiva fue de 1,43% (IC 95%, 0,48 a 2,85) si existía eyaculación y de 0,65% (C95%, 0,15 a 1,53) en caso de retirada previa a la eyaculación.

La probabilidad de transmisión por relación anal insertiva en varones circuncidados fue 0,11% (IC 95%, 0,02 a 0,24) y 0,62% (IC 95%, 0,07 a 1,68) en pacientes no circuncidados⁹³⁶. Es muy importante recordar que en la era TAR, la probabilidad de transmisión del VIH por una relación anal receptiva con eyaculación es el doble que sin eyaculación y 10 veces superior a la observada en la relación anal insertiva en un paciente circuncidado, en las relaciones heterosexuales o en la exposición ocupacional⁹³⁷. El riesgo de transmisión está igualmente aumentado en caso de ETS o en las agresiones sexuales.

Inicialmente existió cierta preocupación de que la extensión de la PPE no ocupacional pudiera reducir las medidas de prevención primaria, al existir una supuesta “profilaxis para el día después”, y relajar la seguridad en las prácticas sexuales o de las inyección de drogas. Sin embargo, se ha demostrado que si la PPE no ocupacional se acompaña de la oportuna intervención educativa se pueden reducir las prácticas de riesgo⁹³⁸. Es importante en este sentido realizar historia sexual en la primera visita y de forma periódica, junto con despistaje de ETS y discutir con el paciente los métodos para la prevención de la transmisión del VIH en las relaciones sexuales. Los problemas de la PPE no-ocupacional son que a menudo no se conoce la situación serológica de la fuente, el inicio de la profilaxis suele ser más tardío y el nivel de abandonos suele ser más alto, ya sea por efectos adversos de los FAR, o por simples pérdidas del seguimiento^{923, 939, 940}. En España, al igual que otros países, la demanda de la PPE no ocupacional ha aumentado y en ocasiones se utiliza en escenarios no previstos en las recomendaciones existentes⁹⁴¹. Estudios de coste-eficacia demuestran que únicamente las relaciones de alto riesgo con fuentes documentadas HIV positivas son coste-efectivas⁹⁴².

En las recomendaciones de los CDC⁹³⁴ y del PNS/Gesida⁹²⁹ se insiste en dos aspectos claves de la PPE no ocupacional : 1) la actuación médica no debe ceñirse exclusivamente a valorar la indicación de PPE con FAR, sino que debe contemplar la oferta de la prueba para el VIH, educación sanitaria para la reducción del riesgo de adquisición del VIH, valoración del riesgo de transmisión de otras infecciones y seguimiento clínico; y, 2) la decisión de llevar a cabo PPE con FAR ha de ser tomada por el médico y el paciente de forma individualizada, valorando sus beneficios y riesgos y desaconsejándola en personas con exposiciones repetidas. La PPE debe considerarse teniendo en cuenta el nivel de riesgo, la vía de exposición, el estado serológico y/o prácticas de riesgo de la persona fuente, así como el TAR recibido por el paciente fuente caso de estar infectado por el VIH y la existencia de factores de riesgo añadidos (Tabla 18).

La elección de los FAR, su inicio y duración es similar a la PPE ocupacional. En la PPE no ocupacional se debería valorar las concentraciones que alcanzan los FAR en las secreciones genitales respecto a las plasmáticas. Las concentraciones de los AN son más elevadas que las plasmáticas, los IP alcanzan niveles inferiores a los AN, sobre todo por su unión a las proteínas, y en los NN se han observado diferencias, NVP alcanza niveles superiores a las plasmáticas, y con la salvedad de que EFV no es aconsejable por su baja concentración en las secreciones genitales (inferior al 10% de las plasmáticas) y su posible efecto teratogénico^{939, 943}.

Históricamente la tolerabilidad y la adherencia de la PPE no ocupacional eran muy bajas, con abandonos del 22%-76%, siendo la toxicidad la principal causa del

abandono^{923, 924, 940}. Por ello las guías americanas y de la OMS optan por dos FAR (dos AN) para mejorar la adherencia y recomiendan un tercer fármaco en los casos de mayor riesgo. En cambio las guías europeas, y las británicas recomiendan TDF/FTC+LPV/r^{930, 944}. La tolerabilidad ha mejorado con las nuevas pautas⁹²⁴. En el año 2010 se ha publicado la experiencia francesa⁹⁴⁵ con 249 pacientes tratados con TDF/FTC+LPV/r, con un 22% de abandonos, y la experiencia holandesa⁹⁴⁶ con 139 pacientes con ZDV/3TC+ATV/r de los que completaron el tratamiento el 91%, aunque en las dos series la toxicidad fue elevada, sobre todo la gastrointestinal. Sin embargo, la toxicidad no es el único factor relacionado con la adherencia, dado que en la experiencia holandesa observaron que los varones homosexuales que habían tenido una exposición con un paciente con infección VIH conocida finalizaron la pauta, a pesar de que algunos presentaban efectos adversos más importantes que otros que suspendieron. Se ha comunicado una experiencia española con 255 pacientes (91% tras una exposición sexual). Fueron aleatorizados a ZDV/3TC+LPV/r o ZDV/3TC+ATV (400mg QD). Las pérdidas de seguimiento fueron elevadas. De los 178 pacientes evaluados, el 7% suspendió el tratamiento por toxicidad, 7 pacientes con LPV/r y 6 con ATV respectivamente⁹⁴⁷.

Recomendaciones sobre profilaxis postexposición no ocupacional

- La PPE no ocupacional debe individualizarse y llevarse a cabo en el marco de una intervención médica integral **(Nivel C)**
- La PPE no ocupacional debe recomendarse en las situaciones denominadas de “riesgo apreciable” si se dan las siguientes condiciones: a) instauración precoz (similar a la PPE ocupacional), b) ausencia de contraindicaciones para tomar FAR, c) exposición excepcional y d) garantía de seguimiento clínico y analítico del paciente **(Nivel C)**
- Los fármacos a emplear, su duración y el seguimiento de los pacientes será igual que en la PPE ocupacional **(Nivel C)**
- En caso de exposición sexual debe valorarse el riesgo de ETS y embarazo **(Nivel C)**

12. OTRAS ESTRATEGIAS Y NUEVOS FARMACOS

Interrupciones supervisadas del tratamiento

Las interrupciones supervisadas del TAR (IST) se plantearon inicialmente con algunos de los siguientes objetivos: 1) estimulación de la respuesta inmune celular en pacientes con CVP indetectable (auto-inmunización); 2) reversión de mutaciones del VIH, en pacientes en mult fracasado antes del TAR de rescate; y, 3) reducción de la exposición al TAR, principalmente en pacientes con CVP indetectable, para prevenir o revertir efectos adversos, mejorar la calidad de vida y en menor grado, disminuir el gasto sanitario (vacaciones terapéuticas).

Prácticamente se han abandonado los dos primeros planteamientos al no obtener resultados positivos⁹⁴⁸⁻⁹⁵¹. El planteamiento teórico de la IST para la auto-inmunización era conseguir mediante brotes de replicación viral intermitente, la estimulación de la respuesta inmune específica frente al VIH con el fin de conseguir una baja replicación viral que permitiera mantener a los pacientes libres de TAR durante períodos

prolongados. Algunos estudios demostraron que aunque era posible inducir una respuesta inmuno específica frente al VIH, el porcentaje de pacientes que controlaron la replicación viral en ausencia de TAR fue muy bajo⁹⁴⁹⁻⁹⁵¹.

Las IST previas a un TAR de rescate con el objetivo de revertir las resistencias a los FAR^{952, 953} y mejorar la respuesta al mismo no han demostrado beneficio virológico o inmunológico^{397, 398, 954, 955} y durante la IST existe un mayor riesgo de progresión clínica.

En un contexto similar, en pacientes con CVP detectable y en multifracaso, se han experimentado las llamadas interrupciones parciales de tratamiento (IPT). Estas consisten en interrumpir los IP manteniendo los AN a los que el virus es resistente. Con esta estrategia se perpetúan las mutaciones virales que condicionan baja capacidad replicativa conteniendo la replicación viral y preservando los CD4^{201, 955}. Por lo tanto, esta estrategia de IPT podría plantearse en pacientes seleccionados hasta disponer de nuevos fármacos de rescate.

Las IST para reducir la exposición al TAR (vacaciones terapéuticas) tienen como objetivo evitar o revertir toxicidades, mejorar la calidad de vida y reducir costes manteniendo la eficacia clínica e inmunológica⁹⁵⁶⁻⁹⁶⁶. Los riesgos serían la presentación de un síndrome retroviral agudo con rebrote viral, el deterioro inmunológico y progresión clínica, aparición de nuevas mutaciones (resistencia), más posibilidades de transmisión del VIH y aumento de enfermedades cardiovasculares y hepáticas, no diagnósticas de sida^{958, 961}.

No es fácil comparar los resultados de los estudios publicados o comunicados por diferencias en el diseño, tipo de pacientes incluidos, criterios para suspender o reiniciar el tratamiento, etc. Algunos estudios han mantenido interrupciones fijas^{958, 961, 967} mientras que en otros las IST se han basado en las cifras de CD4^{959, 962, 968}, e incluso de la CVP²⁰¹. En el mayor estudio aleatorizado realizado hasta la fecha, el SMART, los pacientes con IST progresaron más a sida o muerte, y además presentaron en mayor proporción eventos cardiológicos o hepáticos²⁰¹. Es probable que la cifra de 250 CD4 como criterio de reinicio fuera demasiado baja y favoreciera un curso desfavorable. Así en otros estudios en los que el TAR se reiniciaba a las 350 CD4/ μ L^{962, 964-966, 968}, la evolución fue favorable, especialmente en pacientes cuyo nadir de CD4 era >200 células/ μ L^{964, 966}. Esta estrategia podría ser de utilidad en los que iniciaron TAR con cifras de CD4 $>350-500$ células/ μ L, y que permanecen con CVP indetectable, si no han presentado trombocitopenia.

El riesgo de desarrollo de resistencias en las pautas que incluyen un NN⁹⁵⁷, se puede reducir interrumpiendo la NVP o EFV una semana antes, evitando así la “monoterapia” con fármacos de vida media prolongada⁹⁶².

En cualquier caso, la principal razón para no recomendar en la actualidad las estrategias de “vacaciones terapéuticas”, es el hallazgo en el estudio SMART de un aumento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares y hepáticas^{201, 969}. En subestudios del SMART⁹⁶⁹ y otros estudios como el STACCATO⁹⁷⁰ y el estudio español STOPAR⁹⁷¹ se ha demostrado que la pérdida de control de la replicación viral daría lugar al aumento de citoquinas pro inflamatorias como MCP-1, sVCAM-1, o IL-6, entre otras, lo que contribuiría al aumento del riesgo cardiovascular tras la interrupción del TAR.

Por otra parte, hay que comentar que se están llevando a cabo estudios de IST de corta duración (3-4 meses) en el contexto de utilización de vacunas terapéuticas, con la hipótesis de promover con estas una respuesta inmunológica -y virológica- suficiente que permita suspender de forma transitoria o permanente el TAR⁹⁷².

Recomendaciones sobre interrupciones supervisadas del tratamiento

- No se recomienda la IST como forma de autoinmunización (**nivel B**), ni como parte de una estrategia de rescate (**nivel A**)^{949-951, 953, 953, 954}
- Se desaconseja la IST guiada por CD4. Si se plantea en una situación muy seleccionada, se deberían cumplir las siguientes condiciones: 1) el paciente no está dispuesto a continuar el TAR de forma indefinida; 2) tiene CD4 >500 células/μL, 3) nadir de CD4 >200 células/μL; 4) se reiniciará el TAR si CD4 <350 células/μL; 5) el paciente debe conocer que existe un incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y hepáticas si se interrumpe el TAR y se reinicia cuando los CD4 descienden a <250 células/μL; 6) el paciente es consciente de que la replicación viral y el aumento de la CVP suponen más posibilidades de transmitir el VIH y tomará las medidas adecuadas (**nivel C**)^{201, 956}

Tratamientos inmunomediados

El TAR suprime de forma eficaz la replicación viral, lo que se sigue de una reconstitución importante del sistema inmune. Sin embargo, la respuesta inmuno-específica frente al VIH no suele recuperarse y además en algunos casos la reconstitución inmunológica es parcial. Para el primer caso se han ensayado las vacunas terapéuticas y en el segundo caso el tratamiento con inmunomoduladores como la interleuquina-2 (IL-2).

Citoquinas: IL-2.

En algún ensayo clínico y series prospectivas⁹⁷³⁻⁹⁷⁵ se ha demostrado que la IL-2, administrada de forma intermitente por vía subcutánea (4,5 a 7,5 MU cada 12 horas durante 5 días cada 8 semanas) en combinación con TAR aumentaba de forma importante el número de linfocitos CD4 y se asociaba con una mejor respuesta virológica en comparación con el TAR. Para saber si estos cambios inmunológicos se traducían en mejorías clínicas se llevaron a cabo dos grandes ensayos clínicos denominados SILCAAT (1695 sujetos con cifra de linfocitos CD4 entre 50 y 299 células/μL y ESPRIT (4111 pacientes con cifra de linfocitos CD4 superiores a 300 células/μL) cuyos resultados se han publicado⁹⁷⁶. El punto final de evaluación era el mismo en ambos estudios: presencia de eventos oportunistas o muerte. A pesar de que en ambos se evidenció un aumento significativo de CD4 (una diferencia de 59 células a favor del grupo de IL-2 en el SILCAAT y de 160 en el ESPRIT), lamentablemente ambos estudios demostraron que el aumento de CD4 como consecuencia del uso de IL-2 no se asociaba a una reducción de eventos oportunistas o un aumento en la supervivencia de estos pacientes. El riesgo relativo de EO/muerte fue de 0,91 (0,70-1,18) p=0,47 y 0,93 (0,75-1,16), p=0,52, respectivamente. En cambio,

los pacientes de las ramas de IL-2 presentaron mayor toxicidad, sobre todo grado 4, gastrointestinal y psiquiátrica. Los autores concluyeron que los linfocitos CD4 aumentados tras el uso de IL-2 no serían funcionalmente equivalentes a los CD4 resultantes de la supresión virológica tras el uso de TAR.

Hay actualmente en marcha un estudio fase I/IIa con IL-7 en pacientes con CD4 100-400 y cargas virales <50 copias/mL tras al menos 12 meses de TAR.

Recomendación sobre tratamientos inmunomediados

- Los resultados de dos grandes ensayos clínicos desaconsejan el uso de IL-2 en pacientes infectados por el VIH con el objetivo de aumentar su inmunidad, porque no se asocia a una reducción de eventos oportunistas ni de mortalidad y sí a un aumento de toxicidad (**nivel A**)⁹⁷⁶

Inmunizaciones terapéuticas

El objetivo de las inmunizaciones terapéuticas es potenciar la respuesta inmunespecífica frente al VIH. Se han realizado varios estudios con diferentes vacunas terapéuticas en los que se ha observado una respuesta inmunespecífica variable frente al VIH, pero no se ha observado un claro beneficio inmunológico, virológico o clínico⁹⁷⁷. En la actualidad las vacunaciones terapéuticas están en el ámbito exclusivamente experimental^{978, 979}.

Nuevos antirretrovirales

A pesar de la larga lista de FAR disponibles la imposibilidad de erradicar el VIH, los requerimientos de adherencia, las toxicidades a largo plazo y el desarrollo de resistencias cruzadas entre clases o familias de FAR obligan a buscar nuevos fármacos para el control duradero de la infección por el VIH.

Existen fármacos no comercializados pero en fases avanzadas de investigación: el NN rilpivirina (TMC278) y los inhibidores de la integrasa elvitegravir (EVG) y GSK1349572.

Rilpivirina es un nuevo NN con una eficacia similar a EFV en pacientes sin tratamiento previo y con menor toxicidad sobre sistema nervioso central y un perfil lipídico más favorable, según los datos a 96 semanas de un ensayo clínico en fase IIb que incluía 368 pacientes y donde se estudiaron 3 dosis de 25, 75 y 150 mg/día⁹⁸⁰. Otras ventajas de este fármaco es que tiene una vida media larga que permite su administración una vez al día y presenta una barrera genética más elevada que los NN de primera generación⁹⁸¹. Datos conjuntos a 48 semanas de 2 estudios en fase III (THRIVE y ECHO) que incluían más de 1300 pacientes y que comparaban rilpivirina frente a efavirenz, ambos asociados a 2 AN, demostraron la no inferioridad de rilpivirina (ITT-TLOVR), con tasas muy elevadas de carga viral < 50 copias/mL en ambas ramas (84,3% frente a 82,3%) aunque se produjeron más fallos virológicos (9% frente a 4,8%) con rilpivirina, lo que se compensó con una menor toxicidad (abandono por efectos adversos: 2% frente a 6,7%)⁹⁸².

EVG es un nuevo inhibidor de la integrasa que se administra en dosis de 125 mg/día potenciado con 100 mg de RTV⁹⁸³. Tiene el inconveniente de presentar resistencia

cruzada con RAL. En un estudio de búsqueda de dosis, parcialmente ciego y con resultados a 48 semanas se está evaluando la no inferioridad de EVG frente a un IP/r en pacientes con infección por VIH con experiencia previa a otros FAR⁹⁸⁴. A las 24 semanas el descenso de la CVP fue de -1,4, -1,7, -1,2 log₁₀ copias/mL en las ramas de EVG 50 mg, EVG 125mg y el IP/r comparador respectivamente (valor de p significativa 0,02 dosis de 125 mg frente al IP/r comparador). EVG/r fue bien tolerado y no se identificaron toxicidades relacionadas con la dosis del fármaco. Están en marcha estudios con una formulación cuádruple (QUAD) que incluye TDF, FTC, EVG y un nuevo potenciador llamada cobicistat (GS-9350)^{584, 585}.

El S/GSK 1349572 es un inhibidor de la integrasa de nueva generación con un perfil de resistencias diferente a RAL y que presenta actividad *in vitro* frente a cepas de VIH resistentes a RAL⁹⁸⁵ (aunque con menor respuesta en cepas con la mutación Q148H/K/R + mutaciones secundarias que en las que presentan mutaciones de las vías N155H o Y143H⁹⁸⁶). En un análisis interino a 16 semanas de un ensayo clínico fase II (SPRING 1) que compara 3 dosis del 572 (10, 25 y 50 mg/día) frente a efavirenz, el tiempo hasta una carga viral <50 copias/mL fue menor con el inhibidor de la integrasa (66% frente a 18% de pacientes alcanzaron CVP indetectable, p<0,001)⁹⁸⁷. La toxicidad moderada/severa fue mayor con efavirenz (18% frente a 6%). Están en marcha estudios en fase III con la dosis de 50 mg/día del 572 (SPRING 2 y SINGLE).

El desarrollo del antagonista del correceptor CCR5 vicriviroc se ha suspendido por falta de eficacia⁹⁸⁸⁻⁹⁹⁰.

También están en fase relativamente avanzada de investigación los inhibidores de la maduración⁹⁹¹ (bevirimat, en tableta de 100 mg) y hay potenciales avances dentro de las familias existentes como inhibidores de la transcriptasa inversa con un nuevo mecanismo de acción o inhibidores de la fusión de vida media prolongada. Aunque la descripción de estos fármacos escapa a los objetivos de estas guías, vale la pena comentar que es probable que en pocos años aumente de forma considerable el arsenal terapéutico frente a la infección por el VIH.

13. COSTE COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES COMBINACIONES DE FAR

En los últimos años, gracias al TAR, se ha reducido la mortalidad relacionada con el sida y mejorado la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, la terapia antirretroviral tiene un elevado coste y, en un entorno donde los recursos son limitados, es necesario gestionar correctamente el gasto. Por ello, se considera conveniente introducir en estas guías unas tablas comparativas de los costes de las diferentes combinaciones de TAR utilizadas como terapia de inicio, ya que existen diferencias sustanciales entre ellas (Fig 1): el gasto mensual con pautas de eficacia similar puede diferir en cantidades de hasta 600 euros. En la Tabla 19 se indica el precio de venta laboratorio (PVL) con IVA (4%) de los antirretrovirales disponibles en España en el 2010.

A pesar de que estas tablas solamente ha tenido en cuenta el precio crudo de los FAR, a la hora de utilizar la información del coste hay que tener en cuenta que además de los costes directos, cada alternativa posible presenta aspectos específicos, como número de comprimidos, diferente perfil de reacciones adversas, distinta adherencia y otros aspectos relacionados con el seguimiento clínico, que podrían requerir distinto consumo de recursos⁹⁹². Por ello, y pesar de sus limitaciones, es deseable que se

incorpore la evaluación farmacoeconómica con objeto de determinar la eficiencia de las nuevas estrategias o de los nuevos medicamentos. Este aspecto es especialmente relevante en el momento actual, ya que disponemos de múltiples alternativas de elevada eficacia para el control crónico de la infección por el VIH. Aunque las decisiones de tratamiento en el caso de la terapia de rescate están muy condicionadas por factores tales como resistencias, adherencia o toxicidad, es probable que, en el caso del paciente sin fracaso previo o en situación de primer fracaso, pudiera incluirse el concepto de eficiencia (relación entre coste y resultados) en la toma de decisiones para seleccionar la alternativa. Esta idea se ha aplicado por algunos autores en análisis farmacoeconómico aplicado al TAR.

14. Tablas

Tabla 1. Exploraciones complementarias en la valoración y seguimiento de los pacientes con infección por el VIH

-
- Valoración inicial
 - Exploración física completa
 - Tensión arterial
 - Medidas antropométricas (talla, peso y cintura)
 - Hematimetría
 - Bioquímica (incluyendo glucemia, perfil hepático y lipídico)
 - Rutinario de orina y sedimento
 - Serología: VHB, VHC, VHA, Lúes, CMV y Toxoplasma
 - Estudio de poblaciones linfoides
 - Carga viral VIH
 - Estudio genotípico de resistencias
 - HLA B*5701
 - Mantoux (o quantiferón) y radiografía de tórax
 - Citología cervical (en la mujer)
 - Citología anal (considerar)
 - Valoración de la fibrosis hepática*
 - Previo al inicio del TARV
 - Estudio de resistencias
 - Seguimiento (4 semanas post inicio y c/3-6 meses)
 - Hematimetría y bioquímica de rutina (con perfil lipídico)
 - Carga viral VIH y estudio de poblaciones linfoides
 - Estudio de resistencias, si fracaso virológico
 - Tropismo viral (si fracaso virológico)
-

*Si hepatitis crónica (optativo)

Tabla 2. Indicaciones de las pruebas de resistencia en la práctica clínica

- En el momento del diagnóstico de la infección por VIH*
- Inicio del TARV*
- Mujeres embarazadas
- En cada fracaso del TARV
- Profilaxis post-exposición (caso fuente)

*Todos los pacientes deberían tener un estudio de resistencias genotípicas en el momento del diagnóstico y antes de iniciar el tratamiento antirretroviral si se difiere

Tabla 3. Indicaciones de TARV en pacientes asintomáticos con infección crónica por VIH

Linfocitos CD4	Pacientes asintomáticos	Nivel evidencia
≤350	Recomendar	A
350-500	Recomendar (salvo determinadas situaciones)*	B
>500	Diferir en general. Considerar en determinadas ocasiones**	B

* Número de CD4 estable, CVP baja, poca predisposición del paciente

** Cirrosis hepática, hepatitis crónica por VHC; hepatitis B que requiera tratamiento; CVP > 10⁵ copias/ml; proporción de CD4 <14%; edad >55 años; riesgo cardiovascular elevado; nefropatía VIH. Parejas serodiscordantes con alto riesgo de transmisión

Tabla 4a. Combinaciones preferentes de tratamiento antirretroviral en pacientes sin terapia previa[†]

Régimen	Comentarios [‡]	Ensayos que lo avalan
TDF/FTC/EFV	<p>Pauta de elección si no existen otros condicionantes.</p> <p>Evitar en mujeres que planean quedarse embarazadas y en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas no estabilizadas.</p> <p>Usar con precaución en pacientes que realicen tareas peligrosas si presentan síntomas de somnolencia, mareos y/o trastornos de la concentración.</p> <p>Es preciso realizar previamente un estudio de resistencias que descarte mutaciones de resistencia a EFV.</p> <p>Usar con precaución en pacientes con factores de insuficiencia renal. Contraindicado si IFG <30 ml/min)</p>	ECHO, THRIVE, STARTMRK, 2NN, ACTG 5202, ASSERT, 934, MERIT, ACTG 5142
TDF/FTC+DRV/r	<p>Usar con precaución en pacientes con factores de insuficiencia renal. Contraindicado si IFG <30 ml/min)</p>	ARTEMIS
TDF/FTC+ATV/r	<p>Evitar si se utilizan Inhibidores de la bomba de protones.</p> <p>Usar con precaución en pacientes con factores de insuficiencia renal. Contraindicado si IFG <30 ml/min)</p>	CASTLE, ACTG 5202, ARTEN
TDF/FTC+RAL*	<p>El coste de esta pauta es muy superior al de las otras pautas preferentes</p> <p>Usar con precaución en pacientes con factores de insuficiencia renal. Contraindicado si IFG <30 ml/min)</p>	STARTMRK
TDF/FTC+NVP*	<p>No iniciar en mujeres con CD4 >250 células/μL ni en varones con CD4 > 400 células/μL.</p> <p>Es preciso realizar previamente un estudio de resistencias que descarte mutaciones de resistencia a NVP.</p> <p>Usar con precaución en pacientes con factores de insuficiencia renal. Contraindicado si IFG < 30 ml/min)</p>	ARTEN, OCTANE II
TDF/FTC+LPV/r*	<p>Usar con precaución en pacientes con hiperlipidemia y/o riesgo cardiovascular elevado.</p> <p>Usar con precaución en pacientes con factores de insuficiencia renal. Contraindicado si IFG <30 ml/min)</p>	ARTEMIS, 730, CASTLE, GEMINI, OCTANE II, HEAT, ACTG 5142;
ABC/3TC+ATV/r*	<p>Evitar si se utilizan Inhibidores de la bomba de protones.</p> <p>Es preciso realizar previamente determinación de HLA-B5701. No utilizar si HLA-B5701 positivo.</p> <p>Comparado con TDF/FTC+ATV/r, mayor riesgo de fracaso virológico en pacientes con CV >100.000 copias/mL</p>	ACTG 5202
ABC/3TC+LPV/r*	<p>Es preciso realizar previamente determinación de HLA-B5701. No utilizar si HLA-B5701 positivo.</p> <p>Usar con precaución en pacientes con hiperlipidemia y/o riesgo cardiovascular elevado.</p>	KLEAN, HEAT
ABC/3TC+EFV*	<p>Evitar en mujeres que planean quedarse embarazadas y en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas no estabilizadas.</p> <p>Usar con precaución en pacientes que realicen tareas peligrosas si presentan síntomas de somnolencia, mareos y/o trastornos de la concentración.</p> <p>Es preciso realizar previamente un estudio de resistencias que descarte mutaciones de resistencia a EFV.</p> <p>Es preciso realizar previamente determinación de HLA-B5701. No utilizar si HLA-B5701 positivo.</p> <p>Comparado con TDF/FTC/EFV mayor riesgo de fracaso virológico en pacientes con CV >100.000 copias/mL</p>	ACTG 5202, ASSERT, CNA30024

[†] Se recomienda el uso de preparados que combinen fármacos a dosis fijas. No existe en la actualidad suficiente información que permita considerar como equivalentes terapéuticos a FTC y 3TC, por lo que el uso de uno u otro fármaco en los regímenes seleccionados depende fundamentalmente de la experiencia disponible en su uso con los otros fármacos de la combinación.

* Estas pautas no han sido respaldadas como preferentes por la totalidad del panel.

[‡] Los comentarios reflejan aspectos fundamentales a considerar en la elección de régimen, pero no pretenden ser una guía exhaustiva de las precauciones a tomar en el uso de los fármacos. Para mayor información se recomienda revisar el texto del documento así como las fichas técnicas de los fármacos.

Tabla 4b. Combinaciones alternativas de tratamiento antirretroviral en pacientes sin terapia previa[†]

Régimen	Comentarios [‡]	Ensayos que lo avalan
ABC/3TC+FPV/r	Es preciso realizar previamente determinación de HLA-B5701. No utilizar si HLA-B5701 positivo. Evitar en pacientes con hiperlipidemia y/o riesgo cardiovascular elevado.	KLEAN
TDF/FTC+SAQ/r	El uso de SAQ se ha asociado a prolongación del intervalo QT con el riesgo potencial de arritmias. Usar con precaución en pacientes con factores de insuficiencia renal. Contraindicado si el IFG <30 ml/min).	GEMINI
ddl+3TC+EFV	Evitar en mujeres que planean quedarse embarazadas y en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas no estabilizadas. Usar con precaución en pacientes que realicen tareas peligrosas si presentan síntomas de somnolencia, mareos y/o trastornos de la concentración. Es preciso realizar previamente un estudio de resistencias que descarte mutaciones de resistencia a EFV. El uso de ddl puede asociarse a toxicidad mitocondrial	GESIDA 3903
AZT/3TC+EFV	Usar con precaución en pacientes que realicen tareas peligrosas si presentan síntomas de somnolencia, mareos y/o trastornos de la concentración. Es preciso realizar previamente un estudio de resistencias que descarte mutaciones de resistencia a EFV. Evitar en mujeres que planean quedarse embarazadas y en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas no estabilizadas. Evitar en caso de anemia. Esta pauta conlleva mayor riesgo de desarrollo de lipoatrofia.	934, CNA30024
AZT/3TC+ABC (c/s TDF)	Es preciso realizar previamente determinación de HLA-B5701. No utilizar si HLA-B5701 positivo. Evitar en caso de anemia. Esta pauta conlleva mayor riesgo de fracaso virológico. Evitar si la carga viral es >100.000 copias/mL. Esta pauta conlleva mayor riesgo de desarrollo de lipoatrofia.	ACTG A5095
AZT/3TC+MVC	Es preciso realizar previamente determinación de tropismo viral. No utilizar si tropismo X4 o Dual-Mixto. Evitar en caso de anemia. Esta pauta conlleva mayor riesgo de desarrollo de lipoatrofia.	MERIT

[†] Se recomienda el uso de preparados que combinen fármacos a dosis fija. No existe en la actualidad suficiente información que permita considerar como equivalentes terapéuticos a FTC y 3TC, por lo que el uso de uno u otro fármaco en los regímenes seleccionados depende fundamentalmente de la experiencia disponible en su uso con los otros fármacos de la combinación.

[‡] Los comentarios reflejan aspectos fundamentales a considerar en la elección de régimen, pero no pretenden ser una guía exhaustiva de las precauciones a tomar en el uso de los fármacos. Para mayor información se recomienda revisar el texto del documento así como las fichas técnicas de los fármacos.

Tabla 5. Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido y de nucleótido

Nombre genérico	Zidovudina AZT	Didanosina ddI	Estavudina d4T	Lamivudina 3TC	Emtricitabina FTC	Abacavir ABC	Tenofovir TDF
Nombre comercial	Retrovir® ZidovudinaCom binopharm® *Combivir® **Trizivir®	Videx®	Zerit®	Epivir® Lamivudina Normon® *Combivir® **Trizivir® ***Kivexa®	Emtriva® ****Truvada® *****Atripla®	Ziagen® **Trizivir® ***Kivexa®	Viread® ****Truvada® *****Atripla®
Dosis recomendada	250-300 mg BID	<60 Kg.: 250 mg QD ó 125 mg BID >60 Kg: 400 mg QD ó 200 mg BID	<60 Kg: 30 mg BID >60 mg: 40 mg BID	150 mg BID 300 mg QD	200 mg QD	300 mg BID 600 mg QD	300 mg QD
Presentaciones comerciales	caps. 100, 250 mg y comp./caps 300 mg. sol. oral 10 mg/ml vial i.v. (10 mg/ml)	Comp. , 50, 100, y 150 mg. cáps entéricas de 125, 200, 250 y 400 mg y polvo no tamponado para sol. oral (5 ó 10 mg/ml según el volumen añadido).	caps. 20, 30 y 40 mg sol. oral 1mg/ml	comp. 150 mg comp. 300 mg sol. oral 10 mg/ml	cáps 200 mg sol. oral 10mg/ml	comp. 300 mg sol. oral 20 mg/ml	comp. 300 mg
Biodisponibilid. oral	64±10% ^{a, ω}	42 (±12)% ^{a, Ω} (comp. tamponados)	86±18% ^{a, ω}	80-85% ^ω	93% (cáps) ^ω 75% (sol oral) ^ω	83% ^ω	25% en ayunas. ^Ω

Efecto de los alimentos	Los alimentos grasos pueden reducir la C _{máx} un 50%, sin afectar el AUC.	Videx® en cápsulas de liberación entérica debe administrarse 2 horas después de comer y no se debe ingerir ningún otro alimento hasta después de otras 1.5 horas (los alimentos reducen un 20-25% sus concentraciones plasmáticas y un 23% las de su metabolito activo intracelular ddA-TP). Probablemente escasa repercusión en el contexto de una terapia triple.	Puede administrarse con o sin alimentos.	Puede tomarse con o sin alimentos. (Los alimentos prolongan la absorción de 3TC pero no varían su biodisponibilidad).	Puede tomarse con o sin alimentos.	Puede tomarse con o sin alimentos.	La administración con una comida ligera en grasa no modificó el AUC, mientras que una comida rica en grasa aumentó un 40% el AUC. ^α
Semivida plasmática	0,5-3 horas ^{c,ω}	1,19 ± 0,21horas ^{a,Ω}	1,3 a 2,3 horas ^ω	5-7 horas ^ω	10 horas ^ω	1,5 horas ^ω	12-18 horas ^ω
Semivida intracelular	3 horas ^{&}	25-40 horas ^{&}	3,5 horas ^ω	16-19 horas ^ω	39 horas ^ω	20,6 horas ^ω (carbovir trifosfato)	PBMCs: 10 horas (en células activadas); 50 horas (en células en reposo) ^ω

Nombre genérico	Zidovudina AZT	Didanosina ddI	Estavudina d4T	Lamivudina 3TC	Emtricitabina FTC	Abacavir ABC	Tenofovir TDF
C_{max}	--	0,9 microg/mL (3,8 microM) ^{&}	536±146 nanog/ml (con 40 mg/12h)(VIH+) ^{a,ω}	2,0 microg/ml (300 mg/24h) ^ω	1,8±0,7 microg/ml ^ω	4,26 microg/ml (600 mg/24h) ^ω	326 nanog/mL ^ω
C_{min}	--	--	8 ± 9 nanog/ml (con 40 mg/12h) (VIH+) ^Ω	0,04 microg/ml (300 mg/24h) ^ω	0,09±0,07 microg/ml ^ω	--	64,4 nanog/mL ^ω
AUC	1400±200 nanog·h/mL ^{a,ω}	2,65 ± 1,07 microg·h/mL ^{a,Ω}	AUC _{0-12h} : 1284± 227 nanog.h/ml (con 40 mg/12h) (VIH+) a, ω	AUC _{0-24h} : 8,9 microg·h/ml (300 mg/24h) ^ω	10,0±3,1 microg·h/ml ^ω	11,95 microg·h/ml 600 mg/24h) ^ω	3324 nanog·h/mL ^ω
CI₅₀ frente a VIH-1 in vitro	CI ₅₀ :0,01 – 0,49 microM ^{c,ω} (0,00267- 0,13 microg/mL)	CI ₅₀ :0,01 to 0,1 microM ^{c,ω} (0,00236- 0,0236 microg/mL)	CI ₅₀ :0,002-0,9 microg/mL (0,0089-4 microM) ^Ω	CI ₅₀ :0,003 to 15 microM (1 μM = 0,23 microg/mL) ^Ω	CI ₅₀ :0,00032-0,124 microg/ml (0,0013- 0,5 microM) VHB: 0,01 a 0,04 microM. ^ω	CI ₅₀ :0,08 microg/ml (0,26 microM) ^ω	CI ₅₀ :VIH-1 _{IIIB} : 1-6 microM (0,635-3,81 microg/mL) (células linfoides) ^ω 1,1 microM (0,698 microg/mL) (HIV-1 subtipo B en PBMCs). ^ω
Actividad	VIH-1,2 ^ω	VIH-1,2 ^ω	VIH-1,2 ^{&}	VIH-1,2 ^ω VHB ^ω	VIH-1,2 ^ω VHB ^ω	VIH-1,2 ^ω	VIH-1,2 ^ω VHB ^ω
Penetración en LCR (LCR:plasma)	0,6 [0,04 -2,62] ^{b,ω} Grado 4 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	21 (±0,03)% ^a (tras admin. IV). ^Ω Grado 2 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	0,39±0,06 ^ω Grado 2 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	0,12 ^ω Grado 2 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	No se dispone de datos ^ω Grado 3 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	30-44% ^ω Grado 3 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	4% Grado 1 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)

Nombre genérico	Zidovudina AZT	Didanosina ddl	Estavudina d4T	Lamivudina 3TC	Emtricitabina FTC	Abacavir ABC	Tenofovir TDF
Metabolización	Glucuronidación hepática	Hepática 50%	Hepática 50%	Hepática 5-10%	Hepática 13%	Glucuronidación hepática Alcohol deshidrogenasa	El TDF (pro fármaco) es rápidamente hidrolizado a tenofovir por las esterasas plasmáticas. 70-80% renal inalterado
Excreción	Renal (15% inalterado)	Renal (50% inalterado)	Renal (50% inalterado)	Renal (70% inalterado)	Renal 86%	Renal 83% (2% inalterado y 81% metabolitos)	
Efectos adversos	Mielosupresión: anemia y/o neutropenia a dosis elevadas Cefalea Mareo Intolerancia gastrointestinal. Lipodistrofia Acidosis láctica con esteatosis hepática ¹	Pancreatitis Hiperuricemia Neuropatía periférica Diarrea Náuseas Lipodistrofia Acidosis láctica con esteatosis hepática ¹	Neuropatía periférica Pancreatitis Lipodistrofia Acidosis láctica con esteatosis hepática ¹	Intolerancia digestiva Cefalea Fatiga Dolor abdominal Lipodistrofia Acidosis láctica con esteatosis hepática ¹	Cefalea Intolerancia digestiva Exantema cutáneo Elevación CPK Anemia/neutropenia Lipodistrofia Acidosis láctica con esteatosis hepática ¹	Hipersensibilidad (5-8%) Lipodistrofia Acidosis láctica con esteatosis hepática ¹	Intolerancia digestiva Cefalea Fatiga Dolor abdominal Proteinuria

Nombre genérico	Zidovudina AZT	Didanosina ddl	Estavudina d4T	Lamivudina 3tC	Emtricitabina FTC	Abacavir ABC	Tenofovir TDF ³
Interacciones							
Asociaciones no recomendables o contraindicadas	D4T Precaución en la asociación con TPV/r por disminución de los niveles de zidovudina	Ribavirina d4T TDF (ajustar dosis de ddl)	AZT ddl	FTC Cotrimoxazol (dosis altas; a dosis profilácticas NRAD)	3TC ddC	Precaución en la asociación con TPV/r por disminución de los niveles de abacavir	ATV no potenciado ddl (ajustar dosis de ddl)
Inmuno-supresores	<i>In vitro</i> , el ácido micofenólico aumentó el efecto antirretroviral de ABC, ddl y TDF de forma dosis-dependiente. En cambio, el ácido micofenólico mostró antagonismo <i>in vitro</i> con AZT y d4T. Se desconoce su significado clínico. Posible aumento de nefrotoxicidad con la asociación de TDF a ciclosporina ó tacrolimus.						
Interferon/ Ribavirina	Se recomienda evitar la asociación de ddl y ribavirina, ya que se ha descrito aumento de toxicidad mitocondrial y pancreatitis. Ribavirina ² ha mostrado inhibir <i>in vitro</i> la fosforilación intracelular de AZT y d4T. Sin embargo, en pacientes coinfectados por VIH y VHC no se ha observado esta interacción negativa entre ribavirina y AZT, d4T ó 3TC (subestudio del APRICOT). Se evitará en la medida de lo posible el uso simultáneo de ribavirina con ZDV por riesgo de anemia. Sobre la posible interacción entre ABC y ribavirina, los resultados son contradictorios: si bien algunos estudios han sugerido que ABC podría reducir la eficacia de ribavirina, en la mayoría de estudios, entre ellos los estudios 3603 y 5006 de Gesida , no se ha observado esta interacción, especialmente cuando la dosis de ribavirina se ajustaba a peso. Con el interferón beta (Avonex®, Rebif®, Betaferon®) se han descrito aumentos de la semivida AZT hasta 3 veces y con interferón alfa (Intron®, PegIntron®, Roferon A®, Wellferon®) ↑36% AUC AZT (↑ riesgo toxicidad hematológica). Algunos autores recomiendan reducir la dosis de AZT un 50-75% en combinación con interferon beta.						
Metadona (MT) y otros opiáceos	Puede ↑ Cp AZT	MT: Interacción poco probable Buprenorfina: No interacción	NRAD (↓27% AUC d4T)	MT: Interacción poco probable Buprenorfina: No interacción	Interacción poco probable	Puede requerir un ligero ↑ MT	MT: Interacción poco probable Buprenorfina: No interacción
Fármacos empleados para tratar la influenza	Se considera poco probable una interacción con zanamivir, dada su escasa absorción. Oseltamivir y amantadina se eliminan por vía renal. Oseltamivir mediante filtración glomerular y secreción tubular. Se ha observado un aumento del doble en sus Cp al asociarlo con probenecid, fármaco inhibidor de la secreción tubular. Es probable que en la eliminación de amantadina intervenga también la secreción tubular. No puede descartarse una interacción con otros fármacos eliminados mediante esta vía como lamivudina, emtricitabina y tenofovir, aunque no se dispone de información específica al respecto. Se recomienda precaución en los pacientes con función renal alterada que deban recibir oseltamivir u amantadina junto con estos ARV.						

Nombre genérico	Zidovudina AZT	Didanosina ddl	Estavudina d4T	Lamivudina 3tC	Emtricitabina FTC	Abacavir ABC	Tenofovir TDF ³
Otros	<p>Ganciclovir: ↑riesgo toxicidad hematológica.</p> <p>Probenecid: evitar ó reducir 50% AZT</p>	<p>TDF: evitar la asociación, por aumento del riesgo de fracaso terapéutico. En caso necesario, ajustar dosis. (↑40% AUC ddl). Sin cambios TDF. Ajuste de dosis ddl: ≥60 kg: 250 mg/día; <60 kg: 200 mg/día (en este caso ddl se pueden administrar juntos c/s comida ligera).</p> <p>Con alopurinol, reducir la dosis de ddl a la mitad</p>	<p>Doxorrubicina <i>in vitro</i> interfiere la fosforilación de d4T. Se desconoce la importancia clínica, pero se recomienda un control estrecho de la carga viral.</p>	<p>Nefrotóxicos: posible ↑Cp 3TC Precaución con fármacos que se eliminen por vía renal (secreción activa por el sistema de transporte catiónico orgánico): riesgo de acúmulo de ambos.</p>	<p>Nefrotóxicos: posible ↑Cp FTC precaución con fármacos que se eliminen por vía renal (secreción tubular activa): riesgo de acúmulo de ambos. FTC no ha mostrado efecto inhibitor sobre las principales isoenzimas del citocromo P450 ni sobre la glucuronidación, por lo que no es de esperar que se produzcan interacciones metabólicas importantes a este nivel.</p>	<p>Clorpromacina, disulfiram e isoniacida ↑ Cp de ambos. Se ha descrito un caso de rabdomiolisis grave en un paciente que presentó hipersensibilidad a ABC y recibía tratamiento con fibratos (ciprofibrato 100 mg/24 horas).</p>	<p>ddl: evitar la asociación. En caso necesario, ajustar dosis: Sin cambios TDF. Ajuste de ddl: ≥60 kg: 250 mg/día; <60 kg: 200 mg/día (pueden administrarse juntos c/s comida) Con ATV utilizar ATV/r 300/100 mg c/24h. Telaprevir: NRAD Nefrotóxicos, inhibidores o competidores por la secreción tubular renal podrían aumentar la toxicidad de ambos. Aumento de riesgo de toxicidad renal con IP. Probenecid podría aumentar las concentraciones plasmáticas de TDF.</p>

AUC : Area bajo la curva; **BID**: dos veces al día; **Cp**: Concentración plasmática; **NRAD**: No requiere ajuste de dosis; **QD**: una vez al día; **TID**: tres veces al día. *Combivir®: asociación a dosis fijas de AZT 300 mg y 3TC 150 mg. **Trizivir®: asociación a dosis fijas de AZT 300 mg, 3TC 150 mg y abacavir 300 mg. ***Kivexa®: asociación a dosis fijas de 3TC 300 mg y abacavir 600 mg; ****Truvada®: asociación a dosis fijas de tenofovir 300 mg y emtricitabina 200 mg. *****Atripla®: asociación a dosis fijas de tenofovir 300 mg, emtricitabina 200 mg y efavirenz 600 mg.

^a Expresado como media \pm DE si no se indica lo contrario

^b Expresado como mediana \pm rango intercuartil

^c Expresado como rango

¹ Reacción poco frecuente aunque potencialmente muy grave.

² cabe recordar que cualquier posible interacción con ribavirina puede persistir hasta 2 meses después de interrumpir el tratamiento con Rebetol® debido a la larga vida media de este fármaco.

³ Tenofovir se elimina mayoritariamente por vía renal y no actúa como sustrato, inductor ó inhibidor del citocromo P-450, por lo que no se espera que tenga interacciones relevantes de carácter metabólico.

^w Información procedente de la ficha técnica europea. EPARS: European Public Assessment Reports. Disponible en:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/includes/medicines/medicines_landing_page.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=. Con acceso [5/12/2010].

ⁿ Información procedente de la ficha técnica americana (fuentes: FDA and First Data Bank, Inc). Disponible en: http://www.rxlist.com/drugs/alpha_a.htm .Con acceso [5/12/2010].

NOTA: debido a que la información científica relacionada con los fármacos antirretrovirales se renueva constantemente, se recomienda consultar la ficha técnica de los fármacos y la información actualizada ofrecida por las distintas compañías farmacéuticas y las autoridades sanitarias.

Tabla 6. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos

Nombre genérico	Nevirapina	Efavirenz	Etravirina
Nombre comercial	Viramune®	Sustiva® *Atripla®	Intence®
Dosis recomendada	200 mg QD x 14 días seguidas de 200 mg BID	600 mg QD	200 mg BID (dispersable en agua)
Presentaciones comerciales	comprimidos 200 mg suspensión 10 mg/mL	cápsulas 50, 100 y 200 mg y comp. 600 mg	comprimidos 100 mg
Biodisponibilidad oral	93 ± 9% ^{a,ω} (comprimidos) 91 ± 8% ^a (solución oral)	22% (dosis única de 600 mg con comida de alto contenido graso) ^ω 17% (dosis única de 600 mg con comida normal) ^ω	No se ha determinado su biodisponibilidad absoluta en humanos ^ω
Efecto de los alimentos	Se puede administrar con o sin alimentos. (Al administrar nevirapina con un desayuno rico en grasas, el grado de absorción fue comparable al observado en condiciones de ayuno).	Evitar las comidas ricas en grasa, pues la biodisponibilidad aumenta un 50% y podría aumentar la toxicidad.	Debe administrarse con alimentos. El AUC y la Cmax de la formulación usada en estudios de Fase III (F060) fueron un 51 y un 44% menores cuando se administró en ayunas, y un 25 y 38% menores tras un desayuno alto en fibra (en comparación con un desayuno estándar). Las diferencias en las concentraciones de ETR administrado tras una comida con alto contenido lipídico, tras un desayuno estándar o tras un croissant no fueron clínicamente significativas.
Semivida plasmática	25-30 horas (tras dosis múltiples) ^ω 45 horas tras una dosis única. La diferencia se debe a la autoinducción de su propio metabolismo.	40-55 horas (tras dosis múltiples) ^ω 52-76 horas tras una dosis única. La diferencia se debe a la autoinducción de su propio metabolismo. ^ω	30-40 horas ^ω

C_{max}	5,74 microg/ml (5,00-7,44) (200 mg/12h) ^ω	4,07 microg/ml ^Ω 12,9 ± 3,7 microM (VIH+) ^{a, ω}	--
C_{min}	3,73 microg/ml (3,20-5,08) (200 mg/12h) ^ω	5,6 ± 3,2 microM (1,77 microg/ml) (VIH+) ^{a, ω}	296,74±377,52 nanog/mL (VIH+) ^{a,Ω}
AUC	109,0 microg.h/ml ^ω (96,0-143,5) (200 mg/12h) ^ω	184 ± 73 microM.h (58,14 microg.h/mL) ^{a, ω}	4531,53±4543,69 nanog.h/mL(VIH+) ^{a,Ω}
CI_{50/90} frente a VIH-1 in vitro	CI ₅₀ :0,063 microM ^ω (0,017 microg/mL)	CI ₉₀₋₉₅ : 0,00014-0,0021 microg/ml (0,00046-0,0068 microM) ^ω	CI ₅₀ : 0,9 a 5,5 nanoM. (0,39-2,39 nanog/mL) ^ω
Actividad	VIH-1 ^ω	VIH-1 ^ω	VIH-1 ^ω
Penetración en LCR (LCR:plasma)	45% ± 5% ^ω Grado 4 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	0,69% (entre 0,26 y 1,19%) ^ω Las concentraciones de EFV en LCR exceden la CI ₅₀ para la cepa salvaje del virus: LCR/plasma: 0.005 (IQR 0.0026-0.0076; n=269). CSF/ CI ₅₀ : 26 (IQR 8-41), tomando CI ₅₀ =0.51 ng/mL (Best BM. J. Antimicrob. Chemother. (2010) doi: 10.1093/jac/dkq434) Grado 3 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	No disponible ^ω Grado 2 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)
Metabolización	Hepática CYP3A4 (Inducción)	Hepática CYP3A4 (inducción-inhibición)	Hepática:
Excreción	Renal 80% (3% inalterado) Heces 10%	Renal 34% (1% inalterado) Heces 16-61%	- inducción de CYP3A4; - Inhibición: 2C9, 2C19 - glucuronidación Renal: < 1,2 % Excreción fundamentalmente por heces
Efectos adversos	Exantema Aumento de transaminasas y Hepatitis aguda	Exantema Síntomas neuropsiquiátricos Aumento de las transaminasas Teratogenicidad en monos	Exantema

Nombre genérico	Nevirapina	Efavirenz	Etravirina
Interacciones Asociaciones contraindicadas	Anticonceptivos orales ETV Hypericum (Hierba de San Juan) Ketoconazol Itraconazol Rifampicina Saquinavir ¹ Voriconazol	Anticonceptivos orales Astemizol Carbamacepina Cisaprida Claritromicina Deriv. Ergotamina ETV Hipericum (hierba de S. Juan) Itraconazol Midazolam Pimozida Posaconazol Saquinavir (como único IP) Terfenadina Triazolam Voriconazol (evitar/ajustar dosis)	Carbamacepina EFV Fenitoina Fenobarbital Hypericum (Hierba de San Juan) NVP Rifampicina TPV/r IP no potenciado
<u>Antiácidos</u>	No se ha observado interacción significativa	No se ha observado interacción significativa	Teóricamente no es de esperar una interacción significativa
<u>Inhibidores de la bomba de protones</u>	Teóricamente no es de esperar una interacción significativa	Ausencia de interacción.	NRAD (↑41% AUC ETR)
<u>Antihistamínicos H2</u>	Teóricamente no es de esperar una interacción significativa	Ausencia de interacción.	NRAD (↓14% AUC ETR)
<u>Antimicobacterianos:</u> - Rifampicina	↓Cmín y AUC NVP del 35 a más del 50%. Resultados clínicos discordantes. No aumentar la dosis de NVP por mayor toxicidad. No emplear pautas de NVP QD con rifampicina. Precaución-monitorizar estrechamente eficacia.	NRAD (↓25% AUC EFV)	No hay datos. No se recomienda dado que se prevé una importante reducción de las concentraciones de ETR

- Rifabutina	NRAD	450-600 mg/día rifabutina ó 450-600 mg 3 veces /semana	NRAD (↓37% AUC ETR)
- Claritromicina	NRAD	↓39% AUC claritromicina Buscar alternativa (azitromicina) para el tratamiento de MAC	↓39% AUC claritro, ↑42% AUC ETR Buscar alternativa (azitromicina) para el tratamiento de MAC

Nombre genérico	Nevirapina	Efavirenz	Etravirina
Antiepilépticos: - Carbamazepina, - fenitoína, - fenobarbital	Precaución. Monitorizar niveles de ambos fármacos	Precaución. Monitorizar niveles de antiepiléptico. Carbamacepina: no recomendado (↓47% Cmin EFV con 400 mg c/24h de CBZ; ↓35% Cmin CBZ). Fenitoína: algún caso descrito de ↑ fenitoína y ↓ EFV a niveles indetectables (evitar o monitorizar niveles de ambos).	No hay datos
Anticoagulantes orales	Teóricamente NVP podría aumentar o reducir el INR. Monitorizar estrechamente	Teóricamente EFV podría aumentar o reducir el INR (un caso descrito que requirió reducir dosis de warfarina). Monitorizar estrechamente	Teóricamente ETR podría aumentar o reducir el INR. Monitorizar estrechamente
Anticonceptivos orales:	↓19% AUC etinilestradiol. No debe administrarse junto con anticonceptivos que contengan etinilestradiol o noretindrona. Deben considerarse métodos anticonceptivos alternativos o adicionales. No modifica los niveles de medroxiprogesterona (NRAD)	Etinilestradiol sin cambios, ↓83% AUC levonorgestrel. No debe administrarse junto con anticonceptivos que contengan etinilestradiol o noretindrona. Deben considerarse métodos anticonceptivos alternativos o adicionales. No modifica los niveles de medroxiprogesterona (datos preliminares)	↑22% AUC etinilestradiol; noretindrona, AUC sin cambios. NRAD
Antifúngicos	Anfotericina B: NRAD. Caspofungina: considerar un aumento de la dosis de mantenimiento de caspofungina a 70 mg/d. Fluconazol: No recomendable (↑100% AUC NVP con toxicidad). Itraconazol, ketoconazol y voriconazol: Contraindicados.	Anfotericina B: NRAD. Caspofungina: considerar un aumento de la dosis de mantenimiento de caspofungina a 70 mg/d. Fluconazol: NRAD. Itraconazol: No recomendable (sólo con monitorización de niveles de ambos fármacos; un caso de histoplasmosis tratada con éxito con TDM y ajuste a 800 mg/d de itraconazol y 400 mg/d de EFV) Posaconazol: contraindicado (↓ 50% AUC posacon) Voriconazol : No recomendable (solo con monitorización de niveles de ambos fármacos)(aumentar dosis de voriconazol a 400mg/12 y posible disminución de EFV a 300 mg/d)	Anfotericina B: NRAD. Los antifúngicos imidazólicos pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de ETV. ETV podría reducir las concentraciones plasmáticas de itraconazol y ketoconazol por aumento de su metabolismo a través del CYP3A4. Fluconazol: NRAD (AUC de fluconazol sin cambios; ↑ 86% AUC ETR Voriconazol: ↑ 36% AUC voriconazol; ↑14% AUC ETR

Nombre genérico	Nevirapina	Efavirenz	Etravirina
<u>Estatinas:</u>	Con atorvastatina, lovastatina y simvastatina, monitorizar eficacia estatina. Con fluvastatina y pravastatina interacción poco probable	Se han descrito reducciones del 58% en el AUC de simvastatina, del 43% en el AUC de atorvastatina y del 40% en el AUC de pravastatina. No hay datos para lovastatina y fluvastatina. Algunos pacientes pueden requerir aumento de dosis, que debe realizarse de forma gradual.	NRAD (↓37% AUC de atorvastatina, ↑27% AUC 2-OH-atorvastatina).
<u>Fármacos empleados para tratar la influenza</u>	Amantadina / oseltamivir / zanamivir: teóricamente no deben esperarse interacciones		
<u>Inmunosupresores:</u>	Posible ↓Cp ciclosporina, prednisona, tacrolimus y sirolimus. Monitorizar niveles/eficacia del inmunosupresor. La dosis de ciclosporina y tacrolimus, una vez ajustada, se mantiene más o menos constante a lo largo del tiempo. En pacientes con TOH, la dosis de tacrolimus requerida en pacientes tratados con NVP fue similar a la utilizada en VIH negativos.	Con ciclosporina una vez ajustada la dosis, ésta se mantiene más o menos constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, EFV redujo de forma importante los niveles de tacrolimus en pacientes con TOH. Con el resto, teóricamente posible ↓Cp (aunque también podría ↑Cp) de prednisona y sirolimus. Monitorizar niveles/eficacia-toxicidad del inmunosupresor.	No hay datos. ETR podría reducir la Cp de ciclosporina, tacrolimus y sirolimus (monitorizar)
<u>Interferón/ Ribavirina</u>	Ribavirina: no existe evidencia de interacción con los no nucleósidos. Interferón: su vía de eliminación no está claramente establecida así como tampoco su posible efecto inhibitor sobre el citocromo P-450 (ha mostrado p. ej. ↑Cp de teofilina y barbitúricos). No hay datos con respecto a posibles interacciones con los no nucleósidos. Se recomienda una monitorización más estrecha de los efectos secundarios a nivel de SNC con la combinación de EFV e interferón.		No hay datos. Teóricamente no es de esperar una interacción significativa
<u>Metadona</u>	Posible síndrome abstinencia Puede requerir ↑ dosis MT del 8º-10º día.	Posible síndrome abstinencia Puede requerir ↑ dosis MT del 8º-10º día. Buprenorfina podría ser una alternativa con menor riesgo de sd. abstinencia (datos limitados).	Ausencia de interacción

Nombre genérico	Nevirapina	Efavirenz	Etravirina
Antirretrovirales IP			
- IDV	↓30% AUC IDV. Valorar ↑ 1000 mg c/8h IDV en función de sus Cp (elevada variabilidad interindividual) ó usar IDV/r 800/100 mg c/12h. NRAD NVP	↓31% AUC IDV con 200 mg/día de EFV. ↑ 1000 mg c/8h IDV ó usar IDV/r 800/100 mg c/12h. NRAD EFV	Evitar el uso de IDV no potenciado con ETR. No hay estudios con IDV/r.
- RTV	NRAD	NRAD (↑18% AUC RTV)	NRAD en dosis potenciación. Contraindicado con RTV a dosis plenas (↓46% AUC ETV)
- SQV	No recomendado con SQV no potenciado(↓27% AUC SQV) ¹ . NRAD NVP	No recomendado con SQV no potenciado (↓62% AUC SQV) ²	NRAD con SQV potenciado
- NFV	NRAD	Si bien los estudios en voluntarios sanos no mostraron interacción, un estudio en pacientes <i>naive</i> mostró a las 32 semanas una tendencia no significativa a ↓C _{máx} y AUC NFV y ↓C _{min} NFV significativa.	No hay datos. Asociación no recomendada
- FPV	NRAD (FPV/r 700/100 mg c/12h) Valorar aumento de dosis de RTV en QD (300 mg)	NRAD (FPV/r 700/100 mg c/12h) Valorar aumento de dosis de RTV en QD (300 mg)	ETR sin cambios. ↑69% AUC FPV /r (700/100 mg/12 h)(contrariamente a lo esperado). Considerar reducción de dosis de FPV (no hay información suficiente para recomendar un ajuste de dosis).

Nombre genérico	Nevirapina	Efavirenz	Etravirina
- LPV/r	↓22% AUC/↓55% C _{min} LPV. Valorar 600/150 mg c/12h (variabilidad interindividual elevada. Si es posible, determinar niveles plasmáticos LPV). NRAD NVP	↓20-25% AUC LPV. Valorar 600/150 mg c/12h. (variabilidad interindividual elevada. Si es posible, determinar niveles plasmáticos LPV). NRAD EFV	Formulación meltrex de LPV/r: NRAD (LPV sin cambios, ↓35% AUC de ETR)
- ATV/r	↓33% C _{min} , ↓60% AUC ATV. No se recomienda en pacientes pretratados. Ajuste de dosis de ATV/r en pacientes naive a 400/100 mg c/24h. Se recomienda monitorizar niveles de ATV.	↓42% C _{min} ATV. No se recomienda en pacientes pretratados. Ajuste de dosis ATV/r en pacientes naive a 400/100 mg /24h. Se recomienda monitorizar niveles de ATV.	Utilizar ATV/r (↑30% AUC ETR y ↓17% AUC ATV).
- TPV/r	NRAD	NRAD	Asociación contraindicada (↓76% AUC ETR y ↑18% el AUC de TPV)
- Darunavir/ritonavir	DRV/r 600/100 mg/12h: NRAD	DRV/r 600/100 mg/12h: NRAD (↑21% AUC EFV y ↓13% AUC DRV) DRV/r 900/100 mg/24h: evitar o monitorizar estrechamente niveles de DRV. ↓40% AUC DRV, ↓57% C _{min} DRV.	DRV/r 600/100 mg/12h: NRAD (↓37% AUC ETR y ↑6% AUC DRV)
<u>Inhibidores de la integrasa</u>			
- RAL	NRAD	NRAD (↓36% AUC RAL)	NRAD (↓10% AUC RAL, ↓34% C _{min} de RAL). Debido a la amplia variabilidad de la PK de RAL se han descrito C _{min} <Cl ₉₅ (14,6 ng/mL) en algunos pacientes. Sin embargo, los buenos resultados clínicos apoyan el uso de RAL+ETR+DRV/r en pacientes pretratados (ANRS 139 TRIO).

Nombre genérico	Nevirapina	Efavirenz	Etravirina
<u>Inhibidores del correceptor CCR5</u>			
MVC	NRAD	En ausencia de inhibidores enzimáticos potentes debe aumentarse la dosis de MVC a 600 mg c/12h. Si se coadministran inhibidores (ej. IP/r) la dosis de MVC será de 150 mg/12h ³ .	En ausencia de inhibidores enzimáticos potentes debe aumentarse la dosis de MVC a 600 mg c/12h. Si se coadministran inhibidores (ej. IP/r) la dosis de MVC será de 150 mg/12h ³ .
- Otros	<p>Bosentan: no modificó los niveles de NVP (datos de un paciente)</p> <p>NVP puede ↓ Cp de los fármacos metabolizados a través del CYP3A4⁴. En cambio, a diferencia de lo esperado, NVP aumentó un 56% el AUC de lumefantrina, sin que se observaran cambios en el intervalo QTcF.</p>	<p>Atovacuona / proguanilo: ↓ 68% AUC atovacuona y ↓ 58% AUC de proguanilo. Valorar aumento de dosis (datos limitados procedentes de la comparación de datos de pacientes con datos históricos de voluntarios sanos sin TARV)</p> <p>Puede ↑ Cp de los fármacos metabolizados a través del CYP3A4⁴ aunque es más probable que las ↓.</p>	<p>Puede ↑ Cp de los fármacos metabolizados a través del CYP3A4⁴ aunque es más probable que las ↓.</p> <p>Sildenafil: (↓41–57% AUC sildenafil) (puede requerir aumento de dosis)</p> <p>Paroxetina: ausencia de interacción.</p> <p>Digoxina: ausencia de interacciones</p>

AUC : área bajo la curva de concentraciones plasmáticas frente al tiempo (exposición al fármaco); **BID**: dos veces al día; Cp: concentración plasmática; **NRAD**: No requiere ajuste de dosis; **QD**: una vez al día; TDM: monitorización de niveles plasmáticos; **TID**: tres veces al día.

* Atripla®: asociación a dosis fijas de tenofovir 300 mg, emtricitabina 200 mg y EFV 600 mg.

^a Expresado como media ± DE si no se indica lo contrario

¹ Saquinavir en cápsulas duras (Invirase®) puede asociarse con NVP si se combina con ritonavir (SQV/RTV 1000/100 mg c/12h), en cuyo caso datos preliminares han mostrado buenos resultados.

² Saquinavir puede asociarse con la dosis habitual de EFV si se combina con ritonavir (1000/100-200 mg c/12h).

³ En presencia de inhibidores enzimáticos potentes como los IP (excepto TPV/r y FPV/r), antifúngicos imidazólicos (ketoconazol, itraconazol), macrólidos (eritromicina, claritromicina, telitromicina) o nefazodona el efecto inhibidor predomina sobre el efecto inductor enzimático y por lo tanto, se recomienda reducir la dosis de maraviroc a 150 mg c/12h. Maraviroc no debe combinarse con dos inductores potentes p. ej. rifampicina + efavirenz.

⁴ Principales fármacos metabolizados a través del CYP3A4: alprazolam, amiodarona, amlodipino, amprenavir, ciclofosfamida, ciclosporina, clonacepam, cloracepato, dexametasona, diazepam, disopiramida, estazolam, etionamida, fentanilo, finasterida,

fluracepam, glipizida, itraconazol, lacidipino, lidocaína, loratadina, meperidina, nicardipino, nifedipino, nimodipino, nitrendipino, prednisona, quinidina, sertralina, sildenafil, vardenafilo, tadalafilo, tacrolimus, vincristina y zolpidem.

Categorías seguridad embarazo (FDA): A= ausencia de riesgos para el feto; B= no teratogenicidad en animales, falta de estudios en humanos; C= no datos de seguridad en embarazadas y los estudios en animales muestran toxicidad fetal o no se han realizado y no deben utilizarse dichos fármacos, a menos que el beneficio potencial supere el posible riesgo fetal.

^w Información procedente de la ficha técnica europea. EPARS: European Public Assessment Reports. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/includes/medicines/medicines_landing_page.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid= Con acceso [5/12/2010].

ⁿ Información procedente de la ficha técnica americana (fuentes: FDA and First Data Bank, Inc). Disponible en: http://www.rxlist.com/drugs/alpha_a.htm .Con acceso [5/12/2010].

[&]Guardiola JM, Soriano V (Eds). Tratamiento de la infección por VIH-SIDA. Fármacos y combinaciones. Décima Edición. Barcelona: Publicaciones Permanyer 2007.

NOTA: debido a que la información científica relacionada con los fármacos antirretrovirales se renueva constantemente, se recomienda consultar la ficha técnica de los fármacos y la información actualizada ofrecida por las distintas compañías farmacéuticas y las autoridades sanitarias.

Tabla 7. Inhibidores de la proteasa (1ª parte): indinavir, ritonavir, saquinavir, nelfinavir y fosamprenavir

Nombre genérico	Indinavir	Ritonavir	Saquinavir	Nelfinavir	Fosamprenavir
Nombre comercial	<i>Crixivan®</i>	<i>Norvir®</i>	<i>Invirase®</i>	<i>Viracept®</i>	<i>Telzir®</i>
Dosis	800 mg TID IDV/r 800/100 BID	Como potenciador de otros IP : 100 ó 200 mg con cada dosis de IP Como IP (600 mg BID) se desaconseja	SQV/r 1000/100 BID Tomar con comida grasa.	750 mg TID ó 1250 mg BID Tomar con comida grasa	FPV/r 700/100 mg c/12h Con ó sin alimentos
Recomendación	Si no potenciado, debe tomarse con estómago vacío (restricción dietética) Ingesta abundante de líquidos no carbónicos				
Presentación comercial	cáps. 200 y 400 mg	sol. oral 80 mg/ml cáps. 100 mg comp 100 mg próxima comercialización	comp 200 mg comp 500 mg	comp 500 mg polvo (1 cuch 1g =50 mg de NFV)	comp 700 mg suspensión oral 50 mg/mL
Biodisponibilidad Oral	65 % (IC 90 %, 58 a72 %), tras dosis única de 800 mg. ^ω	No se ha determinado su biodisponibilidad absoluta en humanos ^ω	4% (1-9%) ^c en ausencia de RTV ^ω No se ha determinado su biodisponibilidad absoluta de SQV potenciado con RTV en humanos ^ω	No se ha determinado su biodisponibilidad absoluta en humanos ^ω	No se ha determinado su biodisponibilidad absoluta en humanos ^ω
Efecto de los alimentos	No potenciado y en presencia de alimentos grasos el AUC se reduce un 77%, por lo que debe administrarse en ayunas o con una comida ligera de bajo contenido graso. Cuando se administra potenciado con ritonavir puede tomarse junto con	En presencia de alimentos se reduce el AUC entre un 21 y un 23%. ^Ω El sabor amargo de Norvir solución puede enmascararse si se mezcla con un batido de chocolate. ^ω	En voluntarios sanos, el AUC aumentó más de 6 veces al tomarlo con una comida grasa, en comparación con su ingesta en ayunas. Se recomienda tomar nelfinavir dentro de las 2h después de comer. ^Ω	En presencia de alimentos aumenta el AUC entre 2 y 5 veces (aumento mayor cuanto mayor contenido calórico), por lo que nelfinavir debe administrarse con comida. ^Ω	Comprimidos: la administración con alimentos no modificó significativamente el AUC, por lo que puede ingerirse con o sin alimentos. Solución oral: en presencia de alimentos el AUC se redujo un 28% en comparación con su ingesta

	las comidas. ^Ω				en ayunas. En adultos, se recomienda tomar la solución en ayunas y en los niños con alimentos porque mejora la tolerabilidad. ^Ω
Semivida plasmática	1,8 ± 0,4 horas ^{a, ω}	5 horas (100 mg/24h) ^ω 5 horas (100 mg/12h) ^ω 4 horas (200 mg/24h) ^ω 8 horas (200 mg/12h) ^ω	7 horas ^ω	3,5-5 horas ^ω	7,7 horas (FPV) ^ω 15 – 23 horas (FPV/r) ^ω
C_{max}	11144 (IC 90% = 9192 a 13512) nanoM (=7,9 microg/mL) con IDV 800 mg/8h ^ω 19001 (IC 90% = 17538 a 20588) nanoM (=13,5 microg/mL) con IDV/r 800/100 mg/12h ^ω	En VIH+: 0,84 ± 0,39 microg/ml ^a (100 mg/24h) ^ω 0,89 microg/ml (100 mg/12h) 3,4 ± 1,3 microg/ml ^a (200 mg/24h) ^ω 4,5 ± 1,3 microg/ml ^a (200 mg/12h) ^ω	En VIH+: 5208 nanog/ml (1.536-14.369) ^c (SQV/r 1000/100 mg/12h con comida rica en grasa) ^ω	3,0 ± 1,6 microg/ml (750 mg/8h) ^ω 4,0 ± 0,8 microg/ml (1250 mg/12h) ^ω	FPV/r 700/100 mg c/12h: 6,08 microg/ml (IC95%: 5,38 a 6,86) ^ω FPV/r 1400/100 mg c/24h: 7,93 microg/ml (IC95%:7,25 a 8,68) ^Ω FPV/r 1400/200 mg c/24h: 7,24microg/ml (IC95%:6,32 a 8,28) ^Ω
C_{min}	211 (IC 90% = 163 a 274) nM (0,15 microg/mL), con IDV 800 mg/8h ^ω 2274 (IC90% = 1701 a 3042) nM (=1,6 microg/mL, con IDV/r 800/100 mg/12h) ^ω	En VIH+: 0,08 ± 0,04 microg/ml ^a (100 mg/24h) ^ω 0,22 microg/ml (100 mg/12h) 0,16 ± 0,10 microg/ml ^a (200 mg/24h) ^ω 0,6 ± 0,2 microg/ml ^a (200 mg/12h) ^ω Las C _{min} descienden con el tiempo, posiblemente debido a la inducción enzimática, pero parecen estabilizarse al final de 2 semanas. ^ω	En VIH+: 1179 nanog/ml (334-5.176) ^c (SQV/r 1000/100 mg/12h con comida rica en grasa) ^ω	1,4 ± 0,6 microg/ml con la dosis de la mañana y 1,0 ± 0,5 microg/ml con la de la tarde (750 mg/8h) ^ω 2,2 ± 1,3 microg/ml con la dosis de la mañana y 0,7 ± 0,4 microg/ml con la de la tarde. ^ω (1250 mg/12h) ^ω	FPV/r 700/100 mg c/12h: 2,12 microg/ml (IC95%:1,77 a 2,54) ^ω FPV/r 1400/100 mg c/24h: 0,86 microg/ml (IC95%:0,74 a 1,01) ^Ω FPV/r 1400/200 mg c/24h: 1,45 microg/ml (IC95%:1,16 a 1,81) ^Ω
AUC	AUC _{0-8h} de 27813 nanoM*h IC 90% = 22185 a 34869) (=19803 nanog*h/mL)(con IDV 800	En VIH+: AUC _{24h} 6,6 ± 2,4 microg.h/ml ^a (100 mg/24h) ^ω AUC _{12h} 6,2 microg.h/ml ^a (100	En VIH+: AUC _{0-12h} 34926 nanog.h/ml (11826-105992) ^c (SQV/r 1000/100	AUC _{24h} 43,6 ± 17,8 microg-h/ml (750 mg/8h) ^ω AUC _{24h} 52,8 ± 15,7 microg-h/ml 1250	FPV/r 700/100 mg c/12h: AUC _{0-12h} 39,6 (IC95%:34,5 a 45,3) microg .h. /ml ^ω FPV/r 1400/100 mg c/24h:

	mg/8h. ^ω 116067 nanoM*h (IC90% = 101680 a 132490) (=82639 nanog*h/mL)(con IDV/r 800/100 mg/12h. ^ω	mg/12h) ^ω AUC _{24h} 20,0 ± 5,6 microg.h/ml ^a (200 mg/24h) ^ω AUC _{12h} 21,92 ± 6,48 microg.h/ml ^a (200 mg/12h) ^ω	mg/12h con comida rica en grasa) ^ω	mg/12h) ^ω	AUC _{0-24h} 66,4 microg.h/mL (IC95%:61,1 a72,1) ^α FPV/r 1400/200 mg c/24h: AUC _{0-24h} 69,4 microg.h/mL (IC95%:59,7 a 80,8) ^α
--	--	--	--	----------------------	---

Nombre genérico	Indinavir	Ritonavir	Saquinavir	Nelfinavir	Fosamprenavir
CI_{50/90/95} frente a VIH-1 <i>in vitro</i>	CI ₉₅ : 50-100 nanoM ^ω (=35-71 nanog/mL)	--	CI ₅₀ : 1-10 nM ^ω (=0,76-7,6 nanog/mL) CI ₅₀ ajustada al suero (50 % suero humano) 25-250 nM (=19,2-192 nanog/mL) CI ₉₀ : 5-50 nM ^ω (=3,8-38 nanog/mL)	CI ₉₅ : 58 nM (7 - 111 nM) ^{c, ω} (=38,5 nanog/mL)	CI ₅₀ entre 0,012 a 0,08 microM en células con infección aguda y 0,41 microM en células con infección crónica ^ω
Actividad	VIH-1,2 ^ω	VIH-1,2, aunque en la actualidad se utiliza como potenciador farmacocinético. ^ω	VIH-1,2 ^ω	VIH-1,2 ^ω	VIH-1,2 ^{ω, α}
Penetración en LCR (LCR:plasma)	No hay datos ^ω IDV grado 3 e IDV/r grado 4 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	Grado 1 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	Insignificante con Inivirase 600 mg/8h. ^ω SQV±RTV: grado 1 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	Grado 1 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	Penetración insignificante ^ω Grado 2 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)
Metabolización	CYP3A4	CYP3A4	CYP3A4	CYP3A4	CYP3A4
Efectos Adversos	Nefrolitiasis Intolerancia G-I. Hiperbilirrubinemia Hiperglucemia Dislipemia Lipodistrofia Posible aumento del sangrado en hemofílicos	(En dosis reducidas la prevalencia de los efectos adversos es muy baja) Intolerancia G-I (vómitos, diarrea) Parestesias orales Hepatitis Hiperglucemia Dislipemia Lipodistrofia - Posible aumento del sangrado en hemofílicos	Intolerancia G-I (diarrea) Cefalea ↑ transaminasas Hiperglucemia Dislipemia Lipodistrofia Posible aumento del sangrado en hemofílicos	Diarrea Hiperglucemia Dislipemia Lipodistrofia Posible aumento del sangrado en hemofílicos	Intolerancia G-I (diarrea) Exantema Cefalea Hiperglucemia Dislipemia Lipodistrofia Posible aumento del sangrado en hemofílicos

Nombre genérico	Indinavir	Ritonavir	Saquinavir	Nelfinavir	Fosamprenavir
Interacciones					
Asociaciones contraindicadas	<p>Alfuzosina</p> <p>Amiodarona</p> <p>Astemizol</p> <p>Atazanavir</p> <p>Colchicina (si insuf. renal o hepática)</p> <p>Estatinas (excepto atorvastatina, fluvastatina y pravastatina)</p> <p>Cisaprida</p> <p>Deriv. Ergotamina</p> <p>Halofantrina</p> <p>Hypericum (Hierba de San Juan)</p> <p>Lumefantrina</p> <p>Midazolam oral¹⁰</p> <p>Pimozida</p> <p>Rifampicina</p> <p>Salmeterol</p> <p>Sildenafil (hipertensión pulmonar)</p> <p>Terfenadina</p> <p>Triazolam</p>	<p>Alfuzosina</p> <p>Amiodarona</p> <p>Anticonceptivos orales</p> <p>Astemizol</p> <p>Cisaprida</p> <p>Cloracepto</p> <p>Clozapina</p> <p>Colchicina (si insuf. renal o hepática)</p> <p>Dextropropoxif.</p> <p>Diacepam</p> <p>Deriv. ergotamina</p> <p>Disulfiram</p> <p>Encainida</p> <p>Estatinas (excepto pravastatina)</p> <p>Estazolam,</p> <p>Éxtasis</p> <p>Flecainida</p> <p>Fluracepam</p> <p>Fluticasona</p> <p>Halofantrina</p> <p>Hypericum (Hierba de San Juan)</p> <p>Lumefantrina</p> <p>Meperidina</p> <p>Metanfetamina</p> <p>Midazolam oral¹⁰</p> <p>Pimozida</p> <p>Piroxicam</p> <p>Propafenona</p>	<p>Ajo, suplementos (utilizar SQV/r)</p> <p>Alfuzosina</p> <p>Astemizol</p> <p>Estatinas (excepto atorvastatina, fluvastatina y pravastatina)</p> <p>Carbamacepina</p> <p>Cisaprida</p> <p>Colchicina (si insuf. renal o hepática)</p> <p>Dexametasona</p> <p>Deriv. ergotamina</p> <p>Efavirenz</p> <p>Fenitoína</p> <p>Fenobarbital</p> <p>Fluticasona</p> <p>Halofantrina</p> <p>Hypericum (Hierba de San Juan)</p> <p>Lumefantrina</p> <p>Midazolam oral¹⁰</p> <p>Nevirapina</p> <p>Pimozida</p> <p>Rifampicina</p> <p>Salmeterol</p> <p>Sildenafil (hipertensión pulmonar)</p> <p>Terfenadina</p> <p>Triazolam.</p>	<p>Alfuzosina</p> <p>Anticonceptivos orales</p> <p>Astemizol</p> <p>Bupropion</p> <p>Estatinas (excepto atorvastatina, fluvastatina y pravastatina)</p> <p>Cisaprida</p> <p>Colchicina (si insuf. renal o hepática)</p> <p>Deriv. Ergotamina</p> <p>Halofantrina</p> <p>Hypericum (Hierba de San Juan)</p> <p>Lumefantrina</p> <p>Midazolam oral¹⁰</p> <p>Omeprazol y afines</p> <p>Pimozida</p> <p>Rifampicina</p> <p>Salmeterol</p> <p>Sildenafil (hipertensión pulmonar)</p> <p>Terfenadina</p> <p>Triazolam</p>	<p>Alfuzosina</p> <p>Anticonceptivos orales</p> <p>Astemizol</p> <p>Cisaprida</p> <p>Colchicina (si insuf. renal o hepática)</p> <p>Deriv. ergotamina</p> <p>Estatinas (excepto atorvastatina, fluvastatina y pravastatina)</p> <p>Halofantrina</p> <p>Hypericum (Hierba de San Juan)</p> <p>Lumefantrina</p> <p>Lopinavir/r</p> <p>Midazolam oral¹⁰</p> <p>Pimozida</p> <p>Rifampicina</p> <p>Salmeterol</p> <p>Sildenafil (hipertensión pulmonar)</p> <p>Terfenadina</p> <p>Triazolam</p>

		Quinidina Salmeterol Sildenafil (hipertensión pulmonar) Terfenadina Triazolam Voriconazol Zolpidem			
--	--	---	--	--	--

Nombre genérico	Indinavir	Ritonavir	Saquinavir	Nelfinavir	Fosamprenavir
Antiácidos	Espaciarlos 1h	No hay datos	No hay datos	No hay datos	Ausencia de interacciones
Inhibidores de la bomba de protones	Utilizar IDV/r (↓47% AUC IDV)	No hay datos	NRAD (omeprazol 40 mg/d ↑80% AUC SQV sin toxicidad)	Contraindicado (↓36% AUC NFV)	NRAD (↓Cmax, pero AUC y Cmin FPV sin cambios).
Antihistamínicos H2	No hay datos.	No hay datos	NRAD	No hay datos	NRAD (↓30% AUC, pero Cmin sin cambios)
Antimicobact.					
- Rifampicina	Contraindicado tanto con IDV como con IDV/r	↓35% AUC RTV. NRAD (RTV a dosis plenas). Monitorizar toxicidad hepática	Contraindicado ⁹	Contraindicado	Contraindicado
- Rifabutina (RFB)⁰	1000 mg c/8h IDV. RFB 150 mg c/24h ó 300 mg 3veces/semana ⁰ .	RFB 150-300 mg 3veces /semana ⁰	Contraindicado como único IP ^{0,2}	1000 mg c/8h ó 1250 mg c/12h NFV. RFB 150 mg c/24h ó 300 mg 3veces /semana ⁰ .	NRAD FPV/r RFB 150-300 mg 3veces /semana ⁰
- Claritromicina	NRAD Considerar tratamientos alternativos para indicaciones diferentes de MAC En presencia de RTV, ajustar dosis de claritro si función renal alterada ¹	Considerar tratamientos alternativos para indicaciones diferentes de MAC (100% AUC 14-OH-claritromicina) Ajustar dosis claritro si func. renal alterada ¹ .	NRAD Dado que se administra con RTV, considerar tratamientos alternativos para indicaciones diferentes de MAC	NRAD	FPV no potenciado: NRAD FPV/r: Considerar tratamientos alternativos para indicaciones diferentes de MAC Ajustar dosis claritro si func. renal alterada ¹ .
Antiepilépticos:	Posible ↓Cp IDV. Monitorizar Cp antiepiléptico y ARV. Con carbamacepina ↓Cp IDV importantes. Evitar asociarlos	Monitorizar Cp antiepiléptico y ARV. RTV puede ↓Cp de fenitoína y lamotrigina. Datos iniciales indican que también podría ↓Cp de valproico. Varios casos descritos de toxicidad por carbamacepina.	No hay datos. Evitar la combinación o monitorizar estrechamente los niveles de ambos.	Posible ↓Cp NFV. Monitorizar Cp antiepiléptico y ARV. Algún caso descrito de toxicidad por carbamacepina.	Posible ↓Cp APV. Monitorizar Cp antiepiléptico y ARV.
- Carbamacepina, fenitoína, fenobarbital					
Anticoagulantes orales	Los IP pueden alterar las Cp de los anticoagulantes. Existen casos descritos de reducción del efecto anticoagulante con requerimiento de aumento de dosis de acenocumarol y warfarina al asociarlos a RTV ó IDV. Monitorizar estrictamente el tiempo de protrombina.				

Nombre genérico	Indinavir	Ritonavir	Saquinavir	Nelfinavir	Fosamprenavir
Anticonceptivos orales:	NRAD	↓40% AUC etinilestradiol. No debe administrarse junto con anticonceptivos que contengan etinilestradiol o noretindrona. Deben considerarse métodos anticonceptivos alternativos o adicionales.	Disminuye los niveles de etinilestradiol. No modifica los niveles de noretindrona. No debe administrarse junto con anticonceptivos que contengan etinilestradiol o noretindrona. Deben considerarse métodos anticonceptivos alternativos o adicionales.	↓47% AUC etinilestradiol. No debe administrarse junto con anticonceptivos que contengan etinilestradiol o noretindrona. Deben considerarse métodos anticonceptivos alternativos o adicionales. No modifica los niveles de medroxiprogesterona (datos preliminares).	FPV/r 700/100 mg/12h: ↓ 37% AUC etinilestradiol ↓ 34% AUC noretindrona. No debe administrarse junto con anticonceptivos que contengan etinilestradiol o noretindrona. Deben considerarse métodos anticonceptivos alternativos o adicionales.
Antifúngicos imidazólicos	Con fluconazol NRAD. Con ketoconazol ↓IDV 600 mg c/8h. Con itraconazol posible ↑Cp IDV. Con fluconazol NRAD de ninguno. Con voriconazol + IDV 800 mg c/8h: NRAD. Con IDV/r no hay datos (RTV 400 mg c/12h contraindicado; RTV 100 mg c/12h: evitar a menos que el balance riesgo/beneficio justifique su uso. Ver RTV). Monitorizar estrechamente.	Máx 200 mg/día de ketoconazol e itraconazol. Con fluconazol NRAD de ninguno. Voriconazol contraindicado (estudio con 400 mg c/12h de RTV: ↓82% AUC voriconazol, AUC RTV sin cambios; estudio con 100 mg c/12h de RTV: ↓39% AUC voriconazol, AUC RTV sin cambios importantes).	Fluconazol: NRAD Voriconazol y SQV+/-RTV: no hay datos (RTV 400 mg c/12h contraindicado; RTV 100 mg c/12h: evitar a menos que el balance riesgo/beneficio justifique su uso. Ver RTV). Se recomienda monitorizar estrechamente. ketoconazol e itraconazol máx 200 mg/día.	No se han descrito interacciones clínicamente importantes con fluconazol, itraconazol, ketoconazol o caspofungina. Con Voriconazol: no hay datos. Se recomienda monitorizar estrechamente (podría aumentar la toxicidad de ambos).	Con FPV/r no sobrepasar 200 mg/día de ketoconazol e itraconazol. Posaconazol + FPV no potenciado: evitar (↓23% AUC posaconazol). No hay datos con FPV/r. - Con voriconazol y FPV+/- RTV no hay datos (RTV 400 mg c/12h contraindicado; RTV 100 mg c/12h: evitar a menos que el balance riesgo/beneficio justifique su uso. Ver RTV). Se recomienda monitorizar estrechamente.

Nombre genérico	Indinavir	Ritonavir	Saquinavir	Nelfinavir	Fosamprenavir
<u>Estatinas:</u>	Lovastatina y simvastatina contraindicadas. Con fluvastatina y pravastatina interacción poco probable. Atorvastatina: asociar con precaución (iniciar con dosis bajas máximo 10 mg/día).	Atorvastatina, fluvastatina lovastatina y simvastatina contraindicadas. Con pravastatina interacción poco probable. SQV/RTV 400/400 mg c/12h ↓50% pravastatina (probablemente NRAD) y ↑x4,5 AUC atorvastatina (iniciar con dosis bajas máximo 10 mg/día).	Lovastatina y simvastatina contraindicadas. Con fluvastatina interac poco probable. Atorvastatina: asociar con precaución (iniciar con dosis bajas máximo 10 mg/día). Con SQV/RTV 400/400 mg c/12h ↓50% pravastatina (probablem NRAD) y ↑x4,5 AUC atorvastatina (iniciar con dosis bajas máximo 10 mg/día).	Lovastatina y simvastatina contraindicadas. Con fluvastatina interacción poco probable. Pravastatina es segura pero probablemente requiera aumento de dosis (↓47% AUC). Atorvastatina: Asociar con precaución (iniciar con dosis bajas máximo 10 mg/día.).	Lovastatina y simvastatina contraindicadas. Con fluvastatina y pravastatina interacción poco probable. FPV aumentó 2,3 veces el AUC de atorvastatina (10 mg/día): asociar con precaución (iniciar con dosis bajas máximo 10 mg/día).
<u>Etanol:</u>	El uso agudo o crónico de etanol alteró mínimamente la farmacocinética de los IP. Antabus: algunos IP podrían dar lugar a una reacción de tipo disulfiram por su contenido en etanol: Norvir® solución oral (43% v/v); Norvir cápsulas (12% p/p); Kaletra® solución oral (42%); Aptivus cápsulas (7% p/p =100 mg/cáps). Kaletra® en comprimidos no contiene alcohol. Agenerase® en solución tiene un elevado contenido de propilenglicol (550 mg/mL), que se metaboliza a través de la alcohol deshidrogenasa, por lo que el consumo de etanol junto con estos IPs podría producir toxicidad. Kaletra® en cápsulas y Agenerase® en cápsulas también contienen propilenglicol, pero en menor cantidad.				
<u>Fármacos empleados para tratar la gota</u>	Gota-profilaxis: colchicina con IP potenciado: 0,3 mg c/24h-48h; colchicina con FPV no potenciado: 0,3-0,6 mg/día. Gota-tratamiento: Colchicina con IP potenciado: 0,6 mg + 0,3 mg 1h después y no readministrar antes de 3 días. Colchicina con FPV no potenciado: 1,2 mg y no readministrar antes de 3 días. Fiebre mediterránea familiar: colchicina con IP potenciado: máximo 0,3 mg/12h; con FPV no potenciado: máximo 0,6 mg/12h. (Según recomendaciones de la FDA; de las presentaciones disponibles en España, la única que podría ajustarse aproximadamente sería el Colchimax® de 0,5 mg).				
<u>Fármacos empleados para tratar la hipertensión pulmonar</u>	Bosentan (Tracleer®): si el paciente recibe IPs e inicia bosentan: iniciar 62,5 mg c/24-48h. Si el paciente recibe bosentan e inicia IPs: suspender bosentan mínimo 36 horas antes y no reiniciar hasta 10 días después de iniciar el IP a una dosis de 62,5 mg c/24-48h. No se recomienda asociar bosentan a ATV no potenciado por riesgo de reducción de niveles plasmáticos de atazanavir. Tadalafilo (Cialis®): si el paciente recibe IPs e inicia tadalafilo: iniciar 20 mg c/24h y aumentar luego a 40 mg/día según tolerabilidad. Si el paciente recibe tadalafilo y debe iniciar IPs: suspender tadalafilo mínimo 24h antes y no reiniciar hasta 7 días después de iniciar el IP a una dosis de 20 mg c/24h, luego aumentar a 40mg/día.				

Nota: En esta tabla se ha corregido el error del nombre comercial de bosentan (Revatio por Tracleer)

Nombre genérico	Indinavir	Ritonavir	Saquinavir	Nelfinavir	Fosamprenavir
<u>Fármacos empleados para tratar la influenza</u>	Zanamivir/amantadina: una interacción con los IPs se considera poco probable. Oseltamivir se ha relacionado con efectos adversos neuropsiquiátricos, aunque no se puede descartar que éstos sean debidos, al menos en parte, a la propia enfermedad. Los IPs al bloquear la glicoproteína-P podrían aumentar la penetración de oseltamivir en el SNC y empeorar sus efectos adversos. Se recomienda asociarlos con precaución hasta que no se disponga de más datos.				
<u>Inmunosupresores:</u>	Posible ↑Cp ciclosporina, prednisona, tacrolimus y sirolimus. Monitorizar niveles/toxicidad del inmunosupresor.	RTV puede aumentar hasta 3 veces Cp ciclosporina y tacrolimus. ↑30% AUC de prednisolona tras la administración de prednisona. Posible ↑Cp sirolimus. Monitorizar niveles/toxicidad inmunosupresor. Micofenolato se glucuronida por lo que RTV podría ↓ sus Cp. Monitorizar niveles/eficacia.	Posible ↑Cp ciclosporina, prednisona, tacrolimus y sirolimus. Monitorizar niveles/toxicidad del inmunosupresor.	Posible ↑Cp ciclosporina, prednisona, tacrolimus y sirolimus. Monitorizar niveles/toxicidad del inmunosupresor. Un paciente con trasplante de hígado requirió una reducción muy importante en la dosis de tacrolimus. Las Cp NFV no se alteraron. Micofenolato se glucuronida por lo que NFV podría ↓ sus Cp. Monitorizar niveles/eficacia.	Posible ↑Cp ciclosporina, prednisona, tacrolimus y sirolimus. Monitorizar niveles/toxicidad del inmunosupresor.
<u>Inmunosupresores:</u>	La dosis de ciclosporina inicial debe ser aprox 1/10 de la habitual y puede requerir reducciones progresivas a lo largo del tiempo. En algunos casos la dosis al cabo de 2 años es tan sólo un 25% de la inicial (probablemente por aumento de la absorción intestinal a lo largo del tiempo). Tacrolimus: se ha descrito una interacción muy importante con LPV/r (pueden ser necesarios menos de 1mg de tacrolimus a la semana y puede ser necesario esperar de 3 a 5 semanas (según función hepática) antes de administrar otra dosis de tacrolimus al iniciar LPV/r. También se ha descrito interacción con otros IP (p. ej . mayor con NFV que con IDV, requiriéndose en un estudio unos 0,6 mg diarios de tacrolimus con estos IP. Tras el cambio de NFV por FPV no potenciado pueden requerirse aumentos de dosis (se han descrito reducciones del 50% de sus Cp)				

Nombre genérico	Indinavir	Ritonavir	Saquinavir	Nelfinavir	Fosamprenavir
Interferón/ Ribavirina	Ribavirina: no existe evidencia de interacción con los IP. Interferón: su vía de eliminación no está claramente establecida así como tampoco su posible efecto inhibitor sobre el citocromo P-450 (ha mostrado p. ej. ↑Cp de teofilina y barbituratos). No hay datos con respecto a posibles interacciones con los IP				
Metadona(MT)	<i>in vitro</i> ↑30% AUC MT. Probablemente NRAD	Metadona: <i>in vitro</i> x2 AUC MT <i>in vivo</i> ↓36% AUC MT. ↑dosis MT. Oxicodona: ↑ x3 AUC oxicodona. Puede requerir reducción de dosis.	NRAD	↓40-50% Cp MT en algunos pacientes. Solo requiere pequeños ↑dosis.	Algunos pacientes pueden requerir aumento de dosis de MT.

<p>Otros fármacos</p>	<p>Fluticasona inh.: en un estudio caso-control, una elevada proporción de los pacientes expuestos a RTV+fluticasona (7/8; 88%) presentaron supresión adrenal, que fue sintomática en un 57% de los casos. Algún caso descrito de reducción de eficacia de <u>L-tiroxina</u>. IDV puede aumentar 4.4 veces AUC <u>sildenafil</u> (max 25 mg en un periodo de 48h). Esta interacción también se produce con <u>ildenafil</u> (máx 2,5 mg c/72h si asociado a RTV) y con <u>tadalafilo</u> (iniciar con 5 mg y no exceder 10 mg c/72h). Con <u>omeprazol</u> espaciar 1h (ausencia de interacción con IDV/r) Vinblastina: ↑ riesgo de neutropenia.</p> <p>Puede ↑ Cp de los fármacos que se metabolizan a través del CYP3A4³.</p>	<p>Benzimidazoles: ↓ 27% AUC <u>albendazol</u>, ↓43% AUC <u>mebendazol</u>. Bupropión: RTV puede ↓Cp bupropion. Docetaxel: casos descritos de ↑ toxicidad. Fluticasona inh.: en un estudio caso-control, una elevada proporción de los pacientes expuestos a RTV+fluticasona (7/8; 88%) presentaron supresión adrenal, que fue sintomática en un 57% de los casos. Fluoxetina: se han descrito 3 casos de síndrome serotoninérgico. Algún caso descrito de reducción de eficacia de <u>L-tiroxina</u>. Quinina: ↑ x4 AUC quinina. Reducir dosis RTV puede aumentar 11 veces AUC <u>sildenafil</u> (max 25 mg en un periodo de 48h). Esta interacción también se produce con <u>ildenafil</u> (máx 2,5 mg c/72h) y con <u>tadalafilo</u> (iniciar con 5 mg y no exceder 10 mg c/72h). Vinblastina: ↑ riesgo de neutropenia. Puede ↑ Cp de los fármacos que se metabolizan a través de los CYP3A4⁴>2D6⁵, ↑ó↓ Cp si 2C9⁶ y ↓ Cp si CYP1A2⁷ y glucuronidación⁸.</p>	<p>Fluticasona inh.: en un estudio caso-control, una elevada proporción de los pacientes expuestos a RTV+fluticasona (7/8; 88%) presentaron supresión adrenal, que fue sintomática en un 57% de los casos. Digoxina: ↑49%AUC de digoxina. Monitorizar digoxinemia. SQV puede aumentar 3.1 veces AUC <u>sildenafil</u> (max 25 mg en un periodo de 48h). Esta interacción también se produce con <u>ildenafil</u> (máx 2,5 mg c/24h y 2,5 mg c/72h si asociado a RTV) y con <u>tadalafilo</u> (iniciar con 5 mg y no exceder 10 mg c/72h).</p> <p>Vinblastina: ↑ riesgo de neutropenia.</p> <p>El <u>zumo de pomelo</u> aumenta los niveles de SQV.</p> <p>Puede ↑ Cp de los fármacos que se metabolizan a través del CYP3A4³</p>	<p>Felodipino: un caso descrito de interacción (edema, mareo, hipotensión) en una mujer que recibía 50 mg/día de metoprolol y 5 mg/día de felodipino. Posible aumento Cp <u>sildenafil</u> (max 25 mg en un periodo de 48h). Esta interacción también se produce con <u>ildenafil</u> (máx 2,5 mg c/24h) y con <u>tadalafilo</u> (iniciar con 5 mg y no exceder 10 mg c/72h). Vinblastina: ↑ riesgo de neutropenia.</p> <p>Puede ↑ Cp de los fármacos que se metabolizan a través del CYP3A4³ ↓ Cp de los que sufren glucuronidación⁸</p>	<p>Fluticasona inh.: en un estudio caso-control, una elevada proporción de los pacientes expuestos a RTV+fluticasona (7/8; 88%) presentaron supresión adrenal, que fue sintomática en un 57% de los casos.</p> <p>Posible aumento Cp <u>sildenafil</u> (max 25 mg en un periodo de 48h). Esta interacción también se produce con <u>ildenafil</u> (máx 2,5 mg c/24h y 2,5 mg c/72h si asociado a RTV) y con <u>tadalafilo</u> (iniciar con 5 mg y no exceder 10 mg c/72h).</p> <p>Con FPV/r 700/100 mg c/12h se redujo aprox un 50% el AUC de <u>paroxetina</u> (20 mg/día).</p> <p>Vinblastina: ↑ riesgo de neutropenia.</p> <p>Puede ↑ ó ↓ Cp de los fármacos que se metabolizan a través del CYP3A4³, ya que es un inhibidor de este isoenzima pero los datos también sugieren que puede inducirlo.</p>
------------------------------	---	--	---	---	--

Nombre genérico	Indinavir	Ritonavir	Saquinavir	Nelfinavir	Fosamprenavir
NN	(ver la tabla NN)				
IP					
- IDV		IDV/r: 800/100-200 mg c/12h. En investigación pauta IDV/r: 1200/200 mg c/24 h. No existen datos de eficacia y seguridad a largo plazo	↑x4-8 AUC SQV. Sin cambios AUC IDV. No hay datos sobre ajuste de dosis (antagonismo <i>in vitro</i> y complicado de dosificar).	NFV/IDV: 1250/ 1200 mg c/12h. (datos limitados) No existen datos de eficacia y seguridad a largo plazo	No hay datos suficientes sobre ajuste de dosis.
- RTV			SQV/r: 400mg/400 mg BID SQV/r: 1000/100 mg/12 h. En investigación en pacientes naive SQV/r 1500/100-200 mg/24 h (preferiblemente en el desayuno).	RTV 100 ó 200 mg c/12h: ↑30% AUC NFV. Se desaconseja esta asociación.	FPV/r 700/100 mg c/12h (En pacientes <i>naive</i> puede administrarse una vez al día: FPV/r 1400/100-200 mg c/24h. No se recomienda en pacientes pretratados).
- SQV				Se desaconseja esta asociación	Datos iniciales sobre ajuste de dosis: SQV-CGD/FPV/RTV 1000/700/200 mg c/12h (Se recomienda monitorizar niveles plasmáticos). No existen datos de eficacia y seguridad a largo plazo
- NFV					No hay datos

AUC: área bajo la curva; BID: dos veces al día; Cp: concentraciones plasmáticas; IT: interacción; NRAD: no requiere ajuste de dosis; NS: no significativa; QD: una vez al día.

^a Expresado como media ± DE si no se indica lo contrario

^b Expresado como mediana ± rango intercuartil

^c Expresado como rango

⁰ La mayoría de estudios han sido realizados en voluntarios sanos por lo que en los pacientes es probable que las dosis recomendadas inicialmente con IP/r (150 mg tres veces por semana) no sean suficientes. Se han descrito fracasos de tratamiento antituberculoso con aparición de resistencias en pacientes con inmunodepresión avanzada tratados con IP/r y rifabutina 150 mg c/48 horas o tres veces por semana. En estos casos valorar dosis mayores: rifabutina 300 mg tres veces semana. Dado que el ajuste de dosis no está claramente establecido y la determinación de niveles de rifabutina no está disponible en la mayoría de hospitales, se recomienda, si es posible, valorar otras alternativas terapéuticas.

¹ ClCr 30-60 ml/min: reducir un 50%, ClCr <30 ml/min: reducir un 75% (máx. 1g/día).

² SQV junto con RTV (400/400 mg c/12h ó 1000/100 mg c/12h) pueden administrarse con dosis reducidas de rifabutin (150 mg 3 veces /semana)(experiencia limitada).

³ Principales fármacos metabolizados a través del CYP3A4: alprazolam, amiodarona, amlodipino, ciclofosfamida, ciclosporina, clonacepam, cloracepato, dextropropoxifeno, diazepam, diltiazem, disopiramida, estazolam, etionamida, etosuximida, felodipino, fentanilo, finasterida, flunaricina, fluracepam, lacidipino, lidocaína, loratadina, meperidina, nicardipino, nifedipino, nimodipino, nitrendipino, prednisona, quinidina, quinina, sertralina, sildenafil (Viagra®), vardenafilo, tadalafilo, tacrolimus, verapamilo, vincristina y zolpidem.

⁴ RTV puede aumentar hasta 3 veces el AUC de los siguientes fármacos metabolizados a través del CYP3A: alfentanilo, antagonistas del calcio (amlodipino, diltiazem, felodipino, nicardipino, nifedipino, nisoldipino, verapamilo), carbamacepina, ciclosporina, citostáticos (etopósido, docetaxel, paclitaxel, tamoxifeno, vinblastina y vincristina), clonacepam, dexametasona, disopiramida, eritromicina, etosuximida, fentanilo, lidocaína, loratadina, nefazodona, ondansetron, prednisona, quinina, rifampicina, sertralina, tacrolimus, taxol y trazodona, entre otros.

⁵ Aumento de 1.5 a 3 veces en el AUC de los fármacos metabolizados a través del CYP2D6: amitriptilina, clomipramina, clorpromacina, desipramina, fluoxetina, haloperidol, imipramina, maprotilina, metoprolol, mexiletina, nortriptilina, paroxetina, perfenazina, pindolol, propranolol, risperidona, timolol, tioridacina, tramadol y venlafaxina.

⁶ Fármacos metabolizados a través del CYP2C9/19: diclofenac, ibuprofeno, indometacina, fenitoína, gliburida, glipizida, lansoprazol, losartan, omeprazol, proguanilo y tolbutamida.

⁷ teofilina, tacrina, clozapina, tacrina.

⁸ atovaquona, clofibrato, codeína, difenoxilato, ketoprofeno, ketorolaco, lamotrigina, loracepam, metoclopramida, morfina, naproxeno, oxacepam, propofol, temacepam y valproico.

⁹ En un estudio en voluntarios sanos se observó una elevada incidencia de hepatotoxicidad con esta combinación (rifampicina 600 mg c/24h + SQV/r 1000/100 mg c/12h).

¹⁰ Según datos iniciales el midazolam intravenoso podría administrarse junto con los inhibidores de la proteasa reduciendo la dosis y bajo estrecha monitorización clínica (UCI o similar). Sin embargo, el midazolam oral está contraindicado.

^w Información procedente de la ficha técnica europea. EPARS: European Public Assessment Reports. Disponible en:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/includes/medicines/medicines_landing_page.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid= Con acceso [5/12/2010].

^Q Información procedente de la ficha técnica americana (fuentes: FDA and First Data Bank, Inc). Disponible en: http://www.rxlist.com/drugs/alpha_a.htm .Con acceso [5/12/2010].

[&] Guardiola JM, Soriano V (Eds). Tratamiento de la infección por VIH-SIDA. Fármacos y combinaciones. Décima Edición. Barcelona: Publicaciones Permanyer 2007.

NOTA: debido a que la información científica relacionada con los fármacos antirretrovirales se renueva constantemente, se recomienda consultar la ficha técnica de los fármacos y la información actualizada ofrecida por las distintas compañías farmacéuticas y las autoridades sanitarias.

Tabla 7. Inhibidores de la proteasa (2ª parte): lopinavir/r, atazanavir, darunavir, tipranavir

Nombre genérico	Lopinavir	Atazanavir	Darunavir	Tipranavir
Nombre comercial	Kaletra®	Reyataz®	Prezista®	Aptivus®
Dosis	400/100 mg c/12h 800/200 mg /24 h	300/100 mg r/24 h ó 400 mg c/24h Nota: En un estudio se observó que tan sólo un 38% de los pacientes tratados con ATV no potenciado alcanzaron una C _{min} >150 ng/mL.	600/100 mg c/12h (en pacientes pretratados). 800/100 QD (en pacientes sin tratamiento previo)	TPV/r 500/200 mg c/12h
Recomendación	Tomar con o sin comida	Tomar con comida	Tomar con comida	Tomar con comida
Presentación comercial	comp 200/50 mg comp 100/25 mg sol. oral 80/20 mg/ml	cáps 150, 200 y 300 mg	Comp 75, 150, 400 y 600 mg	cáps 250 mg
Biodisponibilidad Oral	No se ha determinado su biodisponibilidad absoluta en humanos. ^ω	68% (57-80%) ^κ	37% (DRV solo, dosis única 600 mg) 82% (DRV/r 600/100 mg/12h). ^ω	No se ha determinado su biodisponibilidad absoluta en humanos. ^Ω
Efecto de los alimentos	Se recomienda administrarlo con alimentos para reducir la variabilidad farmacocinética y mejorar su tolerabilidad. ^Ω Cápsulas: en comparación con la administración en ayunas, la administración con alimentos de contenido moderado en grasa aumentó un 48% el AUC y los alimentos ricos en grasa la aumentaron un 97%. ^Ω Solución: en comparación con la administración en ayunas, la administración con alimentos de contenido moderado en grasa aumentó un 80% el AUC y los alimentos ricos en grasa la aumentaron un 130%. ^Ω	ATV: 400 mg/24h: en comparación con la administración en ayunas, la administración con alimentos de contenido ligero en grasa aumentó un 70% el AUC y los alimentos ricos en grasa la aumentaron un 35%. ^Ω ATV/r: 300/100 mg/24h: en comparación con la administración en ayunas, la administración con alimentos de contenido ligero en grasa aumentó un 33% el AUC y los alimentos ricos en grasa prácticamente no la modificaron. ^Ω	Se recomienda administrarlo con alimentos. Los alimentos aumentaron un 30% el AUC, sin que influyera el tipo de alimento. ^Ω	Los alimentos mejoran la tolerabilidad, por lo que TPV/r debe administrarse con alimentos. ^ω

Nombre genérico	Lopinavir	Atazanavir	Darunavir	Tipranavir
Semivida plasmática	5-6 horas ^ω	6,5 horas (ATV 400 mg/24h)(VIH+) ^Ω 12 horas (ATV/r 300/100 mg/24h)(VIH+) ^ω	15 horas (DRV/r 600/100 mg/12h) ^ω	5,5 horas en mujeres y 6,0 horas en hombres (TPV/r 500/200 mg/12h) ^ω
C_{max}	12,3± 5,4 microg/ml (400/100 mg/12h) ^{a, ω} 9,8 ± 3,7 µg/mL(400/100 mg/12h)(VIH+) ^{a, Ω} 11,8± 3,7 microg/ml (800/200 mg/24h)(VIH+) ^{a, Ω}	En VIH+: 4466 nanog/ml (ATV/r 300/100 mg/24h) ^ω 3152±2231 nanog/ml (ATV 400 mg/24h) ^Ω	--	En VIH+: 94,8 ± 22,8 microM en mujeres (TPV/r 500/200 mg/12h) ^ω 77,6 ± 16,6 microM en hombres (TPV/r 500/200 mg/12h) ^ω
C_{min}	8,1 ± 5,7 microg/ml (400/100 mg/12h) ^{a, ω} 7,1 ± 2,9 µg/mL(400/100 mg/12)(VIH+) ^{a, Ω} 3,2± 2,1 microg/ml (800/200 mg/24h) (VIH+) ^{a, Ω}	En VIH+: 654 nanog/ml (ATV/r 300/100 mg/24h) ^ω 273±298 ^a nanog/ml (ATV 400 mg/24h) ^Ω	En VIH+: 2282±1168 ^a nanog/ml (DRV/r 800/100 mg/24h) ^Ω 3578±1151 ^a nanog/ml (DRV/r 600/100 mg/12h) ^Ω	En VIH+: 41,6 ± 24,3 microM en mujeres (TPV/r 500/200 mg/12h) ^ω 35,6 ± 16,7 microM en hombres (TPV/r 500/200 mg/12h) ^ω
AUC	AUC _{0-12h} : 113,2 ± 60,5 microg•h/ml (400/100 mg/12h) ^{a, ω} AUC _{0-12h} : 92,6 ± 36,7 µg•h/mL (400/100 mg/12)(VIH+) ^{a, Ω} AUC _{0-24h} : 154,1± 61,4 microg•h/ml (800/200 mg/24h) (VIH+) ^{a, Ω}	En VIH+: AUC _{0-24h} : 44185 nanog•h/ml (ATV/r 300/100 mg/24h) ^ω AUC _{0-24h} : 22262±20159 ^a nanog•h/ml (ATV 400 mg/24h) ^Ω	En VIH+: 93026±27050 ^a nanog.h/ml (DRV/r 800/100 mg/24h) ^Ω 124698±32286 ^a nanog.h/ml (DRV/r 600/100 mg/12h) ^Ω	En VIH+: AUC _{0-12h} : 851 ± 309 microM.h en mujeres y 710 ± 207 microM.h en hombres (TPV/r 500/200 mg/12h) ^ω

Nombre genérico	Lopinavir	Atazanavir	Darunavir	Tipranavir
CI_{50/90} frente a VIH-1 (in vitro)	<p>CI₅₀ frente a VIH-1IIB en células MT4 fue 17 nanoM (10,6 microg/mL) en ausencia de suero humano y 102 nanoM (63,75 microg/mL) en presencia de suero.^ω</p> <p>CI₅₀ frente a varios aislados clínicos de VIH-1 en ausencia de suero 6,5 nanoM (4,6 microg/mL).^ω</p>	<p>CI₅₀:0,002-0.004 microg/mL (2,6 – 5,3 nanoM)^Ω</p>	<p>CI₅₀ : 1,2 - 8,5 nanoM (0,7 - 5,0 nanog/ml)^ω</p>	<p>CI₅₀: 0,03 a 0,07 microM (18-42 nanog/ml)^ω</p> <p>CI₉₀: 0,07 a 0,18 microM (42-108 nanog/ml) (La actividad antiviral de tipranavir disminuye 3,75 veces de media en presencia de suero humano).^ω</p>
Actividad frente a VIH-1	VIH-1,2 ^ω	VIH-1,2 ^ω	VIH-1,2 ^ω	VIH-1,2 ^ω
Penetración en LCR (LCR:plasma)	<p>Grado 3 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)</p>	<p>LCR/plasma: 0,0021 a 0,0226^{c, Ω}</p> <p>ATV ± RTV: grado 2 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)</p> <p>ATV/r: LCR: 10,3 (<5-21 ng/mL)^b en comparación con 1278 (525-2265 ng/mL)^b</p> <p>ATV: LCR 7,9 (6,6-22 ng/mL)^b con ATV, en comparación con 523 (283-1344 ng/mL). Concentraciones en LCR bajas (<1%) y muy variables. (Best BM. AIDS 2009;23(1):83-87).</p>	<p>Grado 3 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)</p>	<p>No hay estudios^ω</p> <p>Grado 1 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)</p>

Nombre genérico	Lopinavir	Atazanavir	Darunavir	Tipranavir
Metabolización	CYP3A4	CYP3A4	CYP3A4	CYP3A4
Efectos Adversos	Intolerancia G-I (vómitos, diarrea) Cefalea Astenia Hiperglicemia Dislipemia Lipodistrofia Posible aumento del sangrado en hemofílicos	Hiperbilirrubinemia Intolerancia GI (diarrea) Cefalea Los estudios disponibles a las 48 semanas no muestran alteraciones lipídicas relevantes ATV/r: Dislipemia leve Posible aumento del sangrado en hemofílicos	Intolerancia G-I (vómitos, diarrea) Cefalea Astenia Dislipemia leve Erupción cutánea, que suele ser moderada y autolimitada. Posible aumento del sangrado en hemofílicos	Intolerancia GI (diarrea) Alteraciones SNC (vértigo, dificultad de concentración, enlentecimiento, cambios de humor). En combinación con RTV, aumento de triglicéridos y transaminasas. Se han descrito 14 casos de hemorragia intracraneal, 8 de los cuales fueron mortales, entre 6840 pacientes incluidos en ensayos clínicos. La mayoría tenían factores de riesgo.
Asociaciones contraindicadas	Alfuzosina Anticonceptivos orales Astemizol Cisaprida Colchicina (si insuf. renal o hepática) Deriv. ergotamina Encainida Estatinas (excepto atorvastatina, fluvastatina y pravastatina) Éxtasis Fluticasona inh. FPV Flecainida Halofantrina Hypericum (Hierba de San Juan) Lumefantrina Metanfetamina Midazolam oral ¹⁰ Pimozida Propafenona	Alfuzosina Astemizol Bosentan con ATV no potenciado Estatinas (excepto fluvastatina y pravastatina) Cisaprida Colchicina (si insuf. renal o hepática) Deriv. Ergotamina Halofantrina Hypericum (Hierba de San Juan) Lumefantrina IDV Irinotecan Midazolam oral ¹⁰ Omeprazol y afines ⁹ Pimozida Rifampicina Salmeterol Sildenafil (hipertensión pulmonar) Terfenadina Triazolam	Alfuzosina Amiodarona Astemizol Cisaprida Colchicina (si insuf. renal o hepática) Deriv. Ergotamina Estatinas (simvastatina y lovastatina) Extasis Fenobarbital fenitoina Fluticasona inh. Halofantrina Hypericum (Hierba de San Juan) Lidocaína sistémica Metanfetamina Midazolam oral ¹⁰ Pimozida Quinidina Rifampicina Salmeterol Sertindol	Alfuzosina Astemizol Cisaprida Colchicina (si insuf. renal o hepática) Deriv. ergotamina Encainida Estatinas (excepto atorvastatina, fluvastatina y pravastatina) Etravirina Éxtasis Flecainida Fluticasona inh Halofantrina Hypericum (Hierba de San Juan) Lumefantrina Metanfetamina Midazolam oral ¹⁰ Pimozida Propafenona Quinidina Rifampicina

	Quinidina Rifampicina Salmeterol Sildenafil (hipertensión pulmonar) Terfenadina Triazolam		Sildenafil (hipertensión pulmonar) Terfenadina Triazolam	Salmeterol SQV Sildenafil (hipertensión pulmonar) Terfenadina Triazolam
--	--	--	--	---

Nombre genérico	Lopinavir	Atazanavir	Darunavir	Tipranavir
Antiácidos Inh. bomba protones Antihist. H2	Ausencia de interacción Ausencia de interacción Ausencia de interacción	Espaciar 1-2h (primero ATV) Contraindicado ¹¹ Ensayado con famotidina ¹²	Ausencia de interacción Ausencia de interacción	Espaciar 1-2h (↓25-29% AUC TPV) Ausencia de interacción No hay datos: probablemente ausencia de interacción
Antimicobact.				
- Rifampicina	Contraindicado	Contraindicado	Contraindicado	Contraindicado (no hay datos)
- Rifabutina (RFB)	RFB 150-300 mg 3 veces /semana ⁰	NRAD ATV RFB 150-300 mg 3 veces /semana.	NRAD DRV/r RFB 150-300 mg 3 veces /semana ⁰	RFB 150-300 mg 3 veces /semana ⁰
- Claritromicina	Considerar tratamientos alternativos para indicaciones diferentes de MAC. Ajustar dosis claritro si func. renal alterada ¹ .	Reducir 50% la dosis de claritro. Se reducen las concentraciones de su metabolito 5-hidroxi-. Considerar tratamientos alternativos para indicaciones diferentes de MAC.	Considerar tratamientos alternativos para indicaciones diferentes de MAC (niveles de 14-OH-claritromicina inferiores al límite de cuantificación). Ajustar dosis claritro si func. renal alterada ¹ .	Considerar tratamientos alternativos para indicaciones diferentes de MAC. TPV: ↑60% AUC, x2 C _{min} ; Claritro: ↑19% AUC, ↑68% C _{min} , ↓>95% 14-OH-claritromicina.
Antiepilépticos: Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, lamotrigina	Un caso descrito de intoxicación con carbamazepina (también podrían ↓Cp LPV: monitorizar niveles de ambos). Con fenitoína, se han descrito ↓30% en el AUC de fenitoína, LPV y RTV y ↓≅ 50% C _{min} LPV y RTV. Posible repercusión clínica. Monitorizar Cp de ambos fármacos. Con lamotrigina: se recomienda duplicar la dosis de lamotrigina. Con ácido valproico: datos contradictorios (↓48% niveles valproico en un paciente versus sin cambios en otro estudio en que se comparó niv. de valproico con datos históricos). Precaución.	Posible ↓Cp ATV. Se recomienda monitorizar niveles plasmáticos de antirretroviral y antiepiléptico. Lamotrigina: con ATV nopotenciado ↓12% AUC lamotrigina; con ATV/r ↓32% AUC lamotrigina.	Carbamazepina (200 mg/12h): ↑45% AUC CBZ, DRV sin cambios. Valorar reducción de dosis de carbamazepina del 25-50%. Se recomienda monitorizar niveles de carbamazepina. Fenobarbital y fenitoína: contraindicados por riesgo de reducción de las Cp de DRV.	Se recomienda monitorizar niveles plasmáticos de antirretroviral y antiepiléptico. Un caso de reducción del 50% en las Cp de fenobarbital.
Anticoagulantes orales	Los IP pueden alterar las Cp de los anticoagulantes. Existen casos descritos de reducción del efecto anticoagulante con requerimiento de aumento de dosis de acenocumarol y warfarina al asociarlos a RTV, LPV/r ó IDV. Monitorizar estrictamente el tiempo de protrombina.			

Nombre genérico	Lopinavir	Atazanavir	Darunavir	Tipranavir
Anticonceptivos orales:	<p>↓42% AUC etinilestradiol.</p> <p>No debe administrarse junto con anticonceptivos que contengan etinilestradiol o noretindrona. Deben considerarse métodos anticonceptivos alternativos o adicionales.</p>	<p>ATV 400 mg/24h: ↑ 48% etinilestradiol, ↑ x2 AUC noretindrona. Se recomienda que el anticonceptivo oral tenga como máximo 30 mcg de etinilestradiol.</p> <p>Con ATV/r 300/100 mg c/24h: ↓ 20% etinilestradiol, ↑85% AUC norgestimato. Se recomienda que el anticonceptivo oral tenga, como mínimo 30 mcg de etinilestradiol. Con ambas pautas aumentan los niveles de progestágeno, pudiendo aumentar los efectos adversos.</p>	<p>DRV/r 600/100 mg/12h: ↓44% AUC etinilestradiol ↓14%, AUC noretindrona. No debe administrarse junto con anticonceptivos que contengan etinilestradiol o noretindrona. Deben considerarse métodos anticonceptivos alternativos o adicionales.</p>	<p>↓ 50% AUC etinilestradiol. Noretindrona sin cambios, No debe administrarse junto con anticonceptivos que contengan etinilestradiol o noretindrona (disminuye sus niveles). Deben considerarse métodos anticonceptivos alternativos o adicionales.</p>
Antifúngicos imidazólicos	<p>No se han descrito interacciones clínicamente importantes con <u>fluconazol</u>. Máx 200 mg/día de <u>itraconazol</u> y de <u>ketoconazol</u>.</p> <p>Con <u>voriconazol</u> y LPV/r no hay datos (RTV 400 mg c/12h contraindicado; RTV 100 mg c/12h: evitar a menos que el balance riesgo/beneficio justifique su uso. Ver RTV). Monitorizar estrechamente.</p>	<p>Ausencia de interacción con <u>fluconazol</u>.</p> <p>Puede administrarse ATV no potenciado con <u>ketoconazol</u> junto con una comida ligera sin que se requiera ajuste de dosis. Con ATV/r no exceder 200 mg/día de ketoconazol.</p> <p>Con <u>voriconazol</u> y ATV+/- RTV: no hay datos (RTV 400 mg c/12h contraindicado; RTV 100 mg c/12h: evitar a menos que el balance riesgo/beneficio justifique su uso. Ver RTV). Monitorizar estrechamente.</p> <p>Posaconazol (400 mg/12h) en voluntarios sanos aumentó 3,7 veces el AUC de ATV no potenciado y 2,5 veces el AUC de ATV/r. Se observaron aumentos de los niveles plasmáticos de bilirrubina.</p>	<p>Ketoconazol: + 42% AUC DRV; AUC de ketoconazol 2 veces mayor: dosis máxima de ketoconazol 200 mg/día.</p> <p>Itraconazol: dosis máxima de itraconazol 200 mg/día.</p> <p>La coadministración de voriconazol y DRV/r no ha sido estudiada (RTV 400 mg c/12h contraindicado; RTV 100 mg c/12h: evitar a menos que el balance riesgo/beneficio justifique su uso. Ver RTV). Monitorizar estrechamente.</p>	<p>Con <u>fluconazol</u> (100 mg c/24h), posible aumento de los niveles plasmáticos de TPV (datos limitados). Monitorizar toxicidad.</p> <p>No se recomienda sobrepasar los 200 mg/día de <u>fluconazol</u>, <u>itraconazol</u> y <u>ketoconazol</u>.</p> <p>Con <u>voriconazol</u> y TPV+/- RTV: no hay datos (RTV 400 mg c/12h contraindicado; RTV 100 mg c/12h: evitar a menos que el balance riesgo/beneficio justifique su uso. Ver RTV). Monitorizar estrechamente.</p>

Nombre genérico	Lopinavir	Atazanavir	Darunavir	Tipranavir
Estatinas y otros hipolipemiantes	Lovastatina, simvastatina y fluvastatina contraindicadas. Pravastatina: NRAD Atorvastatina: asociar con precaución (iniciar con máximo 10 mg/día). Rosuvastatina: ↑x2 AUC rosuvastatina. Gemfibrozilo: ↓41% AUC gemfibrozilo.	Lovastatina y simvastatina contraindicadas. Fuvastatina y pravastatina interacción poco probable. Atorvastatina: asociar con precaución (iniciar con máximo 10 mg/día).	Lovastatina, simvastatina y fluvastatina contraindicadas. Atorvastatina (↑x4 AUC atorvastatina): se recomienda empezar con una dosis de atorvastatina de 10 mg al día y aumentar progresivamente en función de la respuesta clínica. Rosuvastatina: ↑48% AUC rosuvastatina. Pravastatina: en un estudio DRV/r no aumentó la exposición a una dosis única de pravastatina, en la mayoría de sujetos, aunque ésta se multiplicó 5 veces sólo en un subgrupo de sujetos. En otro estudio se observó menos interacción: ↑21% y como máximo el AUC se duplicó. Se recomienda iniciar con dosis bajas de pravastatina e incrementarlas gradualmente hasta conseguir el efecto clínico deseado	Lovastatina, simvastatina y fluvastatina contraindicadas. TPV/r aumentó 9 veces el AUC de atorvastatina. Utilizar preferiblemente pravastatina (interacción poco probable). Rosuvastatina: ↑37% AUC rosuvastatina.
Etanol:	El uso agudo o crónico de etanol alteró mínimamente la farmacocinética de los IP. Antabus: algunos IP podrían dar lugar a una reacción de tipo disulfiram por su contenido en etanol: Norvir® solución oral (43% v/v); Norvir cápsulas (12% p/p); Kaletra® solución oral (42%); Aptivus cápsulas (7% p/p =100 mg/cáps). Kaletra® en comprimidos no contiene alcohol. Agenerase® en solución tiene un elevado contenido de propilenglicol (550 mg/mL), que se metaboliza a través de la alcohol deshidrogenasa, por lo que el consumo de etanol junto con estos IPs podría producir toxicidad. Kaletra® en cápsulas y Agenerase® en cápsulas también contienen propilenglicol, pero en menor cantidad.			
Fármacos empleados para tratar la gota	Gota-profilaxis: colchicina con IP potenciado: 0,3 mg c/24h-48h; colchicina con FPV no potenciado: 0,3-0,6 mg/día. Gota-tratamiento: Colchicina con IP potenciado: 0.6 mg + 0,3 mg 1h después y no readministrar antes de 3 días. Colchicina con FPV no potenciado: 1,2 mg y no readministrar antes de 3 días. Fiebre mediterránea familiar: colchicina con IP potenciado: máximo 0,3 mg/12h; con FPV no potenciado: máximo 0,6 mg/12h. (Según recomendaciones de la FDA; de las presentaciones disponibles en España, la única que podría ajustarse aproximadamente sería el Colchimax® de 0,5 mg).			
Fármacos empleados	Bosentan (Tracleer®): si el paciente recibe IPs e inicia bosentan: iniciar 62,5 mg c/24-48h. Si el paciente recibe bosentan e inicia IPs: suspender bosentan mínimo			

<u>para tratar la hipertensión pulmonar</u>	36horas antes y no reiniciar hasta 10 días después de iniciar el IP a una dosis de 62,5 mg c/24-48h. No se recomienda asociar bosentan a ATV no potenciado por riesgo de reducción de niveles plasmáticos de ATV. Tadalafilo (Cialis®): si el paciente recibe IPs e inicia tadalafilo: iniciar 20 mg c/24h y aumentar luego a 40 mg/día según tolerabilidad. Si el paciente recibe tadalafilo y debe iniciar IPs: suspender tadalafilo mínimo 24h antes y no reiniciar hasta 7 días después de iniciar el IP a una dosis de 20 mg c/24h, luego aumentar a 40mg/día.
<u>Fármacos empleados para tratar la influenza</u>	Zanamivir/amantadina: una interacción con los IPs se considera poco probable. Oseltamivir se ha relacionado con efectos adversos neuropsiquiátricos, aunque no se puede descartar que éstos sean debidos, al menos en parte, a la propia enfermedad. Los IPs al bloquear la glicoproteína-P podrían aumentar la penetración de oseltamivir en el SNC y empeorar sus efectos adversos. Se recomienda asociarlos con precaución hasta que no se disponga de más datos.

Nota: En esta tabla se ha corregido el error del nombre comercial de bosentan (Revatio por Tracleer)

Nombre genérico	Lopinavir	Atazanavir	Darunavir	Tipranavir
Inmunosupresores:	Posible ↑Cp ciclosporina, prednisona, tacrolimus y sirolimus. Monitorizar niveles/toxicidad del inmunosupresor. Micofenolato se glucuronida por lo que RTV podría ↓ sus Cp. Monitorizar niveles/eficacia. En un paciente, las dosis de ciclosporina tuvo que reducirse a 1/20 parte al añadir LPV/r.	Posible ↑Cp ciclosporina, prednisona, tacrolimus y sirolimus. Monitorizar niveles/toxicidad del inmunosupresor.	Posible ↑Cp ciclosporina, prednisona, tacrolimus y sirolimus. Monitorizar niveles/toxicidad del inmunosupresor. Tacrolimus: un caso descrito de ajuste hasta 0,5 mg/semana.	No hay datos. Se recomienda monitorizar estrechamente los niveles plasmáticos de inmunosupresor.
	La dosis de ciclosporina inicial debe ser aprox 1/10 de la habitual y puede requerir reducciones progresivas a lo largo del tiempo. En algunos casos la dosis al cabo de 2 años es tan sólo un 25% de la inicial (probablemente por aumento de la absorción intestinal a lo largo del tiempo). Tacrolimus: se ha descrito una interacción muy importante con LPV/r (pueden ser necesarios menos de 1mg de tacrolimus a la semana y puede ser necesario esperar de 3 a 5 semanas (según función hepática) antes de administrar otra dosis de tacrolimus al iniciar LPV/r. También se ha descrito interacción con otros IP (p. ej. mayor con NFV que con IDV, requiriéndose en un estudio unos 0,6 mg diarios de tacrolimus con estos IP).			
Interferón/ Ribavirina	Ribavirina: no existe evidencia de interacción con los IP. Interferón: su vía de eliminación no está claramente establecida así como tampoco su posible efecto inhibitor sobre el citocromo P-450 (ha mostrado p. ej. ↑Cp de teofilina y barbituratos). No hay datos con respecto a posibles interacciones con IP. En pacientes tratados con ATV se han descrito ↑x2 bilirrubina.			
Metadona(MT) y otros opiáceos	MT: ↓53% AUC MT. Habitualmente NRAD de metadona Buprenorfina/naloxona: NRAD. Oxicodona: ↑x2,6 AUC oxicodona. Puede requerir reducción de dosis.	Metadona: Probablemente NRAD. Ausencia de interacción farmacocinética con ATV 400mg/día. Según datos iniciales con ATV/r 300/100 mg c/24h los ajustes de dosis de MT, si se requieren, son mínimos. Algunos casos descritos de intoxicación opiácea en pacientes tratados con ATV/r y buprenorfina, resuelta tras reducir la dosis del opiáceo.	Metadona: no se requiere ajustes inicialmente. Monitorización clínica y ajustar dosis posteriormente en caso necesario, aunque habitualmente no se requiere. Buprenorfina/naloxona: buprenorfina sin cambios, ↑46% AUC norbuprenorfina. Síntomas leves de exceso de opiáceos en algunos pacientes sin requerir ↓dosis.	Metadona: ↓48% isómero activo R-metadona: puede requerir aumento de dosis. Loperamida: a pesar de que TPV/r actúa como inhibidor de la glicoproteína-P, no se observó aumento de los efectos en SNC de loperamida (16 mg).

Nombre genérico	Lopinavir	Atazanavir	Darunavir	Tipranavir
<p>Otros fármacos</p>	<p><u>Artemeter/lumefantrina:</u> ↑ x2-3 AUC lumefantrina, ↓35% %AUC artemeter, LPV sin cambios. NRAD monitorizar toxicidad. <u>Atovaquona/proguanilo:</u> ↓65% AUC atovaquona, ↓68% AUC proguanilo (datos limitados procedentes de comparar niveles de pacientes con voluntarios sanos sin TARV). Valorar aumento de dosis. <u>Bupropión:</u> LPV/r ↓57% AUC de bupropión. <u>Digoxina:</u> ↑81%AUC (0-12h) de una dosis única de 0,5 mg de digoxina, posiblemente por interacción con Pgp intestinal. Precaución con otros fármacos sustrato de Pgp: <u>verapamilo</u>, <u>doxorrubicina</u>. <u>Ezetimiba</u> no modificó de forma significativa la farmacocinética de LPV/r (no se evaluó la posible interacción en el sentido contrario, aunque no parece probable una interacción importante). <u>Gemfibrozilo:</u> ↓41% AUC de gemfibrozilo. (sigue)</p>	<p><u>Atovaquona/proguanilo:</u> ↓33% AUC atovaquona, ↓74% AUC proguanilo (datos limitados procedentes de comparar niveles de pacientes con voluntarios sanos sin TARV). Con <u>TDF:</u> utilizar ATV/r 300/100 mg c/24h. Reducir dosis de <u>diltiazem</u> a la mitad. Posible aumento Cp <u>sildenafil</u> (max 25 mg en un periodo de 48h), <u>varденаfilo</u> (máx 2,5 mg c/72h si asociado a RTV) y <u>tadalafilo</u> (iniciar con 5 mg y no exceder 10 mg c/72h). <u>Fluticasona inh.:</u> en un estudio caso-control, una elevada proporción de los pacientes expuestos a RTV+fluticasona (7/8; 88%) presentaron supresión adrenal, que fue sintomática en un 57% de los casos. <u>Vinblastina:</u> ↑ riesgo de neutropenia. Puede ↑ Cp de los fármacos que se metabolizan a través del CYP3A4³ y UDP-glucuroniltransferasa 1A1.</p>	<p><u>Digoxina:</u> DRV/r aumenta las concentraciones plasmáticas de digoxina. <u>Fluticasona inh.:</u> en un estudio caso-control, una elevada proporción de los pacientes expuestos a RTV+fluticasona (7/8; 88%) presentaron supresión adrenal, que fue sintomática en un 57% de los casos. <u>Inhibidores de la recaptación de serotonina:</u> las AUC sertralina (50 mg/día) y de paroxetina (20 mg/día) se redujeron aprox. un 50% y 40%, respectivamente, tras 7 días de coadministración con DRV/r. <u>Sildenafil:</u> el AUC de sildenafil se multiplica por 4. Dosis inicial: no exceder 25 mg en un periodo de 48h para sildenafil, 2,5 mg en 72h para vardenafile y 10 mg en 72h para tadalafilo. <u>Vinblastina:</u> ↑ riesgo de neutropenia. En general DRV/r puede aumentar las concentraciones plasmáticas de los fármacos que se metabolizan a través del CYP3A4³</p>	<p><u>Bupropión:</u> se reducen las concentraciones a la mitad en presencia de TPV/r. <u>Fluticasona inh.:</u> en un estudio caso-control, una elevada proporción de los pacientes expuestos a RTV+fluticasona (7/8; 88%) presentaron supresión adrenal, que fue sintomática en un 57% de los casos. <u>Tadalafilo:</u> mínima dosis cuando se utiliza los primeros días del tratamiento con TPV/r. Después de 7-10 días de tratamiento con TPV/r, no es necesario ajustar la dosis de tadalafilo. Valaciclovir: ausencia de interacción. <u>Vinblastina:</u> ↑ riesgo de neutropenia. Aunque con TPV/r se ha visto que predomina el efecto inhibitorio enzimático de RTV, se recomienda mucha precaución, ya que TPV ha reducido los niveles plasmáticos de varios IP aún en presencia de RTV. ((↓68% AUC ATV, ↓70% AUC de SQV, ↓45% el AUC de APV, y ↓49% el AUC de LPV). Podría ocurrir también con otros fármacos.</p>

Nombre genérico	Lopinavir	Atazanavir	Darunavir	Tipranavir
<p>Otros fármacos</p>	<p><u>Fluticasona inh.</u>: en un estudio caso-control, una elevada proporción de los pacientes expuestos a RTV+fluticasona (7/8; 88%) presentaron supresión adrenal, que fue sintomática en un 57% de los casos. Algún caso descrito de reducción de eficacia de <u>L-tiroxina</u>. Posible aumento Cp <u>sildenafil</u> (max 25 mg en un periodo de 48h), <u>vardenafile</u> (máx 2,5 mg c/72h) y <u>tadalafilo</u> (iniciar con 5 mg y no exceder 10 mg c/72h). <u>Vinblastina</u>: un caso de interacción grave con LPV/r: tras una dosis de 6 mg/m² de vinblastina el paciente desarrolló pancitopenia de grado 4. Se resolvió reduciendo la dosis a la mitad. Productos naturales: ausencia de interacción PK con <i>Ginkgo biloba</i> y <i>Echinacea purpurea</i>.</p> <p>Puede ↑ Cp de los fármacos que se metabolizan a través del CYP3A4³. Podría también ↑Cp (aumento mucho menor) de los fármacos que se metabolizan a través del 2D6.⁵ Puede ↓Cp de los fármacos que se metabolizan a través del CYP2C9/19⁶ ó sufren glucuronidación.⁸</p>			

Nombre genérico	Lopinavir	Atazanavir	Darunavir	Tipranavir
<u>AN</u>	(ver tabla AN)			
<u>NN</u>	(ver tabla NN)			
<u>Maraviroc</u>	(ver tabla antagonistas del corrector CCR5 e inhibidores de la integrasa).			
<u>Raltegravir</u>	(ver tabla antagonistas del corrector CCR5 e inhibidores de la integrasa).			
<u>IP</u>				
- IDV	Datos farmacocinéticos iniciales: IDV 600-800 mg c/12h LPV/r NRAD No existen datos de eficacia y seguridad a largo plazo	Al igual que ATV, IDV se ha asociado a hiperbilirrubinemia (aumento de la Bi indirecta) por lo que no se recomienda asociar ambos IPs.	DRV/r 600/100 mg c/12h. IDV: 800 g c/12h (600 mg c/12h en caso de intolerancia).	No se recomienda: la adición de TPV puede reducir de forma importante los niveles plasmáticos de otros IP potenciados con RTV.
- RTV	LPV/r 400/100 mg c/12h. Una dosis adicional de RTV 100 mg c/12h: ↑46% AUC LPV y x2 Cmin LPV. Con LPV/r, las Cmin RTV son 3 veces menores que con 100 mg RTV c/12h asociado a IDV ó SQV	ATV/r 300/100 mg c/24h	↑ 14 veces AUC DRV. DRV esta indicado solamente en combinación con RTV. Dosis de DRV/r 600/100 mg c/12h en pacientes pretratados y 800/100 mg c/24h en pacientes naive.	TPV/r 500/200 mg c/12h.
- SQV	SQV 1000 mg c/12h + LPV/R dosis habitual . No existen datos de eficacia y seguridad a largo plazo	Con una dosificación de SQV/RTV/ATV 1500/100/300 mg c/24h se ha observado que algunos pacientes no alcanzan una Cmin adecuada de SQV, por lo que se recomienda restringir su uso a pacientes naive a IP con CV baja a intermedia. No existen datos de eficacia y seguridad a largo plazo	No recomendado (SQV sin cambios; ↓26% AUC de DRV).	No se recomienda: la adición de TPV puede reducir de forma importante los niveles plasmáticos de otros IP potenciados con RTV (↓70% AUC SQV).
- NFV	NFV: 1000-1250 mg c/12h. LPV/r: pacientes con susceptibilidad reducida o experiencia previa a IP pueden requerir aumento de dosis. No existen datos de eficacia y seguridad a largo plazo	No hay datos	No hay datos	No se recomienda: la adición de TPV puede reducir de forma importante los niveles plasmáticos de otros IP.

Nombre genérico	Lopinavir	Atazanavir	Darunavir	Tipranavir
-FPV	Si se requiere usar esta combinación, se recomienda monitorizar niveles plasmáticos (como dosis inicial puede emplearse 1400 mg c/12h de FOS-APV con 600/150 mg c/12h de LPV/r. No existen datos de eficacia y seguridad a largo plazo	ATV 300-400 mg c/24h (ó repartidos c/12h) + FPV/r 700/100 mg c/12h ó 1400/100-200 mg c/24h (datos farmacocinéticos iniciales). No existen datos de eficacia y seguridad a largo plazo	No hay datos	No se recomienda: la adición de TPV puede reducir de forma importante los niveles plasmáticos de otros IP potenciados con RTV. (Algunos autores han logrado niveles adecuados monitorizando y aumentando la dosis de FPV/r a 1400/200 mg c/12h en combinación con TPV (500 mg c/12h). Sin embargo, dada la elevada variabilidad interindividual, algunos pacientes podrían no alcanzar niveles adecuados. Experiencia limitada).
-LPV/r		Datos farmacocinéticos iniciales: ATV 300 mg c/24h + LPV/r 400/100 mg c/12h. No existen datos de eficacia y seguridad a largo plazo	Contraindicado (↓40% AUC DRV).	No se recomienda: la adición de TPV puede reducir de forma importante los niveles plasmáticos de otros IP potenciados con RTV (↓49% AUC LPV). (Algunos autores han logrado niveles adecuados monitorizando y aumentando la dosis de LPV/r a 400/300 mg c/12h ó 533/233 mg c/12h en combinación con TPV (500 mg c/12h). Sin embargo, dada la elevada variabilidad interindividual, algunos pacientes podrían no alcanzar niveles adecuados. Experiencia limitada).
-ATV			NRAD	No se recomienda: la adición de TPV puede reducir de forma importante los niveles plasmáticos de otros IP potenciados con RTV (↓68% AUC ATV)

- DRV/r				No hay datos
---------	--	--	--	--------------

AUC: área bajo la curva; **BID:** dos veces al día; **Cp:** concentraciones plasmáticas; **I:** Inivirase®; **IT:** interacción; **NRAD:** no requiere ajuste de dosis; **NS:** no significativa; **QD:** una vez al día.

^a Expresado como media ± DE si no se indica lo contrario

^b Expresado como mediana ± rango intercuartil

^c Expresado como rango

⁰ La mayoría de estudios han sido realizados en voluntarios sanos por lo que en los pacientes es probable que las dosis recomendadas inicialmente con IP/r (150 mg tres veces por semana) no sean suficientes. Se han descrito fracasos de tratamiento antituberculoso con aparición de resistencias en pacientes con inmunodepresión avanzada tratados con IP/r y rifabutin 150 mg c/48 horas o tres veces por semana. En estos casos valorar dosis mayores: rifabutin 300 mg tres veces semana. Dado que el ajuste de dosis no está claramente establecido y la determinación de niveles de rifabutin no está disponible en la mayoría de hospitales, se recomienda, si es posible, valorar otras alternativas terapéuticas.

¹ ClCr 30-60 ml/min: reducir un 50%, ClCr <30 ml/min: reducir un 75% (máx. 1g/día).

² SQV (I ó F) junto con RTV (400/400 mg c/12h ó 1000/100 mg c/12h) pueden administrarse con la dosis habitual de rifampicina o dosis reducidas de rifabutin (150 mg 3 veces /semana)(experiencia limitada)

³ Principales fármacos metabolizados a través del CYP3A4: alprazolam, amiodarona, amlodipino, ciclofosfamida, ciclosporina, clonacepam, cloracepato, dextropropoxifeno, diazepam, diltiazem, disopiramida, estazolam, etionamida, etosuximida, felodipino, fentanilo, finasterida, flunaricina, fluracepam, lacidipino, lidocaína, loratadina, meperidina, nicardipino, nifedipino, nimodipino, nitrendipino, prednisona, quinidina, quinina, sertralina, sildenafilo (Viagra®), vardenafilo, tadalafilo, tacrolimus, verapamilo, vincristina y zolpidem.

⁴ RTV puede aumentar hasta 3 veces el AUC de los siguiente fármacos metabolizados a través del CYP3A: alfentanilo, antagonistas del calcio (amlodipino, diltiazem, felodipino, nicardipino, nifedipino, nisoldipino, verapamilo), carbamacepina, ciclosporina, citostáticos (etopósido, paclitaxel, tamoxifeno, vinblastina y vincristina), clonacepam, dexametasona, disopiramida, eritromicina, etosuximida, fentanilo, lidocaína, loratadina, nefazodona, ondansetron, prednisona, quinina, rifampicina, sertralina, sildenafilo, tacrolimus, taxol y trazodona, entre otros.

⁵ Aumento de 1.5 a 3 veces en el AUC de los fármacos metabolizados a través del CYP2D6: amitriptilina, clomipramina, clorpromacina, desipramina, fluoxetina, haloperidol, imipramina, maprotilina, metoprolol, mexiletina, nortriptilina, paroxetina, perfenazina, pindolol, propranolol, risperidona, timolol, tioridacina, tramadol y venlafaxina.

⁶ Fármacos metabolizados a través del CYP2C9/19: diclofenac, ibuprofeno, indometacina, fenitoína, gliburida, glipizida, lansoprazol, losartan, omeprazol, proguanilo y tolbutamida.

⁷ teofilina, tacrina, clozapina, tacrina.

⁸ atovaquona, clofibrato, codeína, difenoxilato, ketoprofeno, ketorolaco, lamotrigina, loracepam, metoclopramida, morfina, naproxeno, oxacepam, propofol, temacepam y valproico.

⁹ Atazanavir/r puede administrarse junto con antihistamínicos H2 (estudio realizado con famotidina) sin que se requiera espaciarlos. Si el ATV no se potencia con RTV, se recomienda administrarlo 2h antes del antihistamínico H2.

¹⁰ Según datos iniciales el midazolam intravenoso podría administrarse junto con los inhibidores de la proteasa reduciendo la dosis y bajo estrecha monitorización clínica (UCI o similar). Sin embargo, el midazolam oral está contraindicado.

¹¹ ATV no potenciado nunca debe asociarse a IBP. ATV/r no debe asociarse a IBP en pacientes pretratados. En pacientes sin tratamiento previo podría emplearse un máximo de 20 mg de omeprazol junto con ATV/r, espaciándolos 12 horas. En cualquier caso se evitará la administración de ATV en las primeras horas tras administrar un IBP.

¹² Con ATV/r, puede emplearse una dosis máxima de famotidina de 40 mg c/12h en pacientes sin tratamiento previo ó de 20 mg c/12h en pacientes pretratados (el ARV se administrará simultáneamente a fin de que el ATV/r se haya absorbido cuando actúe el anti-H2, o 10 h después del anti-H2). Cuando deba emplearse un anti-H2 junto con TDF y ATV/r se aumentará la dosis de ATV/r a 400/100 mg c/24h. En tratamiento inicial, si sólo puede emplearse ATV no potenciado, se utilizará una dosis máxima de 20 mg en una toma y 20 mg c/12h en total de famotidina (ATV se administrará en este caso 2 horas antes, para asegurar su absorción en ausencia de RTV, ó 10h después del anti-H2). En cualquier caso, se evitará la administración del ATV dentro de las primeras horas tras la administración de un anti-H2.

^ω Información procedente de la ficha técnica europea. EPARS: European Public Assessment Reports. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/includes/medicines/medicines_landing_page.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid= Con acceso [5/12/2010].

^ο Información procedente de la ficha técnica americana (fuentes: FDA and First Data Bank, Inc). Disponible en: http://www.rxlist.com/drugs/alpha_a.htm .Con acceso [5/12/2010].

[&] Guardiola JM, Soriano V (Eds). Tratamiento de la infección por VIH-SIDA. Fármacos y combinaciones. Décima Edición. Barcelona: Publicaciones Permanyer 2007.

NOTA: debido a que la información científica relacionada con los fármacos antirretrovirales se renueva constantemente, se recomienda consultar la ficha técnica de los fármacos y la información actualizada ofrecida por las distintas compañías farmacéuticas y las autoridades sanitarias.

Tabla 8. Antagonistas del correceptor CCR5 e inhibidores integrasa

Grupo terapéutico	Antagonistas correceptor CCR5	Inhibidores de la integrasa
Nombre genérico	Maraviroc ¹	Raltegravir
Nombre comercial	Celsentri®	Isentress®
Dosis	150, 300 ó 600 mg BID dependiendo de las interacciones con otros fármacos. 300 mg BID en ausencia de inhibidores o inductores de CYP3A4. Puede tomarse con o sin alimentos.	400 mg BID
Recomendación		Puede tomarse con o sin alimentos.
Presentación comercial	Comp. de 150 y de 300 mg	Comp. de 400 mg
Biodisponibilidad Oral	23-33% ^ω 23% (dosis única de 100 mg) ^ω 33% (estimada para 300 mg) ^ω	No se ha determinado su biodisponibilidad absoluta en humanos ^ω
Efecto de los alimentos	Un desayuno rico en grasa redujo el AUC un 33%. Sin embargo, dado que no hubo restricciones alimentarias en los estudios de eficacia, puede administrarse con o sin alimentos. ^Ω	Una comida con contenido de grasa moderado aumentó el 13% el AUC. Una comida con elevado contenido graso duplicó el AUC. En general, los alimentos aumentaron la variabilidad farmacocinética. Sin embargo, dado que no hubo restricciones alimentarias en los estudios de eficacia, puede administrarse con o sin alimentos. ^Ω
Semivida plasmática	13,2 horas ^ω	9 horas ^ω
Cmax	0,618 microg/mL (VIH+asintomáticos con 300 mg/12h) ^Ω	4,5 microM (IC90%:2,0-10,2) (=2,17 microg/mL)
Cmin	0,034 microg/mL(VIH+asintomáticos con 300 mg/12h) ^Ω	0,14 microM ^Ω (= 0,068 microg/mL)
AUC	AUC _{0-12h} : 2,550 microg.h/mL(VIH+asintomáticos con 300 mg/12h) ^Ω	AUC _{0-12h} : 14,3 microM.h ^Ω (IC90%:7,6 a 26,6) (=6,89 microg/mL)
CI _{50/90} frente a VIH-1 <i>in vitro</i>	CI ₅₀ :0,1 a 4,5 nanoM (0,05 to 2,3 nanog/mL) ^Ω (1 nanoM=0,5 nanog/mL) ^Ω CI ₉₀ : 0,57 (0,06 – 10,7) nanog/mL ^ω	CI ₉₅ : 31± 20 nanoM ^ω (=14,9 microg/mL)
Actividad	VIH-1 tropismo R5	VIH-1 y VIH-2, tropismo R5, X4 y dual
Penetración en LCR (LCR:plasma)	Grado 3 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)	Penetración insignificante ^ω Las concentraciones de RAL en LCR (LCR 14,5 ng/mL; conc. plasmáticas 261 ng/mL) fueron 4,5 veces superiores a la CI ₅₀ para la cepa salvaje del virus, tomando como CI ₅₀ 3,2 ng/mL (Croteau D. AAC 2010;54:5156-5160) Grado 3 de penetración en LCR según la clasificación del estudio CHARTER (de 1 a 4, menor a mayor) (Letendre S Poster 430. Croi 2010)
Metabolización	CYP3A4 (No inductor, ni inhibidor)	Glucuronidación (UGT1A1) (No inductor, ni inhibidor de CYP3A4 ni de UGT1A1)
Efectos Adversos	Náuseas, vómitos, flatulencia, dolor abdominal Parestesia, disgeusia. Erupción cutánea. Astenia.	Diarrea, nauseas. Cefalea

Nombre genérico	Maraviroc	Raltegravir
Interacciones		
	<i>Hypericum perforatum</i> (Hierba de San Juan)	No se han descrito.
Asociaciones contraindicadas		
Antiácidos	No hay datos	Antiácidos: AUC RAL sin cambios, ↓65% Cmin RAL.. Significado clínico incierto. Por precaución, espaciar como mínimo 2h .
Antihistamínicos H2	No hay datos	
Inhibidores Bomba protones	No hay datos	Anti-H2: una dosis única de 20 mg de famotina 1h antes del RAL aumentó un 45% el AUC de RAL y un 6% su Cmin. Estos cambios no se considera que puedan tener importancia clínica. IBP En pacientes ↑39% AUC RAL, ↑24% Cmin. Estos cambios no se considera que puedan tener importancia clínica.
Antimicobact.		
- Rifampicina	Dosis de MVC 600 mg c/12h en ausencia de inhibidores enzimáticos potentes. ¹	Rifampicina redujo un 61% la Cmin de RAL y un 40% el AUC. Valorar aumento de dosis de RAL a 800 mg c/12h.
- Rifabutina (RFB)	No hay datos	NRAD
- Claritromicina	Dosis de MVC a 150 mg c/12h en combinación con claritromicina o eritromicina.	
Antiepilépticos:		
- Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, lamotrigina	Dosis de MVC 600 mg c/12h en ausencia de inhibidores enzimáticos potentes. ¹	Carbamacepina, fenitoína, fenobarbital: Valorar aumento de dosis de RAL a 800 mg c/12h (no es una recomendación formal del laboratorio). Lamotrigina: ausencia de interacción PK
Anticoagulantes orales	No hay datos	No hay datos
Anticonceptivos orales:	Ausencia de interacción	Ausencia de interacción
Antifúngicos imidazólicos	Itraconazol y ketoconazol: se recomienda reducir la dosis de MVC a 150 mg c/12h. Fluconazol: los estudios farmacocinéticos poblacionales sugieren que no se requiere ajuste de dosis de MVC. Sin embargo, MVC 300 mg c/12h debe administrarse con precaución cuando se administre con fluconazol hasta disponer de más datos.	No es de esperar que RAL presente interacción importante con los antifúngicos imidazólicos.
Estatinas:	No es de esperar que MVC presente interacción importante con las estatinas.	No es de esperar que RAL presente interacción importante con las estatinas.
Fármacos empleados para tratar la influenza	Amantadina / oseltamivir /zanamivir: Teóricamente no deben esperarse interacciones	
Inmunosupresores:	No hay datos	Teóricamente con RAL no caben esperar interacciones. Datos iniciales sobre el uso seguro de RAL con sirolimus, tacrolimus y ciclosporina.
Interferón/ Ribavirina	No es de esperar que MVC presente interacción importante con interferon alfa ni con ribavirina.	Teóricamente RAL no caben esperar interacciones
Metadona(MT) y otros opiáceos	No es de esperar que MVC presente interacción importante con la metadona.	RAL no modifica las concentraciones de metadona
Otros fármacos	Cotrimoxazol: ausencia de interacción Midazolam: ausencia de interacción Nefazodona: debido al efecto inhibidor enzimático potente de nefazodona, se recomienda reducir la dosis de MVC a la mitad (150 mg c/12h)	Ezetimiba: NRAD Midazolam: ausencia de interacción. Una interacción con los fármacos utilizados para la disfunción eréctil (sildenafil, vardenafilo o tadalafilo) es poco probable.
AN	(ver tabla AN)	(ver tabla AN)
NN	(ver tabla NN)	(ver tabla NN)
IP		
- RTV	- Reducir la dosis de MVC a la mitad (150 mg c/12h)	Ausencia de interacción o clínicamente no significativa
- IDV	- Reducir la dosis de MVC a la mitad (150 mg c/12h)	Teóricamente, no es de esperar una interacción importante.
- SQV	Reducir la dosis de MVC a la mitad (150 mg c/12h)	Teóricamente, no es de esperar una interacción

		importante.
- NFV	- Reducir la dosis de MVC a la mitad (150 mg c/12h)	- No hay datos
- FPV	No requiere ajuste de dosis.	Un estudio en voluntarios sanos ha demostrado una reducción de Cp de ambos (RAL: ↓ 15-55% AUC, ↓ 25-68% Cmin; FPV: ↓ 0-36% AUC, ↓ 17-50% Cmin). Los niveles resultantes fueron superiores a x2 veces la IC90 para ambos fármacos, pero podría tener importancia en pretratados.
- LPV/r	Reducir la dosis de MVC a la mitad (150 mg c/12h)	NRAD
- ATV	Reducir la dosis de MVC a la mitad (150 mg c/12h)	NRAD (Con ATV/r 300/100 mg/24h ↑ 41% AUC RAL sin toxicidad).
- TPV/r	No requiere ajuste de dosis. Monitorizar transaminasas	NRAD (↓ 24% AUC y 55% Cmin RAL, pero en los estudios BENCHMRK no disminuyó la eficacia)
- DRV/r	Reducir la dosis de MVC a la mitad (150 mg c/12h)	No es de esperar una interacción importante.
Inhibidores de la integrasa		
- RAL	NRAD	--

AUC: área bajo la curva; **BID:** dos veces al día; **Cp:** concentraciones plasmáticas; **F:** Fortovase®; **I:** Invirase®; **IT:** interacción; **NRAD:** no requiere ajuste de dosis; **NS:** no significativa; **QD:** una vez al día; MVC, maraviroc; RAL, raltegravir

¹En presencia de inhibidores enzimáticos potentes como los IP (excepto TPV/r y FPV/r), antifúngicos imidazólicos (ketoconazol, itraconazol), macrólidos (eritromicina, claritromicina), nefazodona ó telitromicina el efecto inhibitor predominante sobre el efecto inductor enzimático y por lo tanto, se recomienda reducir la dosis de MVC a 150 mg c/12h.

²Fármacos metabolizados a través del CYP3A: alfentanilo, antagonistas del calcio (amlodipino, diltiazem, felodipino, nicardipino, nifedipino, nisoldipino, verapamilo), carbamacepina, ciclosporina, citostáticos (etopósido, paclitaxel, tamoxifeno, vinblastina y vincristina), clonacepam, dexametasona, disopiramida, eritromicina, etosuximida, fentanilo, lidocaína, loratadina, nefazodona, ondansetron, prednisona, quinina, rifampicina, sertralina, sildenafilo, tacrolimus y trazodona, entre otros.

^w Información procedente de la ficha técnica europea. EPARS: European Public Assessment Reports. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/includes/medicines/medicines_landing_page.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid= Con acceso [5/12/2010].

^q Información procedente de la ficha técnica americana (fuentes: FDA and First Data Bank, Inc). Disponible en: http://www.rxlist.com/drugs/alpha_a.htm .Con acceso [5/12/2010].

NOTA: debido a que la información científica relacionada con los fármacos antirretrovirales se renueva constantemente, se recomienda consultar la ficha técnica de los fármacos y la información actualizada ofrecida por las distintas compañías farmacéuticas y las autoridades sanitarias.

Tabla 9. Inhibidores de la fusión

Nombre genérico	Enfuvirtida (T-20)
Nombre comercial	Fuzeon®
Dosis recomendada	90 mg c/12h s.c.
Presentaciones comerciales	vial de 90 mg
Semivida plasmática	3,8±0,6 horas
Biodisponibilidad	80% (vía s.c.)
Semivida plasmática	3,8±0,6 horas
C _{max}	4,59±1,5 microg/mL (VIH+)
C _{min}	2,6 – 3,4 microg/mL(VIH+)
AUC	55,8±12,1 microg.h/mL(VIH+)
CI ₅₀	CI ₅₀ : 0,259 microg/mL (media geométrica) en un ensayo de entrada de recombinación de genotipos VIH.
Actividad	VIH-1
Metabolización Excreción	Catabolismo en sus aminoácidos constituyentes No hay datos
Efectos adversos	Reacciones locales leve-moderadas en el punto de inyección, dolor de cabeza y fiebre.
Interacciones	Escaso riesgo de interacción metabólica. Se ha observado <i>in vitro</i> un efecto sinérgico intenso de enfuvirtide con elvitegravir, lopinavir y darunavir y un efecto sinérgico moderado con efavirenz. Estudios <i>in vitro</i> e <i>in vivo</i> con una amplia variedad de isoenzimas hepáticos no han mostrado efecto inhibitorio de T-20 sobre los mismos. Estudios en pacientes no se ha encontrado interacción de T-20 con rifampicina, ETR, RTV y SQV/r. Tampoco se ha observado interacción farmacocinética de T-20 con tacrolimus ni con DRV. En un estudio se observó un aumento de las concentraciones de TPV (↑50% Cmin) y de RTV (↑ volumen de distribución y semivida de eliminación de

ambos) en presencia de enfuvirtida, aunque estos resultados no han podido corroborarse en otro estudio. Según un subanálisis del estudio RESIST, no parece que el aumento en las concentraciones plasmáticas de TPV se relacione con un aumento del riesgo de hepatotoxicidad.

NOTA: debido a que la información científica relacionada con los fármacos antirretrovirales se renueva constantemente, se recomienda consultar la ficha técnica de los fármacos y la información actualizada ofrecida por las distintas compañías farmacéuticas y las autoridades sanitarias.

Tabla 10. Causas de adherencia incorrecta y posibles estrategias de intervención

	Causas potenciales de incumplimiento	Posibles intervenciones
Factores sociales, económicos, educativos.	Falta de apoyo social y/o familiar. Escasos recursos. Bajo nivel educativo	Buscar alianza con familia y allegados. Conocer necesidades sociales. Reclutar organizaciones comunitarias. Educación intensiva, explicaciones claras y comprensibles y adaptadas
Factores del equipo asistencial	Falta de recursos. Atención masificada e impersonal. Ausencia de coordinación entre diferentes servicios de apoyo a la asistencia. Insuficiente formación en terapia antirretroviral. Falta de accesibilidad. Deficiente formación en relación personal sanitario-paciente.	Accesibilidad y continuidad de la asistencia. Equipo multidisciplinar. Recursos materiales y humanos suficientes y coordinados. Formación sólida en terapia antirretroviral y en atención al paciente. Plantear terapia directamente observada en determinados ámbitos asistenciales.
Factores relacionados con el tratamiento	Efectos adversos, tamaño y palatabilidad de las unidades galénicas, número de dosis diarias. Intrusión en la vida del paciente. Falta de adaptación a las preferencias y necesidades del paciente.	Simplificar el régimen terapéutico. Pautas convenientes en número y dosificación de comprimidos, emplear fármacos co-formulados Individualizar tratamiento: Resistencias, comorbilidad, preferencias, interacciones. Técnicas especiales para la toma de la medicación. Ayudar a desarrollar mecanismos de reacción (p.e. anticipación y manejo de efectos adversos)
Factores relacionados con el paciente	No aceptación. Rechazo del diagnóstico. Rechazo del tratamiento (creencias y actitudes) Olvidos y barreras. Insuficiente comprensión de la enfermedad y su tratamiento. Insuficiente entendimiento de la relación riesgo/beneficio. Motivos de dosificación y cumplimiento. Comorbilidad psiquiátrica. Uso y abuso de drogas	Negociar y consensuar el plan terapéutico. Fomentar la percepción de indicadores de la necesidad de tratamiento. Informar sobre riesgos y beneficios del tratamiento. Asociar cada toma con actividades cotidianas. Técnicas especiales y ayudas para el cumplimiento (diarios de medicación, alarmas, teléfonos, etc). Mejorar la comunicación paciente – profesional sanitario. Información referente a la enfermedad y el tratamiento, motivo de la dosificación, riesgo del incumplimiento. Información oral y escrita. Verificar comprensión. Derivar para intervención psicológica en áreas disfuncionales o intervención psiquiátrica si se detecta patología psiquiátrica.

Tabla 11. Toxicidad de cada familia de fármacos antirretrovirales

Familia	Toxicidad	Prevalencia	Clínica
Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos o nucleótidos ¹	Toxicidad mitocondrial	20-40%	Neuropatía periférica Miopatía Cardiomiopatía Pancreatitis Hepatomegalia Esteatosis hepática Hepatitis Acidosis láctica Mielotoxicidad Alteración tubular proximal renal Lipoatrofia Hiperlipemia y resistencia insulínica
Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos ²	Hipersensibilidad	10-20%	Exantema (extensión y gravedad variable) Afectación multiorgánica Fiebre
Inhibidores de la proteasa ³	Hiperlipemia Resistencia a la insulina (IP clásicos; difícil de separar de los efectos de análogos de timidina) y lipodistrofia	25-50%	Hipertrigliceridemia (especialmente) Hipercolesterolemia Diabetes mellitus Lipoacumulación intraabdominal
Inhibidores de la fusión ⁴	Inflamación dérmica local	60-70%	Dolor Tumoración
Inhibidores de los receptores CCR5 ⁵	Mecanismo desconocido (bloqueo receptor CCR5?)	<2%	↑ riesgo de infecciones respiratorias ↑ riesgo de cardiopatía isquémica? ⁵
Inhibidores de la integrasa ⁶	Mecanismo desconocido	5-10% ⁶	Elevación de CPK ⁶

Las distintas manifestaciones de la toxicidad se suelen presentar de forma aislada. Aparecen generalmente en los tres primeros meses de tratamiento, aunque algunas expresiones de la toxicidad mitocondrial (neuropatía, miopatía, acidosis láctica o lipoatrofia) suelen aparecer de forma tardía (meses o años).

1. ABC constituye una excepción, pues su toxicidad está mediada por hipersensibilidad. TDF puede inducir nefrotoxicidad.
2. Efavirenz puede inducir toxicidad neuropsiquiátrica como efecto adverso singular.
3. Indinavir puede causar nefrolitiasis e insuficiencia renal como efectos adversos singulares. Atazanavir no comporta el riesgo de alteraciones metabólicas, como otros IP, pero puede producir hiperbilirrubinemia y nefrolitiasis como efectos adversos singulares.
4. La enfuvirtida (T-20), único representante de esta familia disponible en la actualidad, se administra por vía subcutánea.
5. Maraviroc es el único representante de esta familia disponible en la actualidad. Los efectos indicados están incluidos en la ficha técnica.
6. Raltegravir es el único representante de esta familia disponible en la actualidad. En estudio BENCHMRK, elevación de CPK grado 3-4 (generalmente asintomática), 7%. CPK: Creatinfosfoquinasa

Tabla 12. Toxicidad de los antirretrovirales por órganos y aparatos

Toxicidad	Fármaco/s	Diagnóstico	Patogenia	Actitud
Anemia	AZT (dosis-dependiente)	Síntomas clínicos de anemia	Inhibición de la proliferación de las células progenitoras eritroides	Suspensión de AZT Transfusión de hematíes (si hemoglobina <8g/dL ó hay síntomas de anemia)
Miopatía	AZT (dosis-dependiente) RAL	Después del primer semestre de tratamiento (AZT) Síntomas: mialgias o debilidad muscular proximal y elevación de enzimas musculares (CPK, LDH, aldolasa)	Toxicidad mitocondrial (AZT) Mecanismo desconocido (RAL)	Suspensión de AZT ó RAL Si clínica importante, prednisona 1-2 mg/kg/día (AZT)
Neuropatía periférica	ddl (13-34%) d4T (15-20%) (dosis-dependiente)	Hipoestesia, parestesia o dolor en zona distal de extremidades (especialmente pies) Diagnóstico diferencial con la neuropatía por el propio VIH (aparece en pacientes sin tratamiento e inmunodepresión grave)	Interacción entre citoquinas y factores de crecimiento neuronal Favorecida por neuropatía previa y factores predisponentes (enolismo, desnutrición, diabetes, etc)	Evitar asociaciones de fármacos neurotóxicos Valorar mantener fármacos potencialmente implicados si la clínica no es grave y no hay alternativas razonables Suspender los fármacos implicados si clínica progresiva o invalidante. La recuperación es lenta (meses o años). Si dolor leve: analgésicos habituales. Si dolor moderado-intenso: gabapentina, pregabalina o lamotrigina con o sin benzodiacepinas; si no eficacia, valorar carbamacepina y/o amitriptilina (producen efectos colinérgicos) Si dolor muy intenso o refractario: opiáceos
Toxicidad neuropsíquica	EFV (20-50%) (dosis-dependiente; más prevalente si administración con alimentos)	Durante el primer mes de tratamiento, tras lo cual disminuye o desaparece. Espectro clínico variado: mareo, ansiedad, somnolencia, trastornos del sueño, agravamiento de problemas psíquicos subyacentes, y alteraciones motoras.	Desconocida.	Evitar en pacientes con trastornos psiquiátricos mayores. Valorar individualmente el estilo de vida y la actividad del paciente antes de prescribirlo. Generalmente no es necesaria la suspensión de efavirenz. Suspender en casos de manifestaciones graves o invalidantes. Administración por la noche, al menos 1-2 horas después de la cena. Valorar benzodiacepinas o neurolépticos si alteraciones del sueño persistentes. Puede intentarse ajuste de dosis si hay posibilidad de estudio farmacocinético, aunque no está definitivamente probado

Toxicidad	Fármaco/s	Diagnóstico	Patogenia	Actitud
Exantema y/o hipersensibilidad	<p>No-nucleósidos (más frecuente NVP) (<20%)</p> <p>Inhibidores de proteasa (más frecuente TPV (8-14%), DRV y FPV (3-5%))</p> <p>Nucleósidos (más frecuente ABC: 5% si no se realiza determinación de HLA B*5701; si se realiza, la frecuencia es 0%)</p>	<p>Durante los primeros dos meses de tratamiento</p> <p>Exantema maculo-papular (casos leves).</p> <p>Fiebre, afectación mucosa, pulmonar, hepática o hematológica (casos graves)</p> <p>La hipersensibilidad se manifiesta por afectación multiorgánica, a veces con escaso o nulo exantema, y puede haber eosinofilia.</p>	<p>Desconocida.</p> <p>Se ha sugerido una reacción antígeno-anticuerpo similar a la enfermedad del suero o una toxicidad directa por metabolitos intermedios.</p> <p>Identificación de pacientes con riesgo genético elevado de hipersensibilidad a abacavir (HLA-B*5701)</p>	<p>Comienzo escalonado de dosis de nevirapina. No dar corticoides profilácticos (no evitan el riesgo e incluso lo pueden aumentar) ni antihistamínicos</p> <p>Si exantema leve sin clínica de hipersensibilidad acompañante, se puede mantener el tratamiento y realizar una vigilancia estrecha.</p> <p>El exantema por ETR, generalmente leve-moderado y raramente obliga a retirar el fármaco</p> <p>Si exantema grave o clínica de hipersensibilidad, interrupción permanente del fármaco.</p> <p>En los casos donde pueda estar implicado ABC y la clínica no sea clara, puede ser razonable mantener el tratamiento durante 24 horas más con una vigilancia estrecha y valorar evolución antes de retirar ABC.</p> <p>Tratamiento sintomático con antihistamínicos y/o corticoides una vez interrumpido el fármaco sospechoso</p> <p>Tratamiento de soporte hemodinámico, o respiratorio en casos graves que lo requieran</p> <p>NO REINTRODUCIR NUNCA UN FÁRMACO RETIRADO POR SOSPECHA DE HIPERSENSIBILIDAD</p>
Hepatitis	<p>Nucleósidos (más frecuente AZT, ddI y d4T). No nucleósidos (más frecuente NVP)</p> <p>Inhibidores de proteasa (más frecuente RTV a dosis plena)</p>	<p>El 50% de los casos aparece en el primer semestre.</p> <p>Aumento de transaminasas sin clínica (10-15% de pacientes).</p> <p>Hepatitis clínica (<1%).</p> <p>Factores de riesgo: infección por virus de hepatitis B y C</p>	<p>Multifactorial: toxicidad mitocondrial (nucleósidos), efecto tóxico-inmunológico (no nucleósidos); si IP efecto mixto (toxicidad directa, recuperación inmune si VHB o VHC), rebrote de virus B tras suspender TARV con efecto anti-VHB</p>	<p>Considerar vigilancia estrecha y potencial suspensión si transaminasas >5 veces límite superior de normalidad.</p> <p>Interrumpir si transaminasas >10 veces límite superior de normalidad, manifestaciones clínicas de hipersensibilidad (fiebre o exantema), de fallo hepático (ictericia, encefalopatía, o hemorragia) o acidosis láctica.</p>

Toxicidad	Fármaco/s	Diagnóstico	Patogenia	Actitud
Toxicidad gastrointestinal	Inhibidores de proteasa sobre todo RTV (a dosis plenas), 40%; IDV, 25%; NFV, 25%; LPV/r, 25%; SQV, 5% Nucleósidos con menor frecuencia que IP (particularmente AZT y TDF)	Sabor desagradable (RTV suspensión) Molestias digestivas altas (IDV y APV) Diarrea (NFV y LPV/r)	Multifactorial. Inhibición de enzimas pancreáticas (inhibidores de proteasa). Intolerancia a la lactosa que contienen como excipiente (todos los antirretrovirales).	Raramente grave, pero por su frecuencia e incomodidad puede limitar la adherencia al TAR. Para la diarrea, dietas ricas en alimentos astringentes o fibra soluble o fármacos inhibidores de la motilidad intestinal (loperamida). Suspensión del fármaco si molestias persistentes o intensas.
Pancreatitis	Nucleósidos (más frecuente ddl y d4T). Aumento de riesgo cuando se administra hidroxiurea, o TDF con ddl.	Generalmente, asintomática. Puede haber manifestaciones clínicas de dolor abdominal y diarrea.	Toxicidad mitocondrial	Retirar el fármaco potencialmente implicado.
Insuficiencia renal y tubulopatía	TDF IDV	Elevación leve o moderada de la creatinina con/sin anomalías analíticas de disfunción tubular (hipofosfatemia). No suele acompañarse de clínica.	Alteración tubular proximal (TDF) Nefritis intersticial por cristales (IDV)	Evitar en pacientes con insuficiencia renal. Evitar en lo posible coadministración con otros fármacos potencialmente nefrotóxicos. Hidratación adecuada para prevenir o mejorar la elevación de creatinina. Suspensión del fármaco si el filtrado glomerular es <50 mL/min
Nefrolitiasis	IDV ATV	Dolor cólico lumbar. Hematuria microscópica y ocasionalmente macroscópica. Ocasionalmente, fiebre (diagnóstico diferencial con pielonefritis) Más frecuente en ambientes calurosos	Precipitación de indinavir en orina concentrada (densidad >1020) y pH básico (>5).	Prevención mediante ingesta adecuada de líquido (1500 ml de agua al día o más si ambiente caluroso o pérdidas extraordinarias de líquidos). Evitar bebidas carbónicas. Anti-inflamatorios no esteroideos para el dolor. Suspensión transitoria del fármaco responsable si dolor intenso. Suspensión definitiva del fármaco responsable si episodios repetidos sin desencadenante evidente. Ajuste de dosis si posibilidad de estudio farmacocinético.

Tabla 13. Evaluación y tratamiento de la dislipemia

Evaluación	Tratamiento
<p>Realizar analítica en ayunas</p> <p>Descartar otras causas de hiperlipemia secundaria</p> <p>Tratamiento encaminado a prevenir la enfermedad aterosclerótica y a evitar las complicaciones inmediatas de la hipertrigliceridemia grave.</p>	<p>Objetivo del tratamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conseguir una cifra de colesterol LDL, según el riesgo. Si enfermedad coronaria o riesgo equivalente, LDL <70 mg/dL; si RCV ≥20% (Framingham), LDL <100 mg/dL - Si triglicéridos >500mg/dL, se tratará la hipertrigliceridemia independientemente la concentración de colesterol-LDL <p>Tratamiento:</p> <p>En primer lugar, medidas generales: dieta (consulta a experto en nutrición), ejercicio físico, abstinencia de tabaco, y sobre todo valoración individualizada de la retirada de IP y/o de los análogos de la timidina.</p> <p>Tratamiento farmacológico (si medidas previas no son eficaces):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estatinas. Utilizar preferentemente atorvastatina, pravastatina o rosuvastatina; precaución por interacciones con IPs. Valorar ezetimibe o la combinación ácido nicotínico/laropirant solas (si no se pueden usar estatinas) o asociadas a estatinas (si no se consiguen los objetivos de tratamiento con estatinas solas) - Fibratos si hipertrigliceridemia aislada o junto a elevación moderada de colesterol-LDL. En caso de hipertrigliceridemia intensa y refractaria puede añadirse ácidos grasos omega-3. - Precaución con la coadministración de fibratos y estatinas (mayor riesgo de toxicidad muscular)

Tabla 14. Evaluación y tratamiento de la diabetes mellitus

Evaluación	Tratamiento
<p>Realizar analítica en ayunas</p> <p>Prueba de tolerancia oral a la glucosa (si glucosa basal alterada)</p> <p>Tratamiento encaminado a evitar las complicaciones metabólicas a corto plazo (hipoglucemia, cetosis, cetoacidosis, y estado hiperosmolar) y las complicaciones micro y macrovasculares a largo plazo</p>	<p>Valorar individualizadamente la sustitución de análogos de la timidina y otros fármacos no antirretrovirales que pudieran estar implicados</p> <p>Objetivo terapéutico guiado por hemoglobina glicosilada (HbA1c) <6.5%</p> <p>Consulta con endocrinólogo</p> <p>Antidiabéticos orales. Metformina, si sobrepeso u obesidad abdominal, o sulfonilureas. Pioglitazona si lipoatrofia</p> <p>Insulina en los pacientes con diabetes de inicio e insulinopenia (cetosis o cetoacidosis), pérdida de peso y cuando no sea posible conseguir el objetivo de HbA1c < 7% con antidiabéticos orales.</p> <p>Debería considerarse la administración de 75-150 mg/día de AAS a todos los pacientes con diabetes.</p>

Tabla 15. Evaluación y tratamiento de la alteración de la distribución de la grasa corporal*

Evaluación	Tratamiento
<p>Diagnóstico clínico</p> <p>Sería deseable la realización periódica de alguna medida objetiva de la composición corporal (según disponibilidad y posibilidades económicas de cada centro)</p>	<p>No hay ninguna medida que haya demostrado resolver satisfactoriamente los cambios corporales. Las que a continuación se describen han mostrado, en el mejor de los casos, una eficacia parcial y algunas de ellas no están exentas de riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • medidas generales (dieta, ejercicio físico): evitar modificaciones de peso >5% del peso ideal ; el ejercicio físico aeróbico mejora las alteraciones metabólicas y la lipoacumulación intraabdominal • sustitución de FAR (IP, AN): la retirada de los IP clásicos puede mejorar las alteraciones metabólicas y la lipoacumulación intraabdominal; la retirada de análogos de timidina mejora la lipoatrofia (existen más estudios con d4T que con AZT) • fármacos con efectos metabólicos (metformina, glitazonas, hormona del crecimiento). La hormona del crecimiento puede disminuir la lipoacumulación intraabdominal pero provoca hiperglucemia y otros efectos secundarios. Se han comunicado buenos resultados en la lipoacumulación visceral con tesamorelina (análogo del factor estimulante de la hormona de crecimiento). Los efectos de todos estos fármacos revierten con el cese del mismo y ninguno de ellos tiene indicación para el tratamiento de la lipodistrofia. • cirugía plástica (relleno facial en lipoatrofia, cirugía reductora en lipoacúmulos accesibles): es el único tratamiento actual con resultados inmediatos.

* La alteración de la distribución de la grasa corporal es una complicación prevalente y limitante de la calidad de vida de los pacientes que reciben TARV

Tabla 16. Ajuste de dosis de los antirretrovirales en insuficiencia renal y hepática

Antirretrovirales	Insuficiencia renal	Hemodiálisis/diálisis peritoneal	Insuficiencia hepática
Inhibidores TI, análogos nucleósido			
Abacavir (ABC)	No requiere ajuste de dosis No administrar Combivir® y Trizivir® en pacientes con CI <50 mL/min (por separado, ajustar dosis adecuadamente)	Dosis habitual. HD: administrar independientemente de la sesión de HD, ya que se elimina mínimamente.	IH leve (Child-Pugh 5 a 6): 200 mg c/12h. Utilizar la solución oral de Ziagen® (10 mL c/12h). IH moderada-grave: la seguridad, eficacia y propiedades farmacocinéticas no han sido evaluadas. Evitar en lo posible su uso.
Didanosina, cápsulas entéricas (ddl)	≥ 60 Kg CI ≥60: 400 mg c/24h CI 30-59: 200 mg c/24h CI 10-29: 125 mg c/24h CI <10: 125 mg c/24h	HD/CAPD: 125 mg c/24h; los días de HD administrar post-HD/CAPD (no requiere suplemento).	Riesgo elevado de toxicidad hepática y descompensación. En pacientes cirróticos, no se recomienda el uso de didanosina.
	<60 kg CI ≥60: 250 mg c/24h CI 30-59: 125 mg c/24h CI 10-29: 125 mg c/24h CI <10: Emplear Videx® polvo para solución pediátrica 75 mg/24h.	HD/CAPD: Emplear Videx® polvo para solución pediátrica 75 mg/24h.	En pacientes en tratamiento del VHC didanosina no debe administrarse conjuntamente con ribavirina.

Antirretrovirales	Insuficiencia renal	Hemodiálisis/diálisis peritoneal	Insuficiencia hepática
Emtricitabina (FTC)	<p>En cápsulas</p> <p>CI \geq50: 200 mg c/24h CI 30-49: 200 mg c/48h CI 15-29: 200 mg c/72h CI <15: 200 mg c/96h</p> <p>En solución (10 mg/ml)*:</p> <p>CI \geq50: 240 mg (24 ml) c/24h CI 30-49: 120 mg (12 ml) c/24h CI 15-29: 80 mg (8 ml) c/24h CI <15: 60 mg (6 ml) c/24h</p> <p>Truvada®: no administrar a pacientes con CI < 30 mL/min</p>	<p>HD: en comprimidos 200 mg c/96h, en solución (10 mg/ml) 60 mg (6 ml) c/24h.</p> <p>Los días de HD administrar post-HD</p> <p>No se ha estudiado en diálisis peritoneal.</p> <p>Truvada®: no administrar a pacientes en HD (administrar los componentes por separado, ajustando dosis adecuadamente)</p>	<p>Dosis habitual (no hay datos, pero en base a su mínimo metabolismo hepático, es poco probable que requiera ajuste de dosis).</p>
Estavudina (d4T)	<p>\geq 60 Kg</p> <p>CI \geq50: 40 mg c/12h CI 26-49: 20 mg c/12h CI \leq25: 20 mg c/24h</p> <hr/> <p><60 kg</p> <p>CI \geq50: 30 mg c/12h CI 26-49: 15 mg c/12h CI \leq25: 15 mg c/24h</p>	<p>HD: 20 mg c/24h; los días de HD administrar post-HD</p> <hr/> <p>HD: 15 mg c/24h; los días de HD administrar post-HD</p>	<p>Dosis habitual. Utilizar con precaución por el riesgo de toxicidad mitocondrial y esteatosis hepática.</p>

Antirretrovirales	Insuficiencia renal	Hemodiálisis/diálisis peritoneal	Insuficiencia hepática
Lamivudina (3TC)	<p>CI \geq 50: 150 mg c/12h ó 300 mg c/24h</p> <p>CI 30-49: 150 mg c/24h (primera dosis de 150 mg)</p> <p>CI 15-29: 100 mg c/24h (primera dosis 150 mg)</p> <p>CI 5-14: 50 mg c/24h (primera dosis 150 mg)</p> <p>CI <5: 25 mg c/24h (primera dosis 50 mg)</p> <p>No administrar Combivir[®] y Trizivir[®] si CI <50 mL/min (administrar los componentes por separado, ajustando dosis adecuadamente)</p>	HD: 25 mg c/24h (primera dosis 50 mg) Los días de la HD, administrar post-HD.	Dosis habitual
Tenofovir (TDF)	<p>CI \geq 50: no requiere ajuste de dosis</p> <p>CI 30-49: 300 mg c/48h</p> <p>CI 10-29: 300 mg c/72 a 96h</p> <p>No hay recomendaciones disponibles para pacientes con CI <10 sin HD</p>	HD: habitualmente 300 mg una vez por semana, después de una de las sesiones (asumiendo 3 sesiones de diálisis semanales de 4h)	Dosis habitual
Zidovudina (AZT)	<p>Puede acumularse el metabolito glucurónido (GAZT)</p> <p>CI 10-50: 250-300 mg c/12h.</p> <p>CI <10: 250-300 mg c/24h.</p> <p>No administrar Combivir[®] y Trizivir[®] en pacientes con CI <50 mL/min (administrar los componentes por separado, ajustando dosis adecuadamente)</p>	<p>300 mg c/24h.</p> <p>HD/CAPD: no afecta la eliminación de AZT y aumenta la eliminación de GAZT. Por precaución, se recomienda administrar la dosis diaria post-HD/CAPD.</p>	<p>Se ha observado una reducción del aclaramiento oral de zidovudina el 32%, 63% y 70%, respectivamente, en pacientes con IH leve, moderada-grave ó cirrosis comprobada por biopsia, en comparación con sujetos sin alteración hepática.</p> <p>Algunos autores sugieren reducir la dosis a 200 mg c/12h en pacientes con IH grave. Se recomienda monitorizar estrechamente la aparición de toxicidad hematológica.</p>

Antirretrovirales	Insuficiencia renal	Hemodiálisis/diálisis peritoneal	Insuficiencia hepática
Inhibidores de la TI, no análogos			
Efavirenz (EFV)	<p>No requiere ajuste de dosis.</p> <p>Atripla®: en pacientes con Cl <50 ml/min, utilizar los principios activos por separado.</p>	<p>HD: no parece necesario ajustar la dosis.</p> <p>CAPD: un estudio farmacocinético preliminar indica que no se requiere ajuste de dosis (datos de un solo paciente).</p>	<p>IH leve a moderada: dosis habitual. Dada la elevada variabilidad interindividual, se recomienda monitorizar niveles plasmáticos y aparición de efectos adversos, especialmente a nivel de SNC.</p> <p>IH grave: datos escasos. Evitar en lo posible su uso/ monitorizar niveles plasmáticos. En un paciente con Child Pugh grado C, la semivida de EFV se duplicó. En dos pacientes con IH (uno de ellos con cirrosis) el AUC de EFV aumentó 4 veces. En 3 pacientes con fibrosis >12 kPa (Fibroscan®) la Cmin fue 2,5 veces superior a la obtenida en 15 pacientes coinfectados por VHC con fibrosis <12kPa.</p> <p>En otro estudio el 31% de los pacientes cirróticos presentaron unas concentraciones > 4000 ng/mL, en comparación con un 3% en los coinfectados no cirróticos.</p>
Etravirina (ETV)	NRAD	HD/CAPD: por su elevada unión a proteínas plasmáticas, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD.	<p>IH leve o moderada: no requiere ajuste de dosis.</p> <p>IH grave: no hay datos; evitar en lo posible su uso.</p>

Antirretrovirales	Insuficiencia renal	Hemodiálisis/diálisis peritoneal	Insuficiencia hepática
Nevirapina (NVP)	No requiere ajuste de dosis.	HD: los días de HD, se recomienda administrar la dosis después de la HD ó un suplemento de 200 mg post-hemodiálisis.	<p>IH leve a moderada (Child-Pugh ≤ 7): dosis habitual. Sin embargo, en pacientes con IH moderada, se recomienda monitorizar estrechamente niveles plasmáticos y aparición de efectos adversos. En un estudio en 4 pacientes con IH moderada (Child-Pugh B), el AUC de NVP aumentó 41%.</p> <p>IH grave: Evitar en lo posible su uso (hepatotoxicidad).</p> <p>En el estudio NEVADOSE 66% de los pacientes con un mayor grado de fibrosis (F4; Fibroscan[®]) presentaron una C_{min} de NVP por encima del límite superior de normalidad (>6000 ng/mL). En otro estudio el 50% de los pacientes cirróticos presentaron unas concentraciones > 8000 ng/mL, en comparación con un 27% en los coinfectados no cirróticos.</p> <p>Se ha observado un aumento de riesgo de hepatotoxicidad en pacientes sin tratamiento previo con CD4 >250 céls/μL (mujeres) o >400 céls/μL (hombres)</p>

Antirretrovirales	Insuficiencia renal	Hemodiálisis/diálisis peritoneal	Insuficiencia hepática
Inhibidores de la proteasa			
Atazanavir (ATV)	No requiere ajuste de dosis	<p>HD/CAPD: por su elevada unión a proteínas plasmáticas, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD.</p> <p>HD: se recomienda su uso potenciado (ATV/r 300/100) para compensar el descenso de concentración de ATV (reducción del 28% en el AUC de ATV los días sin HD y del 42% los días de HD; la eliminación a través de la HD es de sólo el 2%). Monitorizar niveles plasmáticos cuando sea posible.</p>	<p>IH leve: según un estudio en pacientes coinfectados con VHC con IH leve a moderada, el ATV no potenciado (400 mg/24h) puede no llegar a alcanzar la C_{min} deseada (6/9 pacientes con niveles subterapéuticos). Se recomienda usar ATV potenciado con RTV (300/100 mg /24h),</p> <p>IH moderada-grave: la Agencia Europea del Medicamento desaconseja el uso de atazanavir potenciado en este contexto por falta de datos. En 9 pacientes con fibrosis >12 kPa (Fibroscan®) que recibieron ATV/r, la C_{min} fue comparable a la obtenida en 26 pacientes coinfectados por VHC con fibrosis <12 kPa. Un estudio en 12 pacientes coinfectados por VHC tratados con ATV/r, el AUC fue solo un 36% superior en los pacientes cirróticos (n=7)</p> <p>Monitorizar niveles plasmáticos cuando sea posible.</p>
Darunavir (DRV)	IR leve, moderada o grave: no requiere ajuste de dosis	<p>HD/CAPD: debido a la elevada unión a proteínas plasmáticas, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD.</p>	<p>IH leve o moderada: no requiere ajuste de dosis</p> <p>IH grave: no hay datos; evitar en lo posible su uso.</p>

Antirretrovirales	Insuficiencia renal	Hemodiálisis/diálisis peritoneal	Insuficiencia hepática
Fosamprenavir (FPV)	No requiere ajuste de dosis	HD/CAPD: debido a su elevada unión a proteínas plasmáticas, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD.	<p>IH leve (Child Pugh 5-6): FPV 700 mg c/12h + RTV 100 mg c/24h IH moderada (Child Pugh 7-9): FPV 450 mg c/12h + RTV 100 mg c/24h En IH grave (Child Pugh 10-15): FPV 300 mg c/12h + RTV 100 mg c/24h (usar solución oral de FPV)</p> <p>En un estudio los pacientes cirróticos (n=6) presentaron una C_{min} 2 veces mayor y AUC 43% mayor. En otro estudio, en 2 pacientes con fibrosis >12 kPa (Fibroscan®) la C_{min} fue comparable a la obtenida en 6 pacientes coinfectados por VHC con fibrosis <12 kPa. Se recomienda la monitorizar niveles plasmáticos cuando sea posible.</p>
Indinavir (IDV)	No requiere ajuste de dosis	HD: probablemente no requiera ajuste de dosis si función hepática conservada (datos de un solo paciente). Se elimina mínimamente a través de la HD.	<p>IDV (no potenciado): IH leve a moderada: 600 mg c/8h. IH grave: no hay datos. Se recomienda monitorizar niveles plasmáticos cuando sea posible.</p> <p>IDV/r: Algunos pacientes coinfectados con VHC pueden requerir reducción de dosis, habitualmente IDV/r 400/100 mg C/12h o, incluso IDV/r 200/100 mg c/12h. Se recomienda monitorizar niveles plasmáticos cuando sea posible.</p>

Lopinavir (LPV/r)	No requiere ajuste de dosis	<p>HD: El AUC de LPV/r en 13 pacientes en HD fue equivalente a la de pacientes con función renal normal. No ajuste de dosis.</p> <p>CAPD: no hay datos. Debido a la elevada unión a proteínas plasmáticas de lopinavir y ritonavir, no es de esperar que se elimine en las sesiones de CAPD.</p>	<p>En un estudio los pacientes coinfectados por VHC con cirrosis hepática sin signos de IH (n=7) presentaron un aumento del 100% en el AUC y la Cmin de ritonavir, pero sin diferencias en la exposición a lopinavir.</p> <p>Un estudio en pacientes con IH leve (n=6) o moderada (n=6) mostró un aumento significativo en la exposición tanto a lopinavir como a ritonavir. Sin embargo, la relevancia clínica de estos cambios no está clara por lo que no se aconseja modificar las dosis de lopinavir.</p> <p>Se recomienda monitorizar niveles plasmáticos cuando sea posible.</p>
-------------------	-----------------------------	--	---

Antirretrovirales	Insuficiencia renal	Hemodiálisis/diálisis peritoneal	Insuficiencia hepática
Nelfinavir (NFV)	No requiere ajuste de dosis	<p>HD: no es probable que NFV se elimine significativamente a través de la HD. Datos de un paciente con ERCA e IH mostraron la ausencia de eliminación de NFV durante una sesión de HD de 4 horas.</p> <p>CAPD: no es probable que NFV se elimine significativamente a través de la CAPD. En un paciente tratado con 1250 mg c/12h de NFV, las concentraciones en el líquido de diálisis fueron inferiores al límite de detección.</p>	<p>Dosis habitual (aunque en presencia de IH aumenta el AUC de NFV entre un 49 % y un 69 %, los datos no parecen indicar que se produzca un aumento de toxicidad).</p> <p>Se recomienda monitorizar niveles plasmáticos cuando sea posible.</p>
Ritonavir (RTV)	No requiere ajuste de dosis	<p>HD/CAPD: debido a la elevada unión a proteínas plasmáticas de ritonavir, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD</p>	<p>No usar RTV a dosis plenas por el riesgo de hepatotoxicidad.</p> <p>Ritonavir como potenciador farmacocinético: IH leve a moderada: dosis habitual. IH grave: no hay datos. Evitar en lo posible su uso.</p> <p>Consultar datos específicos sobre el inhibidor de la proteasa potenciado con el ritonavir.</p>
Saquinavir (SQV)	No requiere ajuste de dosis.	<p>HD/CAPD: debido a la elevada unión a proteínas plasmáticas de ritonavir, no es de esperar que se elimine en las sesiones de HD/CAPD. Datos de un paciente indican escasa eliminación a través de HD.</p>	<p>IH leve-moderada: dosis habitual.</p> <p>IH grave: no hay datos. Evitar en lo posible su uso. Contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática descompensada.</p> <p>Se recomienda monitorizar niveles plasmáticos cuando sea posible.</p>

Antirretrovirales	Insuficiencia renal	Hemodiálisis/diálisis peritoneal	Insuficiencia hepática
Tipranavir (TPV)	No requiere ajuste de dosis.	HD/CAPD: debido a la elevada unión a proteínas plasmáticas de TPV/RTV, no es de esperar que se eliminen en las sesiones de HD/CAPD.	Datos limitados. Elevado riesgo de toxicidad hepática: TPV/r se ha relacionado con casos de hepatitis clínica y descompensación hepática, incluyendo algunos casos mortales. Se recomienda un estrecho seguimiento de los pacientes coinfectados por VHB ó VHC, por el aumento de riesgo de hepatotoxicidad que presentan. IH leve (Child-Pugh A): dosis habitual. IH moderada o grave (Child-Pugh B y C): contraindicado.
Inhibidores de la fusión			
Enfuvirtida (T-20)	No requiere ajuste de dosis.	HD: No requiere ajuste de dosis	No hay datos. Algunos autores recomiendan utilizar la dosis habitual.
Inhibidores de la Integrasa			
RAL (raltegravir)	No requiere ajuste de dosis	HD: no es probable que RAL se elimine significativamente a través de la HD. Datos de dos pacientes con ERCA mostraron la ausencia de eliminación de RAL durante una sesión de HD de 4 horas.	IH leve-moderada: no requiere ajuste de dosis. IH grave: no hay estudios. Utilizar con precaución.

Antirretrovirales**Insuficiencia renal****Hemodiálisis/diálisis peritoneal****Insuficiencia hepática****Inhibidores correceptor CCR5**

MVR (maraviroc)

En ausencia de inhibidores potentes del CYP3A4 probablemente no requiera ajuste de dosis.

Sólo se recomienda un ajuste de dosis en pacientes con CI <80 ml/min y que están recibiendo inhibidores potentes del CYP3A4, como los IPs (excepto TPV/r), ketoconazol, itraconazol, claritromicina o telitromicina: en estos casos administrar 150 mg c/24h. Si el CI es <30 ml/min se recomienda mucha precaución debido al aumento de riesgo de hipotensión postural.

Con CI <80 ml/min y en combinación con FPV/r administrar 150 mg c/12h.

(Estos ajustes de dosis se recomiendan basándose en los datos de un estudio en insuficiencia renal y simulaciones farmacocinéticas, sin que su seguridad y eficacia hayan sido evaluadas clínicamente, por lo que se recomienda una estrecha monitorización).

HD: en ausencia de inhibidores potentes del CYP3A4 no se requiere ajuste de dosis. En presencia de los mismos, dosificar igual que para CI <80 ml/min (datos limitados)

Datos de un estudio con dosis únicas de 300 mg MVR. En comparación con los voluntarios con función hepática normal:

IH leve: +25% AUC

IH moderada: +45% AUC

IH grave: no hay datos

Se desconoce la importancia clínica que estos aumentos pueden suponer.

Se ha descrito un caso de posible hepatotoxicidad precedido de una reacción alérgica sistémica.

*Las cápsulas y la solución oral de emtricitabina tienen diferente biodisponibilidad, de forma que con 240 mg de la solución oral (24 ml) se alcanzan unas concentraciones plasmáticas similares a las alcanzadas con 200 mg en cápsulas.

AN: análogos de nucleósidos; ANT: análogos de nucleótidos, CH: cirrosis hepática; CI: aclaramiento de creatinina en ml/min; ERCA: enfermedad renal crónica avanzada, HD: hemodiálisis; IH: insuficiencia hepática; IP: inhibidores de la proteasa; IR: insuficiencia renal; NN: inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos.

Tabla 17. Seguridad de los antirretrovirales en el embarazo

Fármaco	FDA*	Paso a través de placenta (Cociente RN/madre)	Carcinogenicidad (animales)	Teratogenicidad (animales)
Zidovudina	C	0,85	Sí	Si
Didanosina	B	0,5	No	No
Estavudina	C	0,76	Sí	No
Lamivudina	C	1	No	No
Abacavir	C	Si (ratas)	Sí	Si
Tenofovir	B	0,95-0-99	Sí	No
Emtricitabina	B	0,4-0,5	No	No
Saquinavir	B	Mínimo	No	No
Indinavir	C	Mínimo	Sí	No
Ritonavir	B	Mínimo	Sí	Si
Nelfinavir	B	Mínimo/Variable	Sí	No
Fosamprenavir	C	¿?	Sí	No
Lopinavir	C	0,2+/-0,13	Sí	Si
Atazanavir	B	Mínimo/Variable	Sí	No
Tipranavir	C	¿?	No completado	No
Darunavir	C	¿?	Sí	No
Nevirapina	B	1	Sí	No
Efavirenz	D	1	Sí	Si
Etravirina	B	¿?	No completado	No
Enfuvirtida	B	No (basado en muy pocos datos)	No realizado	No
Maraviroc	B	¿?	No	No
Raltegravir	C	Ratas (1,5-2,5) Conejos (0,02)	No completado	No

Tabla 18. Recomendaciones de profilaxis postexposición

PPE recomendada si:		
Exposición a:	Tipo exposición	Fuente
Sangre u otros fluidos potencialmente infectivos	Penetración SC o IM con aguja IM/IV o sistema IV	VIH+, o desconocido pero con factores de riesgo
	Accidente percutáneo con instrumento cortante o aguja IM/SC o sutura Contacto > 15min con mucosas o piel no intacta.	VIH+
Secreciones Genitales	Sexo anal o vaginal	VIH+, o desconocido pero con factores de riesgo
	Sexo oral receptivo con eyaculación	VIH+
UDVP	Intercambio de jeringuilla o agujas	VIH+
Régimen terapéutico:		
<p>TDF/FTC + IP/r (ver tabla 4)</p> <p>Alternativas*:</p> <p>AZT+3TC + IP/r</p> <p>TDF/FTC + RAL</p> <p>AZT/3TC + RAL</p> <p>AZT/3TC + TDF</p>		

* En casos de intolerancia o imposibilidad de usar TARV basados en IP/r

Tabla 19. Coste mensual (PVL+IVA, en €) de los antirretrovirales de uso más frecuente


Nombre genérico	Nombre comercial	Presentación	Coste (PVL+4% IVA)	Coste/ unidad	Unidades/ mes	Coste/ mes	Coste/ mes RTV	Coste total mensual de la pauta	Pauta
Análogos de nucleósido y nucleótido									
Abacavir	ZIAGEN	300 MG 60 COMP	234,72	3,91	60	234,72		234,72	ABC 300 mg/12h
Didanosina	VIDEX	400 MG 30 CAPS	160,56	5,35	30	160,56		160,56	ddI 400 mg/24h
Didanosina	VIDEX	250 MG 30 CAPS	100,34	3,34	30	100,34		100,34	ddI 250 mg/24h
Emtricitabina	EMTRIVA	200 MG 30 CAPS	153,24	5,11	30	153,24		153,24	FTC 200 mg/24h
Estavudina	ZERIT	40 MG 448 CAPS	1213,84	2,71	60	162,57		162,57	d4T 40 mg/12h
Estavudina	ZERIT	30 MG 448 CAPS	1174,65	2,62	60	157,32		157,32	d4T 30 mg/12h
Lamivudina	EPIVIR	300 MG 30 COMP	146,81	4,89	30	146,81		146,81	3TC 300 mg/24h
Lamivudina	LAMIVUDINA NORMON	300 MG 30 COMP	65,27	2,17	30	65,27		65,27	3TC 300 mg/24h
Tenofovir	VIREAD	245 MG 30 COMP	300,25	10,00	30	300,25		300,25	TDF 300 mg/24h
Zidovudina	RETROVIR	300 MG 300 COMP	820,20	2,73	60	164,04		164,04	AZT 300 mg/12h
Zidovudina	ZIDOVUDINA COMBINOPHARM	300 MG 300 CAPS	430,62	1,44	60	86,12		86,12	AZT 300 mg/12h

Nombre genérico	Nombre comercial	Presentación	Coste (PVL+4% IVA)	Coste/ unidad	Unidades/ mes	Coste/ mes	Coste/ mes RTV	Coste total mensual de la pauta	Pauta
Análogos de nucleósido y nucleótido en combinación									
Abacavir+ Lamivudina	KIVEXA	600/300 MG 30 COMP	369,76	12,33	30	369,77		369,76	Kivexa 1c/24h
Emtricitabina+ Tenofovir	TRUVADA	200/245 MG 30 COMP	450,04	15,00	30	450,04		450,04	Truvada 1c/24h
Zidovudina+ Lamivudina	COMBIVIR	150/300 MG 60 COMP	302,03	5,03	60	302,03		302,03	Combivir 1c/12h
Zidovudina+ Lamivudina+ Abacavir	TRIZIVIR	300/150/300 MG 60 COMP	509,93	8,50	60	509,93		509,93	TZV 1c/12h
Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos									
Efavirenz	SUSTIVA	600 MG 30 COMP	275,63	9,19	30	275,63		275,63	EFV 600 mg/24h
Nevirapina	VIRAMUNE	200 MG 60 COMP	207,68	3,46	60	207,68		207,68	NVP 200 mg/12h
Etravirina	INTELENCE	100 MG 120 COMP	468,00	3,9	120	468,00		468,00	ETR 200 MG/12 H
Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos en combinación con análogos de nucleósidos y nucleótidos									
Efavirenz + Emtricitabina+ Tenofovir	ATRIPLA	600 MG 200 MG 245 MG COMP	729,12	24,30	30	729,12		729,12	Atripla 1c/24h

Nombre genérico	Nombre comercial	Presentación	Coste (PVL+4% IVA)	Coste/ unidad	Unidades/ mes	Coste/ mes	Coste/ mes RTV	Coste total mensual de la pauta	Pauta
<i>Inhibidores de la proteasa</i>									
Atazanavir	REYATAZ	200 MG 60 CAPS	454,05	7,57	60	454,05		454,05	ATV 400 mg/24h
Atazanavir	REYATAZ	300 MG 30 CAPS	454,05	7,57	60	454,05	23,36	477,42	ATV/r 300/100 mg/24h
Darunavir	PREZISTA	600 MG 60 COMP	666,44	11,11	60	666,44	46,72	713,16	DRV/r 600/100 mg/12h
Darunavir	PREZISTA	400 MG 60 COMP	444,30	7,40	60	444,30	23,36	467,66	DRV/r 800/100 mg/24h
Fosamprenavir	TELZIR	700 MG 60 COMP	329,57	5,49	60	329,57	46,72	376,29	FPV/r 700/100 mg/12h
Indinavir	CRIXIVAN	400 MG 180 CAPS	272,22	1,51	120	181,48	46,72	228,20	IDV/r 800/100 mg/12h
Lopinavir+ Ritonavir comp	KALETRA	120 COMP	416,02	3,47	120	416,02		416,02	LPV/r 2 comp/12h
Nelfinavir	VIRACEPT	250 MG 270 COMP	306,91	1,14	300	341,02		341,02	NFV 1250 mg/12h
Saquinavir	INVIRASE	500 MG 120 COMP	316,11	2,63	120	316,12	46,72	362,84	SQV/r 1000/100 mg/12h
Ritonavir	NORVIR	100 MG 84 CAPS	65,42	0,78	60	46,72	46,72	46,72	RTV 100 mg/12h
Tipranavir	APTIVUS	250 MG 120 CAPS	733,20	6,11	120	733,20	93,44	826,64	TPV/r 500/200 mg/12h

Nombre genérico	Nombre comercial	Presentación	Coste (PVL+4% IVA)	Coste/ unidad	Unidades/ mes	Coste/ mes	Coste/ mes RTV	Coste total mensual de la pauta	Pauta
<i>Inhibidores de la fusión</i>									
Enfuvirtida	FUZEON	90 MG/ML 60 VIALES	1586,38	26,44	60	1586,37		1586,37	T20 90 mg/12h
<i>Inhibidores de la unión</i>									
Maraviroc	CESENTRI	150 Y 300 MG COMP	735,07	12,25	60	735,07		735,07	MVC 300 (ó 150) mg/12 h
<i>Inhibidores de la integrasa</i>									
Raltegravir	ISENTRESS	400 MG 60 COMP	717,60	11,96	60	717,60		717,60	RAL 400 mg/12h

Figura 1. Coste mensual de los tratamientos preferentes (según Tabla 4)



Precio en PVL+IVA en € (se ha calculado el precio basándose en los combos Truvada® y Kivexa®). Las pautas marcadas con asterisco (*) no han sido consideradas preferentes por la totalidad del panel

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Consejo Asesor Clínico del Plan Nacional sobre el SIDA. Tratamiento antirretroviral del adulto (4ª edición). Madrid. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1997: (10) 1-16.
2. Panel de expertos de Gesida y Plan Nacional sobre el sida. Documento de consenso de Gesida/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (Actualización enero 2010). *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2010; 28(6):362 e1-91
3. Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, Montaner JS, Rizzardini G, Telenti A et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2010 recommendations of the International AIDS Society-USA panel. *JAMA* 2010; 304(3):321-333
4. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Department of Health and Human Services. December 1, 2009. Disponible en: www.aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf (Acceso 14.12.2010).
5. Kish MA. Guide to development of practice guidelines. *Clin Infect Dis* 2001; 32(6):851-854
6. Mocroft A, Vella S, Benfield TL, Chiesi A, Miller V, Gargalianos P et al. Changing patterns of mortality across Europe in patients infected with HIV-1. EuroSIDA Study Group. *Lancet* 1998; 352(9142):1725-30
7. Palella FJ, Jr., Delaney KM, Moorman AC, Loveless MO, Fuhrer J, Satten GA et al. Declining morbidity and mortality among patients with advanced human immunodeficiency virus infection. HIV Outpatient Study Investigators. *N Engl J Med* 1998; 338(13):853-60
8. Knobel H, Polo R, Escobar I, (Coordinadores). Recomendaciones Gesida / SEFH / PNS para mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral (Actualización junio de 2008). Disponible en: www.gesida.seimc.org/pcientifica/fuentes/DcyRc/Gesida_dcyrc2008_adherenciaTAR.pdf (Acceso 14.12.2010).
9. Sterne JA, May M, Costagliola D, de WF, Phillips AN, Harris R et al. Timing of initiation of antiretroviral therapy in AIDS-free HIV-1-infected patients: a collaborative analysis of 18 HIV cohort studies. *Lancet* 2009; 373(9672):1352-1363
10. Jaen A, Esteve A, Miro JM, Tural C, Montoliu A, Ferrer E et al. Determinants of HIV progression and assessment of the optimal time to initiate highly active antiretroviral therapy: PISCIS Cohort (Spain). *J Acquir Immune Defic Syndr* 2008; 47(2):212-220
11. Autran B, Carcelain G, Li TS, Blanc C, Mathez D, Tubiana R et al. Positive effects of combined antiretroviral therapy on CD4+ T cell homeostasis and function in advanced HIV disease. *Science* 1997; 277(5322):112-6
12. Kelleher AD, Carr A, Zaunders J, Cooper DA. Alterations in the immune response of human immunodeficiency virus (HIV)-infected subjects treated with an HIV-specific protease inhibitor, ritonavir. *J Infect Dis* 1996; 173(2):321-9
13. Montessori V, Press N, Harris M, Akagi L, Montaner JS. Adverse effects of antiretroviral therapy for HIV infection. *CMAJ* 2004; 170(2):229-238
14. Hirsch MS, Gunthard HF, Schapiro JM, Brun-Vezinet F, Clotet B, Hammer SM et al. Antiretroviral drug resistance testing in adult HIV-1 infection: 2008 recommendations of an International AIDS Society-USA panel. *Clin Infect Dis* 2008; 47(2):266-285
15. Finzi D, Blankson J, Siliciano JD, Margolick JB, Chadwick K, Pierson T et al. Latent infection of CD4+ T cells provides a mechanism for lifelong persistence of HIV-1, even in patients on effective combination therapy. *Nat Med* 1999; 5(5):512-7
16. Josefsson L, Dahl V, Palmer S. Can HIV infection be eradicated through use of potent antiviral agents? *Curr Opin Infect Dis* 2010; 23(6):628-632
17. Garcia F, de LE, Plana M, Castro P, Mestre G, Nomdedeu M et al. Long-term CD4+ T-cell response to highly active antiretroviral therapy according to baseline CD4+ T-cell count. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2004; 36(2):702-713
18. Plana M, Garcia F, Gallart T, Miro JM, Gatell JM. Lack of T-cell proliferative response to HIV-1 antigens after 1 year of highly active antiretroviral treatment in early HIV-1 disease. Immunology Study Group of Spanish EARTH-1 Study. *Lancet* 1998; 352(9135):1194-5

19. Landon BE, Wilson IB, McInnes K, Landrum MB, Hirschhorn LR, Marsden PV et al. Physician specialization and the quality of care for human immunodeficiency virus infection. *Arch Intern Med* 2005; 165(10):1133-1139
20. Li TS, Tubiana R, Katlama C, Calvez V, Ait Mohand H, Autran B. Long-lasting recovery in CD4 T-cell function and viral-load reduction after highly active antiretroviral therapy in advanced HIV-1 disease. *Lancet* 1998; 351(9117):1682-6
21. Kostense S, Raaphorst FM, Notermans DW, Joling J, Hooibrink B, Pakker NG et al. Diversity of the T-cell receptor BV repertoire in HIV-1-infected patients reflects the biphasic CD4+ T-cell repopulation kinetics during highly active antiretroviral therapy. *AIDS* 1998; 12(18):235-40
22. Peña JM, Miro JM. Restauración inmunológica en pacientes con Sida. ¿Requiem por las profilaxis? *Med Clin (Barc)* 1999; 113(10):375-8
23. Lopez Bernaldo de Quiros JC, Miro JM, Pena JM, Podzamczar D, Alberdi JC, Martinez E et al. A randomized trial of the discontinuation of primary and secondary prophylaxis against *Pneumocystis carinii* pneumonia after highly active antiretroviral therapy in patients with HIV infection. Grupo de Estudio del SIDA 04/98. *N Engl J Med* 2001; 344(3):159-167
24. Deeks SG, Hecht FM, Swanson M, Elbeik T, Loftus R, Cohen PT et al. HIV RNA and CD4 cell count response to protease inhibitor therapy in an urban AIDS clinic: response to both initial and salvage therapy. *AIDS* 1999; 13(6):35-43
25. Deeks SG, Barbour JD, Martin JN, Swanson MS, Grant RM. Sustained CD4+ T cell response after virologic failure of protease inhibitor-based regimens in patients with human immunodeficiency virus infection. *J Infect Dis* 2000; 181(3):946-53
26. Kaufmann D, Pantaleo G, Sudre P, Telenti A. CD4-cell count in HIV-1-infected individuals remaining viraemic with highly active antiretroviral therapy (HAART). Swiss HIV Cohort Study. *Lancet* 1998; 351(9104):723-4
27. Garcia F, Vidal C, Plana M, Cruceta A, Gallart MT, Pumarola T et al. Residual low-level viral replication could explain discrepancies between viral load and CD4+ cell response in human immunodeficiency virus-infected patients receiving antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis* 2000; 30(2):392-4
28. Dronda F, Moreno S, Moreno A, Casado JL, Perez-Elias MJ, Antela A. Long-term outcomes among antiretroviral-naive human immunodeficiency virus-infected patients with small increases in CD4+ cell counts after successful virologic suppression. *Clin Infect Dis* 2002; 35(8):1005-1009
29. Gandhi RT. Cirrhosis is associated with low CD4+ T cell counts: implications for HIV-infected patients with liver disease. *Clin Infect Dis* 2007; 44(3):438-440
30. McGovern BH, Golan Y, Lopez M, Pratt D, Lawton A, Moore G et al. The impact of cirrhosis on CD4+ T cell counts in HIV-seronegative patients. *Clin Infect Dis* 2007; 44(3):431-437
31. Bongiovanni M, Gori A, Lepri AC, Antinori A, De LA, Pagano G et al. Is the CD4 cell percentage a better marker of immunosuppression than the absolute CD4 cell count in HIV-infected patients with cirrhosis? *Clin Infect Dis* 2007; 45(5):650-653
32. D'Egidio GE, Kravcik S, Cooper CL, Cameron DW, Fergusson DA, Angel JB. *Pneumocystis jirovecii* pneumonia prophylaxis is not required with a CD4+ T-cell count < 200 cells/microl when viral replication is suppressed. *AIDS* 2007; 21(13):1711-1715
33. Brambilla D, Reichelderfer PS, Bremer JW, Shapiro DE, Hershow RC, Katzenstein DA et al. The contribution of assay variation and biological variation to the total variability of plasma HIV-1 RNA measurements. The Women Infant Transmission Study Clinics. Virology Quality Assurance Program. *AIDS* 1999; 13(16):2269-79
34. Lopez A, Caragol I, Candeias J, Villamor N, Echaniz P, Ortuno F et al. Enumeration of CD4(+) T-cells in the peripheral blood of HIV-infected patients: an interlaboratory study of the FACSCOUNT system. *Cytometry* 1999; 38(5):231-237
35. Kempf DJ, Rode RA, Xu Y, Sun E, Heath-Chiozzi ME, Valdes J et al. The duration of viral suppression during protease inhibitor therapy for HIV-1 infection is predicted by plasma HIV-1 RNA at the nadir. *AIDS* 1998; 12(5):9-14
36. Raboud JM, Montaner JS, Conway B, Rae S, Reiss P, Vella S et al. Suppression of plasma viral load below 20 copies/ml is required to achieve a long-term response to therapy. *AIDS* 1998; 12(13):1619-24
37. Demeter LM, Hughes MD, Coombs RW, Jackson JB, Grimes JM, Bosch RJ et al. Predictors of virologic and clinical outcomes in HIV-1-infected patients receiving concurrent treatment with indinavir,

- zidovudine, and lamivudine. AIDS Clinical Trials Group Protocol 320. *Ann Intern Med* 2001; 135(11):954-64
38. Huang W, De G, V, Fischl M, Hammer S, Richman D, Havlir D et al. Patterns of plasma human immunodeficiency virus type 1 RNA response to antiretroviral therapy. *J Infect Dis* 2001; 183(10):1455-1465
 39. Hicks C, King MS, Gulick RM, White Jr AC, Eron Jr JJ, Kessler HA et al. Long-term safety and durable antiretroviral activity of lopinavir/ritonavir in treatment-naive patients: 4 year follow-up study. *AIDS* 2004; 18(5):775-779
 40. Siliciano RF. Scientific rationale for antiretroviral therapy in 2005: viral reservoirs and resistance evolution. *Top HIV Med* 2005; 13(3):96-100
 41. Nettles RE, Kieffer TL, Simmons RP, Cofrancesco J, Jr., Moore RD, Gallant JE et al. Genotypic resistance in HIV-1-infected patients with persistently detectable low-level viremia while receiving highly active antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis* 2004; 39(7):1030-1037
 42. Greub G, Cozzi-Lepri A, Ledergerber B, Staszewski S, Perrin L, Miller V et al. Intermittent and sustained low-level HIV viral rebound in patients receiving potent antiretroviral therapy. *AIDS* 2002; 16(14):1967-9
 43. Jones LE, Perelson AS. Transient viremia, plasma viral load, and reservoir replenishment in HIV-infected patients on antiretroviral therapy. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 45(5):483-493
 44. Havlir DV, Bassett R, Levitan D, Gilbert P, Tebas P, Collier AC et al. Prevalence and predictive value of intermittent viremia with combination HIV therapy. *JAMA* 2001; 286(2):171-9
 45. Lampe FC, Johnson MA, Lipman M, Loveday C, Youle M, Ransom D et al. Viral breakthrough after suppression with highly active antiretroviral therapy: experience from 233 individuals with viral loads of less than 50 copies/ml followed for up to 4 years. *AIDS* 2003; 17(5):768-70
 46. Mira JA, Macias J, Nogales C, Fernandez-Rivera J, Garcia-Garcia JA, Ramos A et al. Transient rebounds of low-level viraemia among HIV-infected patients under HAART are not associated with virological or immunological failure. *Antivir Ther* 2002; 7(4):251-256
 47. Lee PK, Kieffer TL, Siliciano RF, Nettles RE. HIV-1 viral load blips are of limited clinical significance. *J Antimicrob Chemother* 2006; 57(5):803-805
 48. Macias J, Palomares JC, Mira JA, Torres MJ, Garcia-Garcia JA, Rodriguez JM et al. Transient rebounds of HIV plasma viremia are associated with the emergence of drug resistance mutations in patients on highly active antiretroviral therapy. *J Infect* 2005; 51(3):195-200
 49. Garcia-Gasco P, Maida I, Blanco F, Barreiro P, Martin-Carbonero L, Vispo E et al. Episodes of low-level viral rebound in HIV-infected patients on antiretroviral therapy: frequency, predictors and outcome. *J Antimicrob Chemother* 2008; 61(3):699-704
 50. Saag MS, Holodniy M, Kuritzkes DR, O'Brien WA, Coombs R, Poscher ME et al. HIV viral load markers in clinical practice. *Nat Med* 1996; 2(6):625-9
 51. Khoo SH, Gibbons SE, Back DJ. Therapeutic drug monitoring as a tool in treating HIV infection. *AIDS* 2001; 15 Suppl 5:171-81
 52. Nettles RE, Kieffer TL, Parsons T, Johnson J, Cofrancesco J, Jr., Gallant JE et al. Marked intraindividual variability in antiretroviral concentrations may limit the utility of therapeutic drug monitoring. *Clin Infect Dis* 2006; 42(8):1189-1196
 53. Schapiro JM, Winters MA, Stewart F, Efron B, Norris J, Kozal MJ et al. The effect of high-dose saquinavir on viral load and CD4+ T-cell counts in HIV-infected patients. *Ann Intern Med* 1996; 124(12):1039-50
 54. Hoetelmans RM, Reijers MH, Weverling GJ, Ten Kate RW, Wit FW, Mulder JW et al. The effect of plasma drug concentrations on HIV-1 clearance rate during quadruple drug therapy. *AIDS* 1998; 12(11):111-5
 55. Casado JL, Moreno S, Hertogs K, Dronda F, Antela A, Dehertogh P et al. Plasma drug levels, genotypic resistance, and virological response to a nevirapine plus saquinavir-containing regimen. *AIDS* 2002; 16(1):47-52
 56. Harris M, Durakovic C, Rae S, Raboud J, Fransen S, Shillington A et al. A pilot study of nevirapine, indinavir, and lamivudine among patients with advanced human immunodeficiency virus disease who have had failure of combination nucleoside therapy. *J Infect Dis* 1998; 177(6):1514-20
 57. Fatkenheuer G, Hoetelmans RM, Hunn N, Schwenk A, Franzen C, Reiser M et al. Salvage therapy with regimens containing ritonavir and saquinavir in extensively pretreated HIV-infected patients. *AIDS* 1999; 13(12):1485-9

58. Veldkamp AI, Weverling GJ, Lange JM, Montaner JS, Reiss P, Cooper DA et al. High exposure to nevirapine in plasma is associated with an improved virological response in HIV-1-infected individuals. *AIDS* 2001; 15(9):1089-95
59. DiCenzo R, Forrest A, Fischl MA, Collier A, Feinberg J, Ribaud H et al. Pharmacokinetics of indinavir and nelfinavir in treatment-naive, human immunodeficiency virus-infected subjects. *Antimicrob Agents Chemother* 2004; 48(3):918-923
60. Csajka C, Marzolini C, Fattinger K, Decosterd LA, Fellay J, Telenti A et al. Population pharmacokinetics and effects of efavirenz in patients with human immunodeficiency virus infection. *Clin Pharmacol Ther* 2003; 73(1):20-30
61. Dieleman JP, Gyssens IC, Van Der Ende ME, de Marie S, Burger DM. Urological complaints in relation to indinavir plasma concentrations in HIV-infected patients. *AIDS* 1999; 13(4):473-8
62. Gonzalez de Requena D, Nunez M, Jimenez-Nacher I, Soriano V. Liver toxicity caused by nevirapine. *AIDS* 2002; 16(2):290-1
63. Gonzalez-Requena D, Nunez M, Jimenez-Nacher I, Gonzalez-Lahoz J, Soriano V. Short communication: liver toxicity of lopinavir-containing regimens in HIV-infected patients with or without hepatitis C coinfection. *AIDS Res Hum Retroviruses* 2004; 20(7):698-700
64. Gutierrez F, Padilla S, Navarro A, Masia M, Hernandez I, Ramos J et al. Lopinavir plasma concentrations and changes in lipid levels during salvage therapy with lopinavir/ritonavir-containing regimens. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2003; 33(5):594-600
65. Gonzalez de Requena D, Blanco F, Garcia-Benayas T, Jimenez-Nacher I, Gonzalez-Lahoz J, Soriano V. Correlation between lopinavir plasma levels and lipid abnormalities in patients taking lopinavir/ritonavir. *AIDS Patient Care STDS* 2003; 17(9):443-445
66. Gallego L, Barreiro P, del Rio R, Gonzalez de Requena D, Rodriguez-Albarino A, Gonzalez-Lahoz J et al. Analyzing sleep abnormalities in HIV-infected patients treated with Efavirenz. *Clin Infect Dis* 2004; 38(3):430-432
67. Gutierrez F, Navarro A, Padilla S, Anton R, Masia M, Borrás J et al. Prediction of neuropsychiatric adverse events associated with long-term efavirenz therapy, using plasma drug level monitoring. *Clin Infect Dis* 2005; 41(11):1648-1653
68. Drake JW. Rates of spontaneous mutation among RNA viruses. *Proc Natl Acad Sci USA* 1993; 90(9):4171-5
69. Drake JW, Charlesworth B, Charlesworth D, Crow JF. Rates of spontaneous mutation. *Genetics* 1998; 148(4):1667-86
70. Mansky LM, Temin HM. Lower in vivo mutation rate of human immunodeficiency virus type 1 than that predicted from the fidelity of purified reverse transcriptase. *J Virol* 1995; 69(8):5087-94
71. Ho DD, Neumann AU, Perelson AS, Chen W, Leonard JM, Markowitz M. Rapid turnover of plasma virions and CD4 lymphocytes in HIV-1 infection. *Nature* 1995; 373(6510):123-6
72. Wei X, Ghosh SK, Taylor ME, Johnson VA, Emini EA, Deutsch P et al. Viral dynamics in human immunodeficiency virus type 1 infection. *Nature* 1995; 373(6510):117-22
73. Coffin JM. HIV population dynamics in vivo: implications for genetic variation, pathogenesis, and therapy. *Science* 1995; 267(5197):483-9
74. Perelson AS, Neumann AU, Markowitz M, Leonard JM, Ho DD. HIV-1 dynamics in vivo: virion clearance rate, infected cell life-span, and viral generation time. *Science* 1996; 271(5255):1582-6
75. Schuurman R, Nijhuis M, van Leeuwen R, Schipper P, de Jong D, Collis P et al. Rapid changes in human immunodeficiency virus type 1 RNA load and appearance of drug-resistant virus populations in persons treated with lamivudine (3TC). *J Infect Dis* 1995; 171(6):1411-9
76. Molla A, Korneyeva M, Gao Q, Vasavanonda S, Schipper PJ, Mo HM et al. Ordered accumulation of mutations in HIV protease confers resistance to ritonavir. *Nat Med* 1996; 2(7):760-6
77. Johnson VA, Brun-Vezinet F, Clotet B, Kuritzkes DR, Pillay D, Schapiro JM et al. Update of drug resistance mutations in HIV-1: Fall 2006. *Top HIV Med* 2006; 14(3):125-130
78. Hirsch MS, Brun-Vezinet F, Clotet B, Conway B, Kuritzkes DR, D'Aquila RT et al. Antiretroviral drug resistance testing in adults infected with human immunodeficiency virus type 1: 2003 recommendations of an International AIDS Society-USA Panel. *Clin Infect Dis* 2003; 37(1):113-128
79. Devereux HL, Youle M, Johnson MA, Loveday C. Rapid decline in detectability of HIV-1 drug resistance mutations after stopping therapy. *AIDS* 1999; 13(18):123-7

80. Qari SH, Respass R, Weinstock H, Beltrami EM, Hertogs K, Larder BA et al. Comparative analysis of two commercial phenotypic assays for drug susceptibility testing of human immunodeficiency virus type 1. *J Clin Microbiol* 2002; 40(1):31-35
81. Larder BA, Kemp SD, Hertogs K. Quantitative prediction of HIV-1 phenotypic drug resistance from genotypes: the virtual phenotype (VirtualPhenotype). *Antivir Ther* 2000; 5(Suppl 3):49
82. Novak RM, Chen L, MacArthur RD, Baxter JD, Huppler HK, Peng G et al. Prevalence of antiretroviral drug resistance mutations in chronically HIV-infected, treatment-naive patients: implications for routine resistance screening before initiation of antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis* 2005; 40(3):468-474
83. Wensing AM, van de V, Angarano G, Asjo B, Balotta C, Boeri E et al. Prevalence of drug-resistant HIV-1 variants in untreated individuals in Europe: implications for clinical management. *J Infect Dis* 2005; 192(6):958-966
84. Cane P, Chrystie I, Dunn D, Evans B, Geretti AM, Green H et al. Time trends in primary resistance to HIV drugs in the United Kingdom: multicentre observational study. *BMJ* 2005; 331(7529):1368
85. de Mendoza C., Rodriguez C, Colomina J, Tuset C, Garcia F, Eiros JM et al. Resistance to nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitors and prevalence of HIV type 1 non-B subtypes are increasing among persons with recent infection in Spain. *Clin Infect Dis* 2005; 41(9):1350-1354
86. Palacios R, Viciano I, Pérez de Pedro I, De La TJ, Ropero F, Fernández S et al. Prevalencia de mutaciones de resistencia primaria en los nuevos diagnósticos de infección por el VIH en la provincia de Málaga. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2008; 26:141-145
87. Sánchez Oñoro M., Lopez MJ, Santana MA, Andes JM, Campelo FA. Resistencias primarias a los fármacos antirretrovirales en los pacientes diagnosticados de infección por el VIH en Gran Canaria entre los años 2002-2005. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2007; 25(7):437-440
88. Garcia F, Perez-Cachafeiro S, Guillot V, Alvarez M, Perez P, Perez-Elias MJ, et al. Transmisión de resistencias primarias y distribución de subtipos del VIH-1 en la cohorte española de pacientes naïve (CoRIS). 2º Congreso de Gesida, Madrid, 30 Noviembre-3 diciembre 2010. Abstract OR-11.
89. Sax PE, Islam R, Walensky RP, Losina E, Weinstein MC, Goldie SJ et al. Should resistance testing be performed for treatment-naive HIV-infected patients? A cost-effectiveness analysis. *Clin Infect Dis* 2005; 41(9):1316-1323
90. Hecht FM, Grant RM. Resistance testing in drug-naive HIV-infected patients: is it time? *Clin Infect Dis* 2005; 41(9):1324-1325
91. Mitsuya Y, Varghese V, Wang C, Liu TF, Holmes SP, Jayakumar P et al. Minority human immunodeficiency virus type 1 variants in antiretroviral-naive persons with reverse transcriptase codon 215 revertant mutations. *J Virol* 2008; 82(21):10747-10755
92. Balduin M, Oette M, Daumer MP, Hoffmann D, Pfister HJ, Kaiser R. Prevalence of minor variants of HIV strains at reverse transcriptase position 103 in therapy-naive patients and their impact on the virological failure. *J Clin Virol* 2009; 45(1):34-38
93. Geretti AM, Fox ZV, Booth CL, Smith CJ, Phillips AN, Johnson M et al. Low-frequency K103N strengthens the impact of transmitted drug resistance on virologic responses to first-line efavirenz or nevirapine-based highly active antiretroviral therapy. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 52(5):569-573
94. Simen BB, Simons JF, Hullsiek KH, Novak RM, MacArthur RD, Baxter JD et al. Low-abundance drug-resistant viral variants in chronically HIV-infected, antiretroviral treatment-naive patients significantly impact treatment outcomes. *J Infect Dis* 2009; 199(5):693-701
95. Metzner KJ, Giulieri SG, Knoepfel SA, Rauch P, Burgisser P, Yerly S et al. Minority quasispecies of drug-resistant HIV-1 that lead to early therapy failure in treatment-naive and -adherent patients. *Clin Infect Dis* 2009; 48(2):239-247
96. Coovadia A, Hunt G, Abrams EJ, Sherman G, Meyers T, Barry G et al. Persistent minority K103N mutations among women exposed to single-dose nevirapine and virologic response to nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitor-based therapy. *Clin Infect Dis* 2009; 48(4):462-472
97. Peuchant O, Thiebaut R, Capdepon S, Lavignolle-Aurillac V, Neau D, Morlat P et al. Transmission of HIV-1 minority-resistant variants and response to first-line antiretroviral therapy. *AIDS* 2008; 22(12):1417-1423
98. Johnson JA, Li JF, Wei X, Lipscomb J, Irlbeck D, Craig C et al. Minority HIV-1 drug resistance mutations are present in antiretroviral treatment-naive populations and associate with reduced treatment efficacy. *PLoS Med* 2008; 5(7):e158

99. Havlir DV, Marschner IC, Hirsch MS, Collier AC, Tebas P, Bassett RL et al. Maintenance antiretroviral therapies in HIV infected patients with undetectable plasma HIV RNA after triple-drug therapy. AIDS Clinical Trials Group Study 343 Team. *N Engl J Med* 1998; 339(18):1261-1268
100. Huisman MT, Smit JW, Schinkel AH. Significance of P-glycoprotein for the pharmacology and clinical use of HIV protease inhibitors. *AIDS* 2000; 14(3):237-42
101. Baxter JD, Mayers DL, Wentworth DN, Neaton JD, Hoover ML, Winters MA et al. A randomized study of antiretroviral management based on plasma genotypic antiretroviral resistance testing in patients failing therapy. CPCRA 046 Study Team for the Terry Beinr Community Programs for Clinical Research on AIDS. *AIDS* 2000; 14(9):83-93
102. Clevenbergh P, Durant J, Halfon P, del Giudice P, Mondain V, Montagne N et al. Persisting long-term benefit of genotype-guided treatment for HIV-infected patients failing HAART. The Viradap Study: week 48 follow-up. *Antivir Ther* 2000; 5(1):65-70
103. Tural C, Ruiz L, Holtzer C, Schapiro J, Viciano P, Gonzalez J et al. Clinical utility of HIV-1 genotyping and expert advice: the Havana trial. *AIDS* 2002; 16(2):209-218
104. Cohen CJ, Hunt S, Sension M, Farthing C, Conant M, Jacobson S et al. A randomized trial assessing the impact of phenotypic resistance testing on antiretroviral therapy. *AIDS* 2002; 16(4):579-88
105. Cingolani A, Antinori A, Rizzo MG, Murri R, Ammassari A, Baldini F et al. Usefulness of monitoring HIV drug resistance and adherence in individuals failing highly active antiretroviral therapy: a randomized study (ARGENTA). *AIDS* 2002; 16(3):369-79
106. Kemper CA, Witt MD, Keiser PH, Dube MP, Forthal DN, Leibowitz M et al. Sequencing of protease inhibitor therapy: insights from an analysis of HIV phenotypic resistance in patients failing protease inhibitors. *AIDS* 2001; 15(5):609-15
107. Meynard JL, Vray M, Morand-Joubert L, Race E, Descamps D, Peytavin G et al. Phenotypic or genotypic resistance testing for choosing antiretroviral therapy after treatment failure: a randomized trial. *AIDS* 2002; 16(5):727-36
108. Mazzotta F, Lo CS, Torti C, Tinelli C, Pierotti P, Castelli F et al. Real versus virtual phenotype to guide treatment in heavily pretreated patients: 48-week follow-up of the Genotipo-Fenotipo di Resistenza (GenPheRex) trial. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2003; 32(3):268-280
109. Perez-Elias MJ, Garcia-Arota I, Munoz V, Santos I, Sanz J, Abaira V et al. Phenotype or virtual phenotype for choosing antiretroviral therapy after failure: a prospective, randomized study. *Antivir Ther* 2003; 8(6):577-584
110. Torre D, Tambini R. Antiretroviral drug resistance testing in patients with HIV-1 infection: A meta-analysis study. *HIV Clin Trials* 2002; 3(1):1-8
111. Hughes CA, Foisy MM, Dewhurst N, Higgins N, Robinson L, Kelly DV et al. Abacavir hypersensitivity reaction: an update. *Ann Pharmacother* 2008; 42(3):387-396
112. Mallal S, Phillips E, Carosi G, Molina JM, Workman C, Tomazic J et al. HLA-B*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. *N Engl J Med* 2008; 358(6):568-579
113. Saag M, Balu R, Phillips E, Brachman P, Martorell C, Burman W et al. High sensitivity of human leukocyte antigen-B*5701 as a marker for immunologically confirmed abacavir hypersensitivity in white and black patients. *Clin Infect Dis* 2008; 46(7):1111-1118
114. Moore JP, Kitchen SG, Pugach P, Zack JA. The CCR5 and CXCR4 coreceptors--central to understanding the transmission and pathogenesis of human immunodeficiency virus type 1 infection. *AIDS Res Hum Retroviruses* 2004; 20(1):111-126
115. Connor RI, Sheridan KE, Ceradini D, Choe S, Landau NR. Change in coreceptor use coreceptor use correlates with disease progression in HIV-1--infected individuals. *J Exp Med* 1997; 185(4):621-628
116. Hunt PW, Harrigan PR, Huang W, Bates M, Williamson DW, McCune JM et al. Prevalence of CXCR4 tropism among antiretroviral-treated HIV-1-infected patients with detectable viremia. *J Infect Dis* 2006; 194(7):926-930
117. Wilkin TJ, Su Z, Kuritzkes DR, Hughes M, Flexner C, Gross R et al. HIV type 1 chemokine coreceptor use among antiretroviral-experienced patients screened for a clinical trial of a CCR5 inhibitor: AIDS Clinical Trial Group A5211. *Clin Infect Dis* 2007; 44(4):591-595
118. Whitcomb JM, Huang W, Fransen S, Limoli K, Toma J, Wrin T et al. Development and characterization of a novel single-cycle recombinant-virus assay to determine human immunodeficiency virus type 1 coreceptor tropism. *Antimicrob Agents Chemother* 2007; 51(2):566-575

119. Low AJ, Dong W, Chan D, Sing T, Swanstrom R, Jensen M et al. Current V3 genotyping algorithms are inadequate for predicting X4 co-receptor usage in clinical isolates. *AIDS* 2007; 21(14):F17-F24
120. Chueca N, Garrido C, Alvarez M, Poveda E, de Dios LJ, Zahonero N et al. Improvement in the determination of HIV-1 tropism using the V3 gene sequence and a combination of bioinformatic tools. *J Med Virol* 2009; 81(5):763-767
121. Poveda E, Seclen E, Gonzalez MM, Garcia F, Chueca N, Aguilera A et al. Design and validation of new genotypic tools for easy and reliable estimation of HIV tropism before using CCR5 antagonists. *J Antimicrob Chemother* 2009; 63(5):1006-1010
122. Seclen E, Garrido C, Gonzalez MM, Gonzalez-Lahoz J, de MC, Soriano V et al. High sensitivity of specific genotypic tools for detection of X4 variants in antiretroviral-experienced patients suitable to be treated with CCR5 antagonists. *J Antimicrob Chemother* 2010; 65(7):1486-1492
123. McGovern RA, Thielen A, Mo T, Dong W, Woods CK, Chapman D et al. Population-based V3 genotypic tropism assay: a retrospective analysis using screening samples from the A4001029 and MOTIVATE studies. *AIDS* 2010; 24(16):2517-2525
124. McGovern R, Dong W, Zhong X, Knapp D, Thielen A, Chapman D, et al. Population-based sequencing of the V3-loop is comparable to the enhanced sensitivity profile assay in predicting virologic response to maraviroc of treatment-naive patients in the MERIT trial. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 92.
125. Poveda E, Alcami J, Paredes R, Cordoba J, Gutierrez F, Llibre JM et al. Genotypic determination of HIV tropism - clinical and methodological recommendations to guide the therapeutic use of CCR5 antagonists. *AIDS Rev* 2010; 12(3):135-148
126. Stekler J, Collier A. Treatment of primary HIV. *Curr Infect Dis Rep* 2002; 4(1):81-87
127. Pilcher CD, Eron JJ, Jr., Galvin S, Gay C, Cohen MS. Acute HIV revisited: new opportunities for treatment and prevention. *J Clin Invest* 2004; 113(7):937-945
128. Kassutto S, Rosenberg E. Primary HIV Type 1 Infection. *Clin Infect Dis* 2004; 38:1452-1458
129. Weintrob AC, Giner J, Menezes P, Patrick E, Benjamin DK, Jr., Lennox J et al. Infrequent diagnosis of primary human immunodeficiency virus infection: missed opportunities in acute care settings. *Arch Intern Med* 2003; 163(17):2097-2100
130. Miro JM, Sued O, Plana M, Pumarola T, Gallart T. Avances en el diagnóstico y tratamiento de la infección aguda por el VIH-1. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2004; 22(10):643-659
131. Lindback S, Thorstensson R, Karlsson AC, von Sydow M, Flamholz L, Blaxhult A et al. Diagnosis of primary HIV-1 infection and duration of follow-up after HIV exposure. Karolinska Institute Primary HIV Infection Study Group. *AIDS* 2000; 14(15):2333-9
132. Daar ES, Little S, Pitt J, Santangelo J, Ho P, Harawa N et al. Diagnosis of primary HIV-1 infection. Los Angeles County Primary HIV Infection Recruitment Network. *Ann Intern Med* 2001; 134(1):25-9
133. Lavreys L, Baeten JM, Chohan V, McClelland RS, Hassan WM, Richardson BA et al. Higher set point plasma viral load and more-severe acute HIV type 1 (HIV-1) illness predict mortality among high-risk HIV-1-infected African women. *Clin Infect Dis* 2006; 42(9):1333-1339
134. Goujard C, Bonarek M, Meyer L, Bonnet F, Chaix ML, Deveau C et al. CD4 cell count and HIV DNA level are independent predictors of disease progression after primary HIV type 1 infection in untreated patients. *Clin Infect Dis* 2006; 42(5):709-715
135. Fidler S, Fox J, Porter K, Weber J. Primary HIV infection: to treat or not to treat? *Curr Opin Infect Dis* 2008; 21(1):4-10
136. Rieder P, Joos B, von W, V, Kuster H, Grube C, Leemann C et al. HIV-1 transmission after cessation of early antiretroviral therapy among men having sex with men. *AIDS* 2010; 24(8):1177-1183
137. Altfield M, Rosenberg ES, Shankarappa R, Mukherjee JS, Hecht FM, Eldridge RL et al. Cellular immune responses and viral diversity in individuals treated during acute and early HIV-1 infection. *J Exp Med* 2001; 193(2):169-80
138. Cohen DE, Walker BD. Human immunodeficiency virus pathogenesis and prospects for immune control in patients with established infection. *Clin Infect Dis* 2001; 32(12):1756-68
139. Oxenius A, Yerly S, Ramirez E, Phillips RE, Price DA, Perrin L. Distribution of functional HIV-specific CD8 T lymphocytes between blood and secondary lymphoid organs after 8-18 months of antiretroviral therapy in acutely infected patients. *AIDS* 2001; 15(13):1653-6

140. Oxenius A, Fidler S, Brady M, Dawson SJ, Ruth K, Easterbrook PJ et al. Variable fate of virus-specific CD4(+) T cells during primary HIV-1 infection. *Eur J Immunol* 2001; 31(12):3782-8
141. Rosenberg ES, Altfeld M, Poon SH, Phillips MN, Wilkes BM, Eldridge RL et al. Immune control of HIV-1 after early treatment of acute infection. *Nature* 2000; 407(6803):523-6
142. Mehandru S, Poles MA, Tenner-Racz K, Jean-Pierre P, Manuelli V, Lopez P et al. Lack of mucosal immune reconstitution during prolonged treatment of acute and early HIV-1 infection. *PLoS One* 2006; 3(12):e484
143. Smith DE, Walker BD, Cooper DA, Rosenberg ES, Kaldor JM. Is antiretroviral treatment of primary HIV infection clinically justified on the basis of current evidence? *AIDS* 2004; 18(5):709-718
144. Kinloch-de LS. Treatment of acute HIV-1 infection: is it coming of age? *J Infect Dis* 2006; 194(6):721-724
145. Voirin N, Routy JP, Smith D, Baratin D, Trepo C, Cotte L et al. Effect of early initiation of highly active antiretroviral therapy on CD4 cell count and HIV-RNA viral load trends within 24 months of the onset of acute retroviral syndrome. *HIV Med* 2008; 9(6):440-444
146. Kassutto S, Maghsoudi K, Johnston MN, Robbins GK, Burgett NC, Sax PE et al. Longitudinal analysis of clinical markers following antiretroviral therapy initiated during acute or early HIV type 1 infection. *Clin Infect Dis* 2006; 42(7):1024-1031
147. Sued O, Miro JM, Alquezar A, Claramonte X, Garcia F, Plana M et al. Primary human immunodeficiency virus type 1 infection: clinical, virological and immunological characteristics of 75 patients (1997-2003). *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2006; 24(4):238-244
148. Fidler S, Oxenius A, Brady M, Clarke J, Cropley I, Babiker A et al. Virological and immunological effects of short course antiretroviral therapy in primary HIV infection. *AIDS* 2002; 16:2049-2054
149. Fidler S, Fraser C, Fox J, Tamm N, Griffin JT, Weber J. Comparative potency of three antiretroviral therapy regimes in primary HIV infection. *AIDS* 2006; 20(2):247-252
150. Apuzzo LG, Vaida F, Gallant JE, Ernstrom KB, Little SJ, Routy JP et al. Tolerability and efficacy of PI versus NNRTI-based regimens in subjects receiving HAART during acute or early HIV infection. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 50(3):267-275
151. Markowitz M, Mohri H, Mehandru S, Shet A, Berry L, Kalyanaraman R et al. Infection with multidrug resistant, dual-tropic HIV-1 and rapid progression to AIDS: a case report. *Lancet* 2005; 365(9464):1031-1038
152. Gottlieb GS, Nickle DC, Jensen MA, Wong KG, Grobler J, Li F et al. Dual HIV-1 infection associated with rapid disease progression. *Lancet* 2004; 363(9409):619-622
153. Dalmau J, Puertas MC, Azuara M, Marino A, Frahm N, Mothe B et al. Contribution of immunological and virological factors to extremely severe primary HIV type 1 infection. *Clin Infect Dis* 2009; 48(2):229-238
154. Chaix ML, Descamps D, Wirden M, Bocket L, Delaugerre C, Tamalet C et al. Stable frequency of HIV-1 transmitted drug resistance in patients at the time of primary infection over 1996-2006 in France. *AIDS* 2009; 23(6):717-724
155. Goujard C, Boufassa F, Deveau C, Laskri D, Meyer L. Incidence of clinical lipodystrophy in HIV-infected patients treated during primary infection. *AIDS* 2001; 15(2):282-4
156. Miller J, Carr A, Smith D, Emery S, Law MG, Grey P et al. Lipodystrophy following antiretroviral therapy of primary HIV infection. *AIDS* 2000; 14(15):2406-7
157. Narciso P, Tozzi V, D'Offizi G, De Carli G, Orchi N, Galati V et al. Metabolic and morphologic disorders in patients treated with highly active antiretroviral therapy since primary HIV infection. *Ann N Y Acad Sci* 2001; 946:214-22
158. Streeck H, Jessen H, Alter G, Teigen N, Waring MT, Jessen A et al. Immunological and virological impact of highly active antiretroviral therapy initiated during acute HIV-1 infection. *J Infect Dis* 2006; 194(6):734-739
159. Markowitz M, Jin X, Hurley A, Simon V, Ramratnam B, Louie M et al. Discontinuation of antiretroviral therapy commenced early during the course of human immunodeficiency virus type 1 infection, with or without adjunctive vaccination. *J Infect Dis* 2002; 186(5):634-643
160. Desquilbet L, Goujard C, Rouzioux C, Sinet M, Deveau C, Chaix ML et al. Does transient HAART during primary HIV-1 infection lower the virological set-point? *AIDS* 2004; 18(18):2361-2369
161. Hecht FM, Wang L, Collier A, Little S, Markowitz M, Margolick J et al. A multicenter observational study of the potential benefits of initiating combination antiretroviral therapy during acute HIV infection. *J Infect Dis* 2006; 194(6):725-733

162. Steingrover R, Bezemer D, Fernandez Garcia E, Kroon F, de Wolf F, Prins M, Lange J, Prins J. Early treatment of primary HIV-1 infection lowers the viral set point. 14th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Los Angeles, February 25-28 2007. Abstract 124LB.
163. Koegl C, Wolf E, Jessen H, Schewe K, Rausch M, Goelz J, Goetzenic A, Knechten H, Jaeger H, et al. No Benefit from Early Treatment in Primary HIV-Infection? 14th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Los Angeles, February 25-28 2007. Abstract 125LB.
164. Seng R, Goujard C, Desquilbet L, Sinet M, Deveau C, Boufassa F, et al. CD4 T-cell Count Increase during HAART Initiated in Primary Infection In Transient after-Long term HAART Interruption. 14th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Los Angeles, February 25-28 2007. Abstract 347.
165. Lampe FC, Porter K, Kaldor J, Law M, Kinloch-de LS, Phillips AN. Effect of transient antiretroviral treatment during acute HIV infection: comparison of the Quest trial results with CASCADE natural history study. *Antivir Ther* 2007; 12(2):189-193
166. Stekler J, Holte S, Maenza J, Stevens C, Collier A. Clinical outcomes of ART initiated during primary HIV infection. 14th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Los Angeles, February 25-28 2007. Abstract 346.
167. Prazuck T, Lafeuillade A, Hocqueloux L, Viard JP, Avettand V, Rouzoux C. Can HAART Initiation at Early Acute HIV Infection Benefit the Immune-virology Outcome Despite Subsequent Treatment Cessation? The ANRS Reservoirs Study Group. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 695.
168. Desquilbet L, Hoen B, Goujard C, Deveau C, Warszawski J, Meyer L, et al. Early Short-course HAART Initiated at the Time of Primary HIV Infection Provides No Sustained Benefit in Terms of Time to CD4 Decline below 350/mm³: Results of a Propensity Analysis within the ANRS PRIMO Cohort. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 694.
169. Fox J, Scriba TJ, Robinson N, Weber JN, Phillips RE, Fidler S. Human immunodeficiency virus (HIV)-specific T helper responses fail to predict CD4+ T cell decline following short-course treatment at primary HIV-1 infection. *Clin Exp Immunol* 2008; 152(3):532-537
170. Pantazis N, Touloumi G, Vanhems P, Gill J, Bucher HC, Porter K. The effect of antiretroviral treatment of different durations in primary HIV infection. *AIDS* 2008; 22(18):2441-2450
171. Kaufmann DE, Lichterfeld M, Altfeld M, Addo MM, Johnston MN, Lee PK et al. Limited durability of viral control following treated acute HIV infection. *PLoS Med* 2004; 1(2):e36
172. Miro JM, Plana M, Garcia F, Ortiz GM, Maleno MJ, Arnedo M, et al. Structured Treatment Interruptions in Patients Receiving HAART within 90 days after onset of Primary HIV-1 Infection Symptoms: Spontaneous Control of Viremia in only one Third of Cases after Four Cycles Off Therapy. 14th International AIDS Conference, Barcelona, July 7-12 2002. Abstract ThOrB1437.
173. Tremblay CL, Hicks JL, Sutton L, Giguel F, Flynn T, Johnston M et al. Antiretroviral resistance associated with supervised treatment interruptions in treated acute HIV infection. *AIDS* 2003; 17:1086-1089
174. Hoen B, Fournier I, Lacabaratz C, Burgard M, Charreau I, Chaix ML et al. Structured treatment interruptions in primary HIV-1 infection: the ANRS 100 PRIMSTOP trial. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2005; 40(3):307-316
175. Emilie D, Burgard M, Lascoux Combre C, Lauglin M, Krzyiek R, Pignosn C et al. Early control of HIV replication in primary HIV-Infection treated with antiretroviral drugs and pegylated IFN alpha: results from the Primoferon A (ANRS 086) Study. *AIDS* 2001; 15(1435):1437
176. Dybul M, Hidalgo B, Chun TW, Belson M, Migueles SA, Justement JS et al. Pilot study of the effects of intermittent interleukin-2 on human immunodeficiency virus specific responses in patients treated during recently acquired HIV infection. *J Infect Dis* 2002; 185:61-68
177. Miro JM, Plana M, Garcia F, Ortiz GM, Maleno MJ, Sued O, et al. Low-dose daily IL-2 combined with structured treatment interruptions did not increase the HIV-1-specific T-cell responses in patients receiving HAART with 90 days after onset primary HIV-1 infection symptoms. 15th International AIDS Conference, Bangkok, July 11-16 2004. Abstract WePeB5690.
178. Adalid-Peralta L, Godot V, Colin C, Krzysiek R, Tran T, Pognard P et al. Stimulation of the primary anti-HIV antibody response by IFN-alpha in patients with acute HIV-1 infection. *J Leukoc Biol* 2008; 83(4):1060-1067
179. Ravot E, Tambussi G, Jessen H, Tinelli C, Lazzarin A, Lisziexic J et al. Effects of hidroxiurea on T cell count changes during primary HIV infection. *AIDS* 2000; 14:619-622

180. Rizzardì GP, Harari A, Capiluppi B, Tambussi G, Ellfsen K, Ciuffreda D et al. Treatment of primary HIV-1 infection with ciclosporin A coupled with HAART. *J Clin Invest* 2002; 109:681-688
181. Markowitz M, Vaida F, Little S, Hare C, Balfour H, Ferguson E, et al. An Open-label Randomized Trial to Determine the Virologic and Immunologic Effects of 4-Weeks of Cyclosporine A Given in Combination with ART during Acute and Early Infection. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 698c.
182. Miro JM, Lopez-Dieguez M, Plana M, Pumarola T, Brunet M, Tuset M, Muñoz-Fernandez MA, Gatell JM, Gallanr J. Randomized clinical trial with immune-based therapy in patients with primary HIV-1 infection. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 531.
183. Shiver JW, Fu TM, Chen L, Casimiro DR, Davies ME, Evans RK et al. Replication-incompetent adenoviral vaccine vector elicits effective anti-immunodeficiency-virus immunity. *Nature* 2002; 415(6869):331-335
184. Lu W, Wu X, Lu Y, Guo W, Andrieu JM. Therapeutic dendritic-cell vaccine for simian AIDS. *Nat Med* 2003; 9(1):27-32
185. Kinloch-de LS, Hoen B, Smith DE, Autran B, Lampe FC, Phillips AN et al. Impact of therapeutic immunization on HIV-1 viremia after discontinuation of antiretroviral therapy initiated during acute infection. *J Infect Dis* 2005; 192(4):607-617
186. Emery S, Workman C, Puls RL, Bloch M, Baker D, Bodsworth N et al. Randomized, placebo-controlled, phase I/IIa evaluation of the safety and immunogenicity of fowlpox virus expressing HIV gag-pol and interferon-gamma in HIV-1 infected subjects. *Hum Vaccin* 2005; 1(6):232-238
187. Rosenberg ES, Graham BS, Chan ES, Bosch RJ, Stocker V, Maenza J et al. Safety and immunogenicity of therapeutic DNA vaccination in individuals treated with antiretroviral therapy during acute/early HIV-1 infection. *PLoS One* 2010; 5(5):e10555
188. Paul S, Gilbert HM, Ziecheck W, Jacobs J, Sepkowitz KA. The impact of potent antiretroviral therapy on the characteristics of hospitalized patients with HIV infection. *AIDS* 1999; 13(3):415-8
189. Lampe FC, Gatell JM, Staszewski S, Johnson MA, Pradier C, Gill MJ et al. Changes over time in risk of initial virological failure of combination antiretroviral therapy: a multicohort analysis, 1996 to 2002. *Arch Intern Med* 2006; 166(5):521-528
190. Lohse N, Hansen AB, Pedersen G, Kronborg G, Gerstoft J, Sorensen HT et al. Survival of persons with and without HIV infection in Denmark, 1995-2005. *Ann Intern Med* 2007; 146(2):87-95
191. Life expectancy of individuals on combination antiretroviral therapy in high-income countries: a collaborative analysis of 14 cohort studies. *Lancet* 2008; 372(9635):293-299
192. Lewden C, Chene G, Morlat P, Raffi F, Dupon M, Dellamonica P et al. HIV-infected adults with a CD4 cell count greater than 500 cells/mm³ on long-term combination antiretroviral therapy reach same mortality rates as the general population. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 46(1):72-77
193. Marschner IC, Collier AC, Coombs RW, D'Aquila RT, DeGruttola V, Fischl MA et al. Use of changes in plasma levels of human immunodeficiency virus type 1 RNA to assess the clinical benefit of antiretroviral therapy. *J Infect Dis* 1998; 177(1):40-7
194. Mellors JW, Munoz A, Giorgi JV, Margolick JB, Tassoni CJ, Gupta P et al. Plasma viral load and CD4+ lymphocytes as prognostic markers of HIV-1 infection. *Ann Intern Med* 1997; 126(12):946-54
195. The SMART Study Group. Major Clinical Outcomes in Antiretroviral Therapy (ART)-Naive Participants and in Those Not Receiving ART at Baseline in the SMART Study. *J Infect Dis* 2008; 197(8):1133-1144
196. Kitahata MM, Gange SJ, Abraham AG, Merriman B, Saag MS, Justice AC et al. Effect of early versus deferred antiretroviral therapy for HIV on survival. *N Engl J Med* 2009; 360(18):1815-1826
197. Severe P, Juste MA, Ambroise A, Eliacin L, Marchand C, Apollon S et al. Early versus standard antiretroviral therapy for HIV-infected adults in Haiti. *N Engl J Med* 2010; 363(3):257-265
198. Baker JV, Peng G, Rapkin J, Abrams DI, Silverberg MJ, MacArthur RD et al. CD4+ count and risk of non-AIDS diseases following initial treatment for HIV infection. *AIDS* 2008; 22(7):841-848
199. Monforte A, Abrams D, Pradier C, Weber R, Reiss P, Bonnet F et al. HIV-induced immunodeficiency and mortality from AIDS-defining and non-AIDS-defining malignancies. *AIDS* 2008; 22(16):2143-2153
200. Marin B, Thiebaut R, Bucher HC, Rondeau V, Costagliola D, Dorrucchi M et al. Non-AIDS-defining deaths and immunodeficiency in the era of combination antiretroviral therapy. *AIDS* 2009; 23(13):1743-1753
201. El-Sadr WM, Lundgren JD, Neaton JD, Gordin F, Abrams D, Arduino RC et al. CD4+ count-guided interruption of antiretroviral treatment. *N Engl J Med* 2006; 355(22):2283-2296

202. Bhaskaran K, Hamouda O, Sannes M, Boufassa F, Johnson AM, Lambert PC et al. Changes in the risk of death after HIV seroconversion compared with mortality in the general population. *JAMA* 2008; 300(1):51-59
203. May M, Sterne JA, Sabin C, Costagliola D, Justice AC, Thiebaut R et al. Prognosis of HIV-1-infected patients up to 5 years after initiation of HAART: collaborative analysis of prospective studies. *AIDS* 2007; 21(9):1185-1197
204. Brañas F, Berenguer J, Sanchez-Conde M, Lopez-Bernaldo de Quiros JC, Miralles P, Cosin J et al. The eldest of older adults living with HIV: response and adherence to highly active antiretroviral therapy. *Am J Med* 2008; 121(9):820-824
205. Moore DM, Hogg RS, Yip B, Craib K, Wood E, Montaner JS. CD4 percentage is an independent predictor of survival in patients starting antiretroviral therapy with absolute CD4 cell counts between 200 and 350 cells/microL. *HIV Med* 2006; 7(6):383-388
206. Gras L, Kesselring AM, Griffin JT, van Sighem AI, Fraser C, Ghani AC et al. CD4 cell counts of 800 cells/mm³ or greater after 7 years of highly active antiretroviral therapy are feasible in most patients starting with 350 cells/mm³ or greater. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 45(2):183-192
207. Mocroft A, Phillips AN, Gatell J, Ledergerber B, Fisher M, Clumeck N et al. Normalisation of CD4 counts in patients with HIV-1 infection and maximum virological suppression who are taking combination antiretroviral therapy: an observational cohort study. *Lancet* 2007; 370(9585):407-413
208. Lichtenstein KA, Armon C, Buchacz K, Chmiel JS, Moorman AC, Wood KC et al. Initiation of antiretroviral therapy at CD4 cell counts \geq 350 cells/mm³ does not increase incidence or risk of peripheral neuropathy, anemia, or renal insufficiency. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2008; 47(1):27-35
209. Attia S, Egger M, Muller M, Zwahlen M, Low N. Sexual transmission of HIV according to viral load and antiretroviral therapy: systematic review and meta-analysis. *AIDS* 2009; 23(11):1397-1404
210. Bartlett JA, Fath MJ, DeMasi R, Hermes A, Quinn J, Mondou E et al. An updated systematic overview of triple combination therapy in antiretroviral-naive HIV-infected adults. *AIDS* 2006; 20(16):2051-2064
211. Gatell JM, Clotet B, Mallolas J, Podzamczar D, Miró JM. Guía Practica del SIDA. Clínica, diagnóstico y tratamiento. Barcelona: Antares; 2010.
212. Coffey S. HIV InSite Knowledge Base. Antiretroviral drug profiles. Disponible en: <http://hivinsite.ucsf.edu/InSite?page=ar-drugs> (Acceso 14.12.2010).
213. Gallant JE, Staszewski S, Pozniak AL, DeJesus E, Suleiman JM, Miller MD et al. Efficacy and safety of tenofovir DF vs stavudine in combination therapy in antiretroviral-naive patients: a 3-year randomized trial. *JAMA* 2004; 292(2):191-201
214. Gallant JE, DeJesus E, Arribas JR, Pozniak AL, Gazzard B, Campo RE et al. Tenofovir DF, emtricitabine, and efavirenz vs. zidovudine, lamivudine, and efavirenz for HIV. *N Engl J Med* 2006; 354(3):251-260
215. Margot NA, Enejosa J, Cheng AK, Miller MD, McColl DJ. Development of HIV-1 drug resistance through 144 weeks in antiretroviral-naive subjects on emtricitabine, tenofovir disoproxil fumarate, and efavirenz compared with lamivudine/zidovudine and efavirenz in study GS-01-934. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 52(2):209-221
216. Arribas JR, Pozniak AL, Gallant JE, DeJesus E, Gazzard B, Campo RE et al. Tenofovir disoproxil fumarate, emtricitabine, and efavirenz compared with zidovudine/lamivudine and efavirenz in treatment-naive patients: 144-week analysis. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2008; 47(1):74-78
217. DeJesus E, Herrera G, Teofilo E, Gerstoft J, Buendia CB, Brand JD et al. Abacavir versus zidovudine combined with lamivudine and efavirenz, for the treatment of antiretroviral-naive HIV-infected adults. *Clin Infect Dis* 2004; 39(7):1038-1046
218. Moyle GJ, DeJesus E, Cahn P, Castillo SA, Zhao H, Gordon DN et al. Abacavir once or twice daily combined with once-daily lamivudine and efavirenz for the treatment of antiretroviral-naive HIV-infected adults: results of the Ziagen Once Daily in Antiretroviral Combination Study. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2005; 38(4):417-425
219. Podzamczar D, Ferrer E, Sanchez P, Gatell JM, Crespo M, Fisac C et al. Less lipodystrophy and better lipid profile with abacavir as compared to stavudine: 96-week results of a randomized study. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 44(2):139-147
220. Saag MS, Cahn P, Raffi F, Wolff M, Pearce D, Molina JM et al. Efficacy and safety of emtricitabine vs stavudine in combination therapy in antiretroviral-naive patients: a randomized trial. *JAMA* 2004; 292(2):180-189

221. Berenguer J, Gonzalez J, Ribera E, Domingo P, Santos J, Miralles P et al. Didanosine, lamivudine, and efavirenz versus zidovudine, lamivudine, and efavirenz for the initial treatment of HIV type 1 infection: final analysis (48 weeks) of a prospective, randomized, noninferiority clinical trial, GESIDA 3903. *Clin Infect Dis* 2008; 47(8):1083-1092
222. Robbins GK, De Gruttola V, Shafer RW, Smeaton LM, Snyder SW, Pettinelli C et al. Comparison of sequential three-drug regimens as initial therapy for HIV-1 infection. *N Engl J Med* 2003; 349:2293-2303
223. Shafer RW, Smeaton MS, Robbins GK, De Gruttola V, Snyder SW, D' Aquila RT et al. Comparison of four-drug regimens and pairs of sequential three-drugs regimens as initial therapy for HIV-1 infection. *N Engl J Med* 2003; 349:2304-2315
224. Campbell T, Smeaton L, De Gruttola V, (for ACTG A5175 study group). PEARLS (ACTG A5175): a multinational study of didanosine-EC, emtricitabine and atazanavir vs. co-formulated zidovudine/lamivudine and efavirenz for initial treatment of HIV-1 infection. 17th International AIDS Conference, Mexico DF, 3-8 August 2008. Abstract THAB0404.
225. Smith KY, Patel P, Fine D, Bellos N, Sloan L, Lackey P et al. Randomized, double-blind, placebo-matched, multicenter trial of abacavir/lamivudine or tenofovir/emtricitabine with lopinavir/ritonavir for initial HIV treatment. *AIDS* 2009; 23(12):1547-1556
226. Sax PE, Tierney C, Collier AC, Fischl MA, Mollan K, Peeples L et al. Abacavir-lamivudine versus tenofovir-emtricitabine for initial HIV-1 therapy. *N Engl J Med* 2009; 361(23):2230-2240
227. Daar E, Tierney C, Fischl MA, Collier A, Mollan K, Budhathoki C, et al. ACTG 5202: Final results of ABC/3TC or TDF/FTC with either EFV or ATV/r in treatment-naive HIV-infected patients. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 59LB.
228. Hill A, Sawyer W. Effects of nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbone on the efficacy of first-line boosted highly active antiretroviral therapy based on protease inhibitors: meta-regression analysis of 12 clinical trials in 5168 patients. *HIV Med* 2009; 10(9):527-535
229. Post FA, Moyle GJ, Stellbrink HJ, Domingo P, Podzamczar D, Fisher M et al. Randomized comparison of renal effects, efficacy, and safety with once-daily abacavir/lamivudine versus tenofovir/emtricitabine, administered with efavirenz, in antiretroviral-naive, HIV-1-infected adults: 48-week results from the ASSERT study. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2010; 55(1):49-57
230. Sabin CA, Worm SW, Weber R, Reiss P, El-Sadr W, Dabis F et al. Use of nucleoside reverse transcriptase inhibitors and risk of myocardial infarction in HIV-infected patients enrolled in the D:A:D study: a multi-cohort collaboration. *Lancet* 2008; 371(9622):1417-1426
231. The SMART-INSIGHT and the D:A:D Study Groups. Use of nucleoside reverse transcriptase inhibitors and risk of myocardial infarction in HIV-infected patients. *AIDS* 2008; 22(14):F17-F24
232. Brothers CH, Hernandez JE, Cutrell AG, Curtis L, it-Khaled M, Bowlin SJ et al. Risk of myocardial infarction and abacavir therapy: no increased risk across 52 GlaxoSmithKline-sponsored clinical trials in adult subjects. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 51(1):20-28
233. Eron J, Jr., Yeni P, Gathe J, Jr., Estrada V, DeJesus E, Staszewski S et al. The KLEAN study of fosamprenavir-ritonavir versus lopinavir-ritonavir, each in combination with abacavir-lamivudine, for initial treatment of HIV infection over 48 weeks: a randomised non-inferiority trial. *Lancet* 2006; 368(9534):476-482
234. Hicks CB, DeJesus E, Sloan LM, Sension MG, Wohl DA, Liao Q et al. Comparison of once-daily fosamprenavir boosted with either 100 or 200 mg of ritonavir, in combination with abacavir/lamivudine: 96-week results from COL100758. *AIDS Res Hum Retroviruses* 2009; 25(4):395-403
235. Elion R, DeJesus E, Sension M, Berger D, Towner W, Richmond G et al. Once-daily abacavir/lamivudine and ritonavir-boosted atazanavir for the treatment of HIV-1 infection in antiretroviral-naive patients: a 48-week pilot study. *HIV Clin Trials* 2008; 9(3):152-163
236. Leon A, Martinez E, Mallolas J, Laguno M, Blanco JL, Pumarola T et al. Early virological failure in treatment-naive HIV-infected adults receiving didanosine and tenofovir plus efavirenz or nevirapine. *AIDS* 2005; 19(2):213-215
237. Negro E, Bonjoch A, Paredes R, Puig J, Clotet B. Compromised immunologic recovery in treatment-experienced patients with HIV infection receiving both tenofovir disoproxil fumarate and didanosine in the TORO studies. *Clin Infect Dis* 2005; 41(6):901-905

238. Martinez E, Milinkovic A, de Lazzari E, Ravasi G, Blanco JL, Larrousse M et al. Pancreatic toxic effects associated with the co-administration of didanosine and tenofovir in HIV-infected adults. *Lancet* 2004; 364:65-67
239. Podzamczar D, Ferrer E, Gatell JM, Niubo J, Dalmau D, Leon A et al. Early virological failure with a combination of tenofovir, didanosine and efavirenz. *Antivir Ther* 2005; 10(1):171-177
240. Perez-Elias MJ, Moreno S, Gutierrez C, Lopez D, Abaira V, Moreno A et al. High virological failure rate in HIV patients after switching to a regimen with two nucleoside reverse transcriptase inhibitors plus tenofovir. *AIDS* 2005; 19(7):695-698
241. Gulick RM, Ribaldo HJ, Shikuma CM, Lustgarten S, Squires KE, Meyer III WA et al. Triple-Nucleoside Regimens versus Efavirenz-Containing Regimens for the Initial Treatment of HIV-1 Infection. *N Engl J Med* 2004; 350:1850-1861
242. Gulick RM, Ribaldo HJ, Shikuma CM, Lalama C, Schackman BR, Meyer WA, III et al. Three- vs four-drug antiretroviral regimens for the initial treatment of HIV-1 infection: a randomized controlled trial. *JAMA* 2006; 296(7):769-781
243. Staszewski S, Keiser P, Montaner J, Raffi F, Gathe J, Brotas V et al. Abacavir-lamivudine-zidovudine vs indinavir-lamivudine-zidovudine in antiretroviral-naive HIV-infected adults: A randomized equivalence trial. *JAMA* 2001; 285(9):1155-63
244. Bartlett JA, Johnson J, Herrera G, Sosa N, Rodriguez A, Liao Q et al. Long-term results of initial therapy with abacavir and Lamivudine combined with Efavirenz, Amprenavir/Ritonavir, or Stavudine. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2006; 43(3):284-292
245. Gallant JE, Rodriguez AE, Weinberg WG, Young B, Berger DS, Lim ML et al. Early virologic nonresponse to tenofovir, abacavir, and lamivudine in HIV-infected antiretroviral-naive subjects. *J Infect Dis* 2005; 192(11):1921-1930
246. Gerstoft J, Kirk O, Obel N, Pedersen C, Mathiesen L, Nielsen H. Low efficacy and high frequency of adverse events in a randomized trial of the triple NRTI regimen abacavir, stavudine and didanosine. *AIDS* 2003; 17:2045-2052
247. Ferrer E, Gatell JM, Sanchez P, Domingo P, Puig T, Niubo J et al. Zidovudine/lamivudine/abacavir plus tenofovir in HIV-infected naive patients: a 96-week prospective one-arm pilot study. *AIDS Res Hum Retroviruses* 2008; 24(7):931-934
248. Moyle G, Higgs C, Teague A, Mandalia S, Nelson M, Johnson M et al. An open-label, randomized comparative pilot study of a single-class quadruple therapy regimen versus a 2-class triple therapy regimen for individuals initiating antiretroviral therapy. *Antivir Ther* 2006; 11(1):73-78
249. Podzamczar D, Ferrer E, Consiglio E, Gatell JM, Perez P, Perez JL et al. A randomized clinical trial comparing nelfinavir or nevirapine associated to zidovudine/lamivudine in HIV-infected naive patients (the Combine Study). *Antivir Ther* 2002; 7(2):81-90
250. Raffi F, Reliquet V, Podzamczar D, Pollard RB. Efficacy of nevirapine-based HAART in HIV-1-infected, treatment-naive persons with high and low baseline viral loads. *HIV Clin Trials* 2001; 2(4):317-22
251. Soriano V, Köppe S, Mingrone H, Lutz T, Opravil M, Andrade-Villanueva J, et al. Prospective comparison of nevirapine and atazanavir/ritonavir both combined with tenofovir DF/emtricitabine in treatment-naïve HIV-1 infected patients: ARTEN study week 48 results. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract LBPEB07.
252. Lockman S, Hughes MD, McIntyre J, Zheng Y, Chipato T, Conradie F et al. Antiretroviral therapies in women after single-dose nevirapine exposure. *N Engl J Med* 2010; 363(16):1499-1509
253. McIntyre J, Hughes M, Mellors J, Zheng Y, Hakim J, Asmelash A, et al. Efficacy of ART with NVP+TDF/FTC vs LPV/r+TDF/FTC among antiretroviral naïve women in Africa: OCTANE trial 2/ACTG A5208. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 153LB.
254. Riddler SA, Haubrich R, DiRienzo AG, Peeples L, Powderly WG, Klingman KL et al. Class-sparing regimens for initial treatment of HIV-1 infection. *N Engl J Med* 2008; 358(20):2095-2106
255. Staszewski S, Morales-Ramirez J, Tashima KT, Rachlis A, Skiest D, Stanford J et al. Efavirenz plus zidovudine and lamivudine, efavirenz plus indinavir, and indinavir plus zidovudine and lamivudine in the treatment of HIV-1 infection in adults. Study 006 Team. *N Engl J Med* 1999; 341(25):1865-73
256. Montaner JS, Schutz M, Schwartz R, Jayaweera DT, Burnside AF, Walmsley S et al. Efficacy, safety and pharmacokinetics of once-daily saquinavir soft-gelatin capsule/ritonavir in antiretroviral-naive, HIV-infected patients. *MedGenMed* 2006; 8(2):36

257. Squires K, Lazzarin A, Gatell JM, Powderly WG, Pokrovskiy V, Delfraissy JF et al. Comparison of once-daily atazanavir with efavirenz, each in combination with fixed-dose zidovudine and lamivudine, as initial therapy for patients infected with HIV. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2004; 36(5):1011-1019
258. Van Leth F, Phanuphak P, Ruxrungtham K, Baraldi E, Miller S, Gazzard B et al. Comparison of first-line antiretroviral therapy with regimens including nevirapine, efavirenz, or both drugs, plus stavudine and lamivudine: a randomised open-label trial, the 2NN Study. *Lancet* 2004; 363(9417):1253-1263
259. Pulido F, Arribas JR, Miro JM, Costa MA, González J, Rubio R et al. Clinical, virologic, and immunologic response to efavirenz or protease inhibitor based highly active antiretroviral therapy in a cohort of antiretroviral-naive patients with advanced HIV infection (EfaVIP 2 Study). *J Acquir Immune Defic Syndr* 2004; 35(4):343-350
260. Sierra-Madero J, Villasis-Keever A, Mendez P, Mosqueda-Gomez JL, Torres-Escobar I, Gutierrez-Escolano F et al. Prospective, randomized, open label trial of Efavirenz vs Lopinavir/Ritonavir in HIV+ treatment-naive subjects with CD4+<200 cell/mm3 in Mexico. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2010; 53(5):582-588
261. Dybul M, Chun TW, Ward DJ, Hertogs K, Larder B, Fox CH et al. Evaluation of lymph node virus burden in human immunodeficiency virus-infected patients receiving efavirenz-based protease inhibitor--sparing highly active antiretroviral therapy. *J Infect Dis* 2000; 181(4):1273-9
262. Walmsley S, Bernstein B, King M, Arribas J, Beall G, Ruane P et al. Lopinavir-ritonavir versus nelfinavir for the initial treatment of HIV infection. *N Engl J Med* 2002; 346(26):2039-2046
263. Gathe J, da Silva BA, Cohen DE, Loutfy MR, Podzamczar D, Rubio R et al. A once-daily lopinavir/ritonavir-based regimen is noninferior to twice-daily dosing and results in similar safety and tolerability in antiretroviral-naive subjects through 48 weeks. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 50(5):474-481
264. Rodriguez-French A, Boghossian J, Gray GE, Nadler JP, Quinones AR, Sepulveda GE et al. The NEAT Study: A 48-week open-label study to compare the antiviral efficacy and safety of GW433908 versus nelfinavir in antiretroviral therapy naïve HIV-1-infected patients. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2004; 35(1):22-32
265. Gathe JC, Ive P, Wood R, Schurmann D, Bellos NC, DeJesus E et al. SOLO: 48-week efficacy and safety comparison of once-daily fosamprenavir /ritonavir versus twice-daily nelfinavir in naïve HIV-1-infected patients. *AIDS* 2004; 18(11):1529-1537
266. Wohl D, Lancaster T, DeJesus E, Sloan L, Sension M, Liao Q, Hicks C. Determination of body composition changes by total body DEXA after 48 weeks of treatment with once-daily fosamprenavir (FPV) boosted with two different doses of ritonavir(r) plus abacavir (ABC)/lamivudine(3TC): COL100758. 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Sydney, July 22-25 2007. Abstract TUPEB080.
267. Ruane PJ, Lubber AD, Wire MB, Lou Y, Shelton MJ, Lancaster CT et al. Plasma amprenavir pharmacokinetics and tolerability following administration of 1,400 milligrams of fosamprenavir once daily in combination with either 100 or 200 milligrams of ritonavir in healthy volunteers. *Antimicrob Agents Chemother* 2007; 51(2):560-565
268. Ortiz R, DeJesus E, Khanlou H, Voronin E, van LJ, Andrade-Villanueva J et al. Efficacy and safety of once-daily darunavir/ritonavir versus lopinavir/ritonavir in treatment-naïve HIV-1-infected patients at week 48. *AIDS* 2008; 22(12):1389-1397
269. Mills AM, Nelson M, Jayaweera D, Ruxrungtham K, Cassetti I, Girard PM et al. Once-daily darunavir/ritonavir vs. lopinavir/ritonavir in treatment-naïve, HIV-1-infected patients: 96-week analysis. *AIDS* 2009; 23(13):1679-1688
270. Orkin C, DeJesus E, Khanlou H, Stoehr A, Supparatpinyo K, Van de Casteele T, et al. ARTEMIS: 192-week efficacy and safety of once-daily darunavir/ritonavir vs lopinavir/r in treatment-naïve HIV-1-infected adults. 10th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow, November 7-11 2010. Abstract P3.
271. Walmsley S, Avihingsanon A, Slim J, Ward DJ, Ruxrungtham K, Brunetta J et al. Gemini: a noninferiority study of saquinavir/ritonavir versus lopinavir/ritonavir as initial HIV-1 therapy in adults. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 50(4):367-374
272. Malan DR, Krantz E, David N, Wirtz V, Hammond J, McGrath D. Efficacy and safety of atazanavir, with or without ritonavir, as part of once-daily highly active antiretroviral therapy regimens in antiretroviral-naïve patients. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2008; 47(2):161-167
273. Molina JM, Andrade-Villanueva J, Echevarria J, Chetchotisakd P, Corral J, David N et al. Once-daily atazanavir/ritonavir versus twice-daily lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and

- emtricitabine, for management of antiretroviral-naïve HIV-1-infected patients: 48 week efficacy and safety results of the CASTLE study. *Lancet* 2008; 372(9639):646-655
274. Molina JM, Andrade-Villanueva J, Echevarria J, Chetchotisakd P, Corral J, David N et al. Once-daily atazanavir/ritonavir compared with twice-daily lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and emtricitabine, for management of antiretroviral-naïve HIV-1-infected patients: 96-week efficacy and safety results of the CASTLE study. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2010; 53(3):323-332
 275. Saag M, Ive P, Heera J, Tawadrous M, DeJesus E, Clumeck N, et al. A multicenter, randomized, double-blind, comparative trial of a novel CCR5 antagonist, maraviroc versus efavirenz, both in combination with Combivir (zidovudine / lamivudine), for the treatment of antiretroviral naïve patients infected with R5 HIV-1: week 48 results of the MERIT study. 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Sydney, July 22-25 2007. Abstract WESS104.
 276. Cooper DA, Heera J, Goodrich J, Tawadrous M, Saag M, DeJesus E et al. Maraviroc versus efavirenz, both in combination with zidovudine-lamivudine, for the treatment of antiretroviral-naïve subjects with CCR5-tropic HIV-1 infection. *J Infect Dis* 2010; 201(6):803-813
 277. Lennox JL, DeJesus E, Lazzarin A, Pollard RB, Madruga JV, Berger DS et al. Safety and efficacy of raltegravir-based versus efavirenz-based combination therapy in treatment-naïve patients with HIV-1 infection: a multicentre, double-blind randomised controlled trial. *Lancet* 2009; 374(9692):796-806
 278. Reynes J, Lawal A, Pulido F, Soto-Malave R, Gathe J, Tian M, et al. Combined with raltegravir demonstrated similar antiviral efficacy and safety as LPV/r combined with tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine in treatment-naïve HIV-1-infected subjects: PROGRESS 48 week results. 18th International AIDS Conference, Vienna, July 18-23 2010. Abstract MOAB0101.
 279. Zolopa A, Andersen J, Powderly W, Sanchez A, Sanne I, Suckow C et al. Early antiretroviral therapy reduces AIDS progression/death in individuals with acute opportunistic infections: a multicenter randomized strategy trial. *PLoS One* 2009; 4(5):e5575
 280. Abdool Karim SS, Naidoo K, Grobler A, Padayatchi N, Baxter C, Gray A et al. Timing of initiation of antiretroviral drugs during tuberculosis therapy. *N Engl J Med* 2010; 362(8):697-706
 281. Blanc X, Sok T, Laureillard D, Borand L, Rekecawicz C, Nerrienet E, et al. Significant enhancement in survival with early (2 weeks) vs. late (8 weeks) initiation of highly active antiretroviral treatment in severely immunosuppressed HIV-infected adults with newly diagnosed tuberculosis. 18th International AIDS Conference, Vienna, July 18-23 2010. Abstract THLBB106.
 282. Torok ME, Yen NTB, Chau TTH, et al. Randomised controlled trial of immediate versus deferred antiretroviral therapy in HIV-associated tuberculous meningitis. 49th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, September 12-15 2009. Abstract H-1224.
 283. Makadzange AT, Ndhlovu CE, Takarinda K, Reid M, Kurangwa M, Gona P et al. Early versus delayed initiation of antiretroviral therapy for concurrent HIV infection and cryptococcal meningitis in sub-Saharan Africa. *Clin Infect Dis* 2010; 50(11):1532-1538
 284. Llibre JM, Schapiro JM, Clotet B. Clinical implications of genotypic resistance to the newer antiretroviral drugs in HIV-1-infected patients with virological failure. *Clin Infect Dis* 2010; 50(6):872-881
 285. Cozzi-Lepri A, Phillips AN, Clotet B, Mocroft A, Ruiz L, Kirk O et al. Detection of HIV drug resistance during antiretroviral treatment and clinical progression in a large European cohort study. *AIDS* 2008; 22(16):2187-2198
 286. Paterson DL, Swindells S, Mohr J, Brester M, Vergis EN, Squier C et al. Adherence to protease inhibitor therapy and outcomes in patients with HIV infection. *Ann Intern Med* 2000; 133(1):21-30
 287. Chesney MA, Ickovics J, Hecht FM, Sikipa G, Rabkin J. Adherence: a necessity for successful HIV combination therapy. *AIDS* 1999; 13(Suppl A):271-8
 288. Haubrich RH, Little SJ, Currier JS, Forthal DN, Kemper CA, Beall GN et al. The value of patient-reported adherence to antiretroviral therapy in predicting virologic and immunologic response. California Collaborative Treatment Group. *AIDS* 1999; 13(9):1099-107
 289. Shet A, Berry L, Mohri H, Mehandru S, Chung C, Kim A et al. Tracking the prevalence of transmitted antiretroviral drug-resistant HIV-1: a decade of experience. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2006; 41(4):439-446
 290. Yerly S, von W, V, Ledergerber B, Boni J, Schupbach J, Burgisser P et al. Transmission of HIV-1 drug resistance in Switzerland: a 10-year molecular epidemiology survey. *AIDS* 2007; 21(16):2223-2229
 291. Little SJ, Holte S, Routy JP, Daar ES, Markowitz M, Collier AC et al. Antiretroviral-drug resistance among patients recently infected with HIV. *N Engl J Med* 2002; 347(6):385-94

292. de Mendoza C., Rodriguez C, Garcia F, Eiros JM, Ruiz L, Caballero E et al. Prevalence of X4 tropic viruses in patients recently infected with HIV-1 and lack of association with transmission of drug resistance. *J Antimicrob Chemother* 2007; 59(4):698-704
293. SPREAD Programme. Transmission of drug-resistant HIV-1 in Europe remains limited to single classes. *AIDS* 2008; 22(5):625-635
294. Phillips AN, Miller V, Sabin C, Cozzi Lepri A, Klauke S, Bickel M et al. Durability of HIV-1 viral suppression over 3.3 years with multi-drug antiretroviral therapy in previously drug-naïve individuals. *AIDS* 2001; 15(18):2379-84
295. Sungkanuparph S, Manosuthi W, Kiertiburanakul S, Piyavong B, Chumpathat N, Chantratita W. Options for a second-line antiretroviral regimen for HIV type 1-infected patients whose initial regimen of a fixed-dose combination of stavudine, lamivudine, and nevirapine fails. *Clin Infect Dis* 2007; 44(3):447-452
296. Lockman S, Shapiro RL, Smeaton LM, Wester C, Thior I, Stevens L et al. Response to antiretroviral therapy after a single, peripartum dose of nevirapine. *N Engl J Med* 2007; 356(2):135-147
297. Gupta RK, Hill A, Sawyer AW, Cozzi-Lepri A, von W, V, Yerly S et al. Virological monitoring and resistance to first-line highly active antiretroviral therapy in adults infected with HIV-1 treated under WHO guidelines: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Infect Dis* 2009; 9(7):409-417
298. Brenner BG, Oliveira M, Doualla-Bell F, Moisi DD, Ntemgwana M, Frankel F et al. HIV-1 subtype C viruses rapidly develop K65R resistance to tenofovir in cell culture. *AIDS* 2006; 20(9):F9-13
299. Dierynck I, De Meyer S, Lathouwers E, Abeele CV, Van de Castele T, DeMasi R, et al. Efficacy of DRV/r in the randomised, controlled, phase III Artemis trial in treatment-naïve, HIV-1-infected patients is independent of HIV-1 subtype. 6th European HIV Drug Resistance Workshop, Budapest, March 26-28 2008. Abstract 57.
300. Bethel R, Hall BD, Baxter J, Schapiro JM, Boucher C, Scherer J. No effect of subtype on susceptibility and virologic response to TPV/r for treatment experienced patients. *Antivir Ther* 2010; 13 (suppl 3):A 121 (Abstract 111)
301. Smith RA, Anderson DJ, Pyrak CL, Preston BD, Gottlieb GS. Antiretroviral drug resistance in HIV-2: three amino acid changes are sufficient for classwide nucleoside analogue resistance. *J Infect Dis* 2009; 199(9):1323-1326
302. Cohen Stuart JW, Wensing AM, Kovacs C, Righart M, de Jong D, Kaye S et al. Transient relapses ("blips") of plasma HIV RNA levels during HAART are associated with drug resistance. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2001; 28(2):105-13
303. Sungkanuparph S, Overton ET, Seyfried W, Groger RK, Fraser VJ, Powderly WG. Intermittent episodes of detectable HIV viremia in patients receiving nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitor-based or protease inhibitor-based highly active antiretroviral therapy regimens are equivalent in incidence and prognosis. *Clin Infect Dis* 2005; 41(9):1326-1332
304. Tan R, Westfall AO, Willig JH, Mugavero MJ, Saag MS, Kaslow RA et al. Clinical outcome of HIV-infected antiretroviral-naïve patients with discordant immunologic and virologic responses to highly active antiretroviral therapy. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2008; 47(5):553-558
305. Berenguer J, Ribera Santasusana J, Rubio R, Miralles P, Mahillo B, Téllez M, Lopez Aldeguer J, Valencia E, Santos J, Rodriguez Arrondo FJ, GESIDA Lymphoma Study Group. Characteristics and outcome of AIDS-related non-Hodgkin's lymphoma in patients treated with HAART. 13th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Denver, February 5-8, 2006. Abstract 829.
306. Montaner J, Guimaraes D, Chung J, Gafoor Z, Salgo M, DeMasi R. Prognostic staging of extensively pretreated patients with advanced HIV-1 disease. *HIV Clin Trials* 2005; 6(6):281-290
307. Cahn P, Molina JM, Towner W, Peeters M, Vingerhoets J, Beets G. 48-week pooled analysis of DUET-1 and DUET-2: the impact of baseline characteristics on virological response to etravirine (TMC125; ETR). 17th International AIDS Conference, Mexico DF, 3-8 August 2008. Abstract TUPE0047.
308. Clotet B, Bellos N, Molina JM, Cooper D, Goffard JC, Lazzarin A et al. Efficacy and safety of darunavir-ritonavir at week 48 in treatment-experienced patients with HIV-1 infection in POWER 1 and 2: a pooled subgroup analysis of data from two randomised trials. *Lancet* 2007; 369(9568):1169-1178
309. Cooper DA, Steigbigel RT, Gatell JM, Rockstroh JK, Katlama C, Yeni P et al. Subgroup and resistance analyses of raltegravir for resistant HIV-1 infection. *N Engl J Med* 2008; 359(4):355-365
310. Hicks CB, Cahn P, Cooper DA, Walmsley SL, Katlama C, Clotet B et al. Durable efficacy of tipranavir-ritonavir in combination with an optimised background regimen of antiretroviral drugs for treatment-

- experienced HIV-1-infected patients at 48 weeks in the Randomized Evaluation of Strategic Intervention in multi-drug resistant patients with Tipranavir (RESIST) studies: an analysis of combined data from two randomised open-label trials. *Lancet* 2006; 368(9534):466-475
311. Lalezari JP, Henry K, O'Hearn M, Montaner JS, Piliero PJ, Trottier B et al. Enfuvirtide, an HIV-1 fusion inhibitor, for drug-resistant HIV infection in North and South America. *N Engl J Med* 2003; 348(22):2175-85
 312. Lazzarin A, Clotet B, Cooper D, Reynes J, Arasteh K, Nelson M et al. Efficacy of enfuvirtide in patients infected with drug-resistant HIV-1 in Europe and Australia. *N Engl J Med* 2003; 348(22):2186-95
 313. Lazzarin A, Campbell T, Clotet B, Johnson M, Katlama C, Moll A et al. Efficacy and safety of TMC125 (etravirine) in treatment-experienced HIV-1-infected patients in DUET-2: 24-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet* 2007; 370(9581):39-48
 314. Madruga JV, Cahn P, Grinsztejn B, Haubrich R, Lalezari J, Mills A et al. Efficacy and safety of TMC125 (etravirine) in treatment-experienced HIV-1-infected patients in DUET-1: 24-week results from a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet* 2007; 370(9581):29-38
 315. Pozniak A, Jayaweera D, Hoy J, de Meyer S, De Paepe E, Tomaka F, et al. Efficacy of darunavir/ritonavir in treatment-experienced patients at 96 weeks in the POWER 1 and 2 trials. 11th European AIDS Conference, Madrid, October 24-27 2007. Abstract P7.2/07.
 316. Steigbigel RT, Cooper DA, Kumar PN, Eron JE, Schechter M, Markowitz M et al. Raltegravir with optimized background therapy for resistant HIV-1 infection. *N Engl J Med* 2008; 359(4):339-354
 317. Elzi L, Hirsch HH, Battegay M. Once-daily directly observed therapy lopinavir/ritonavir plus indinavir as a protease inhibitor-only salvage therapy in heavily pretreated HIV-1-infected patients: a pilot study. *AIDS* 2006; 20(1):129-131
 318. Mitty J, Mwamburi D, Macalino G, Caliendo A, Bazerman L, Flanigan T. Improved virologic outcomes and less HIV resistance for HAART-experienced substance users receiving modified directly observed therapy: results from a randomized controlled trial. 13th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Denver, February 5-8, 2006. Abstract 622a.
 319. Palella F, Armon C, Cmiel J, Buchacz K, Novak R, Moorman A, et al. Enhanced survival associated with use of HIV susceptibility testing among HAART-experienced patients in the HIV Outpatient Study (HOPS). 13th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Denver, February 5-8, 2006. Abstract 654.
 320. Paredes R, Lalama CM, Ribaldo HJ, Schackman BR, Shikuma C, Giguel F et al. Pre-existing minority drug-resistant HIV-1 variants, adherence, and risk of antiretroviral treatment failure. *J Infect Dis* 2010; 201(5):662-671
 321. Lawrence J, Huppler HK, Coakley E, Bates M, Weidler J, Lie Y, et al. Antiretroviral phenotypic susceptibility score as a predictor of treatment response in persons with multi-drug-resistant HIV-1. 13th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Denver, February 5-8, 2006. Abstract 651.
 322. Snoeck J, Kantor R, Shafer RW, Van LK, Deforche K, Carvalho AP et al. Discordances between interpretation algorithms for genotypic resistance to protease and reverse transcriptase inhibitors of human immunodeficiency virus are subtype dependent. *Antimicrob Agents Chemother* 2006; 50(2):694-701
 323. Vora S, Marcelin AG, Gunthard HF, Flandre P, Hirsch HH, Masquelier B et al. Clinical validation of atazanavir/ritonavir genotypic resistance score in protease inhibitor-experienced patients. *AIDS* 2006; 20(1):35-40
 324. Marcelin AG, Flandre P, de MC, Roquebert B, Peytavin G, Valer L et al. Clinical validation of saquinavir/ritonavir genotypic resistance score in protease-inhibitor-experienced patients. *Antivir Ther* 2007; 12(2):247-252
 325. King MS, Rode R, Cohen-Codar I, Calvez V, Marcelin AG, Hanna GJ et al. Predictive genotypic algorithm for virologic response to lopinavir-ritonavir in protease inhibitor-experienced patients. *Antimicrob Agents Chemother* 2007; 51(9):3067-3074
 326. Winters B, Van der Borgh K, van Craenenbroeck E, et al. Darunavir phenotype predicts response better than genotype. 5th European HIV Drug Resistance Workshop, Cascais, March 28-30 2007. Abstract 72.
 327. Naeger LK, Struble KA. Food and Drug Administration analysis of tipranavir clinical resistance in HIV-1-infected treatment-experienced patients. *AIDS* 2007; 21(2):179-185

328. Barreiro P, Camino N, de MC, Valer L, Nunez M, Martin-Carbonero L et al. Comparison of the efficacy, safety and predictive value of HIV genotyping using distinct ritonavir-boosted protease inhibitors. *Int J Antimicrob Agents* 2002; 20(6):438-443
329. Gonzalez de RD, Gallego O, Valer L, Jimenez-Nacher I, Soriano V. Prediction of virological response to lopinavir/ritonavir using the genotypic inhibitory quotient. *AIDS Res Hum Retroviruses* 2004; 20(3):275-278
330. Hoefnagel JG, Van der Lee MJ, Koopmans PP, Schuurman R, Jurriaans S, van Sighem AI et al. The genotypic inhibitory quotient and the (cumulative) number of mutations predict the response to lopinavir therapy. *AIDS* 2006; 20(7):1069-1071
331. Winston A, Hales G, Amin J, van SE, Cooper DA, Emery S. The normalized inhibitory quotient of boosted protease inhibitors is predictive of viral load response in treatment-experienced HIV-1-infected individuals. *AIDS* 2005; 19(13):1393-1399
332. Hernandez-Novoa B, Page C, Gutierrez C, Perez-Elias MJ, Casado JL, Drona F, et al. Mutant HIV minority variants detected by ultra-deep sequencing do not condition virological failure in patients starting ARV therapy including low genetic barrier drugs. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract WEPEB208.
333. Varghese V, Shahriar R, Rhee SY, Simen BB, Egholm M, Gharizadeh B et al. Minority drug resistance mutations associated with the NNRTI mutation K103N in ART-naïve and NNRTI-treated HIV-1 infected patients (18th International Drug Resistance Workshop; Fort Lauderdale, Florida, USA; 2009). *Antivir Ther* 2009; 14 (Suppl 1):A143
334. Lataillade M, Chiarella J, Yang R, Schnittman S, Wirtz V, Uy J et al. Prevalence and clinical significance of HIV drug resistance mutations by ultra-deep sequencing in antiretroviral-naïve subjects in the CASTLE study. *PLoS One* 2010; 5(6):e10952
335. Boffito M, Arnaudo I, Raiteri R, Bonora S, Sinicco A, Di Garbo A et al. Clinical use of lopinavir/ritonavir in a salvage therapy setting: pharmacokinetics and pharmacodynamics. *AIDS* 2002; 16(15):2081-3
336. Best BM, Goicoechea M, Witt MD, Miller L, Daar ES, Diamond C et al. A randomized controlled trial of therapeutic drug monitoring in treatment-naïve and -experienced HIV-1-infected patients. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 46(4):433-442
337. Wainberg MA, Turner D. Resistance issues with new nucleoside/nucleotide backbone options. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2004; 37 Suppl 1:S36-S43
338. Jemsek J, Hutcherson P, Harper E. Poor virologic responses and early emergence of resistance in treatment naïve, HIV-infected patients receiving a once daily triple nucleoside regimen of didanosine, lamivudine, and tenofovir DF. 11th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 8--11 2004. Abstract 51.
339. Landman R, Peytavin G, Descamps D, Brun Vezinet F, Benech H, Benalisherif A, Trylesinski A, Katlama C, Girard PM, Raffi F, Yeni P, Bentata M, Jarrousse B, Michelet C, Flandre P. Low genetic barrier to resistance is a possible cause of early virologic failures in once-daily regimen of abacavir, lamivudine, and tenofovir: The Tonus study. 11th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 8--11 2004. Abstract 52.
340. Shafer RW, Stevenson D, Chan B. Human Immunodeficiency Virus Reverse Transcriptase and Protease Sequence Database. *Nucleic Acids Res* 1999; 27(1):348-52
341. Llibre JM, Santos JR, Puig T, Molto J, Ruiz L, Paredes R et al. Prevalence of etravirine-associated mutations in clinical samples with resistance to nevirapine and efavirenz. *J Antimicrob Chemother* 2008; 62(5):909-913
342. Gupta R, Hill A, Sawyer AW, Pillay D. Emergence of drug resistance in HIV type 1-infected patients after receipt of first-line highly active antiretroviral therapy: a systematic review of clinical trials. *Clin Infect Dis* 2008; 47(5):712-722
343. Ruxrungtham K, Pedro RJ, Latiff GH, Conradie F, Domingo P, Lupo S et al. Impact of reverse transcriptase resistance on the efficacy of TMC125 (etravirine) with two nucleoside reverse transcriptase inhibitors in protease inhibitor-naïve, nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-experienced patients: study TMC125-C227. *HIV Med* 2008; 9(10):883-896
344. Llibre JM. First-line boosted protease inhibitor-based regimens in treatment-naïve HIV-1-infected patients--making a good thing better. *AIDS Rev* 2009; 11(4):215-222
345. de Mendoza C., Valer L, Bachelier L, Pattery T, Corral A, Soriano V. Prevalence of the HIV-1 protease mutation I47A in clinical practice and association with lopinavir resistance. *AIDS* 2006; 20(7):1071-1074

346. Nijhuis M, Wensing AM, Bierman WF, de JD, Kagan R, Fun A et al. Failure of treatment with first-line lopinavir boosted with ritonavir can be explained by novel resistance pathways with protease mutation 76V. *J Infect Dis* 2009; 200(5):698-709
347. Turner D, Schapiro JM, Brenner BG, Wainberg MA. The influence of protease inhibitor resistance profiles on selection of HIV therapy in treatment-naive patients. *Antivir Ther* 2004; 9(3):301-314
348. Colonna R, Rose R, McLaren C, Thiry A, Parkin N, Friborg J. Identification of I50L as the signature atazanavir (ATV)-resistance mutation in treatment-naive HIV-1-infected patients receiving ATV-containing regimens. *J Infect Dis* 2004; 189(10):1802-1810
349. Johnson VA, Brun-Vezinet F, Clotet B, Gunthard HF, Kuritzkes DR, Pillay D et al. Update of the Drug Resistance Mutations in HIV-1: Spring 2008. *Top HIV Med* 2008; 16(1):62-68
350. Weinheimer S, Discotto L, Friborg J, Yang H, Colonna R. Atazanavir signature I50L resistance substitution accounts for unique phenotype of increased susceptibility to other protease inhibitors in a variety of human immunodeficiency virus type 1 genetic backbones. *Antimicrob Agents Chemother* 2005; 49(9):3816-3824
351. Marcelin AG, Flandre P, Molina JM, Katlama C, Yeni P, Raffi F et al. Genotypic resistance analysis of the virological response to fosamprenavir-ritonavir in protease inhibitor-experienced patients in CONTEXT and TRIAD clinical trials. *Antimicrob Agents Chemother* 2008; 52(12):4251-4257
352. Dragsted UB, Gerstoft J, Youle M, Fox Z, Losso M, Benetucci J et al. A randomized trial to evaluate lopinavir/ritonavir versus saquinavir/ritonavir in HIV-1-infected patients: the MaxCmin2 trial. *Antivir Ther* 2005; 10(6):735-743
353. Johnson M, Grinsztejn B, Rodriguez C, Coco J, DeJesus E, Lazzarin A et al. Atazanavir plus ritonavir or saquinavir, and lopinavir/ritonavir in patients experiencing multiple virological failures. *AIDS* 2005; 19(2):153-162
354. Naeger LK, Struble KA. Effect of baseline protease genotype and phenotype on HIV response to atazanavir/ritonavir in treatment-experienced patients. *AIDS* 2006; 20(6):847-853
355. Scherer J, Schapiro JM, Maggiolo F, Perno CF, Boucher CA, Baxter J, et al. Improved tipranavir weighted score predicts virologic response in diverse treatment-experienced patient population. 7th European HIV Drug Resistance Workshop, Stockholm, March 25-27 2009. Abstract 94.
356. Arasteh K, Clumeck N, Pozniak A, Lazzarin A, De MS, Muller H et al. TMC114/ritonavir substitution for protease inhibitor(s) in a non-suppressive antiretroviral regimen: a 14-day proof-of-principle trial. *AIDS* 2005; 19(9):943-947
357. de Meyer S., Azijn H, Surleraux D, Jochmans D, Tahri A, Pauwels R et al. TMC114, a novel human immunodeficiency virus type 1 protease inhibitor active against protease inhibitor-resistant viruses, including a broad range of clinical isolates. *Antimicrob Agents Chemother* 2005; 49(6):2314-2321
358. Saag M, Falcon R, Lefebvre E. Efficacy and safety results of darunavir/r in treatment-experienced patients: POWER 3. 44th Annual meeting of the Infectious Disease Society of America, Toronto, October 11-15 2006. Abstract 957.
359. Pozniak A, Arasteh K, Molina JM, Grinsztejn B, De Meyer S, de Castele T, et al. Power 3 analysis: 144-week efficacy and safety results for darunavir/ritonavir 600/100mg bid in treatment-experienced HIV patients. 9th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow, November 9-13 2008. Abstract S1-P24.
360. Madruga JV, Berger D, McMurchie M, Suter F, Banhegyi D, Ruxrungtham K et al. Efficacy and safety of darunavir-ritonavir compared with that of lopinavir-ritonavir at 48 weeks in treatment-experienced, HIV-infected patients in TITAN: a randomised controlled phase III trial. *Lancet* 2007; 370(9581):49-58
361. Squires KE, Currier J, Bridge D, Hagins D, Zorrilla C, Ryan R, et al. GRACE (Gender, Race And Clinical Experience): 48-week results of darunavir/r-based therapy in the largest trial in North America focused on treatment-experienced women. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract MOPEB042.
362. Currier J, Averitt BD, Hagins D, Zorrilla CD, Feinberg J, Ryan R et al. Sex-based outcomes of darunavir-ritonavir therapy: a single-group trial. *Ann Intern Med* 2010; 153(6):349-357
363. Cahn P, Fourie J, Grinsztejn B, Hodder S, Molina JM, Ruxrungtham K, et al. ODIN: efficacy and safety at 48 weeks of once-daily versus twice-daily darunavir/ritonavir in treatment-experienced HIV-1-infected patients with no darunavir resistance-associated mutations. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 57.

364. Lathouwers E, de la Rosa G, Van de Casteele T, De Doncker P, Spinosa-Guzman S, De Meyer S, et al. 48-week resistance and efficacy subgroup analysis of once- versus twice-daily darunavir/ritonavir in ODIN. 50th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Boston, September 12-15 2010. Abstract H-1811.
365. De Meyer S, Dierynck I, Lathouwers E, van Baelen B, Vangeneugden T, Spinosa-Guzman S, et al. Phenotypic and genotypic determinants of resistance to darunavir: analysis of data from treatment-experienced patients in POWER 1, 2, 3 and DUET-1 and DUET-2. 17th International HIV Drug Resistance Workshop, Sitges, June 10-14 2008. Poster 31.
366. Trottier B, Mills A, Cahn P, Clotet B, Grinsztejn B, Towner W, et al. Durable efficacy and safety of etravirine in treatment-experienced, HIV-1-infected patients: pooled week 96 results from the Phase III DUET-1 and DUET-2 trials. 18th Annual Canadian Conference on HIV/AIDS Research, Vancouver, April 23-26, 2009. Abstract PI-48.
367. Eron J, Haubrich R, Reiss P, Thompson M, Weber R, Nijs S, et al. Clinical endpoints reduced through etravirine use in treatment-experienced, HIV-infected patients: pooled 96-week results from the Phase III Duet trials. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract MOPEB043.
368. de Mendoza C., Anta L, Garcia F, Perez-Elias MJ, Gutierrez F, Llibre JM et al. HIV-1 genotypic drug resistance interpretation rules - 2009 Spanish guidelines. AIDS Rev 2009; 11(1):39-51
369. Benhamida J, Chappey C, Coakley E, Parkin NT. Monogram HIV-1 Genotype Algorithms for Prediction of Etravirine Susceptibility: Novel Mutations and Weighting Factors Identified Through Correlations to Phenotype. 17th International HIV Drug Resistance Workshop, Sitges, June 10-14 2008. Abstract 130.
370. Haddad M, Stawiski E, Benhamida J, Coakley E. Improved genotypic algorithm for predicting etravirine susceptibility: Comprehensive list of mutations identified through correlation with matched phenotype. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 574.
371. Nelson M, Arasteh K, Clotet B, Cooper DA, Henry K, Katlama C et al. Durable efficacy of enfuvirtide over 48 weeks in heavily treatment-experienced HIV-1-infected patients in the T-20 versus optimized background regimen only 1 and 2 clinical trials. J Acquir Immune Defic Syndr 2005; 40(4):404-412
372. Ribera E, Moreno S, Viciano P, Echevarria S, Flores J, Frances A et al. Recomendaciones españolas para el uso adecuado de la enfuvirtida. Enferm Infecc Microbiol Clin 2007; 25(2):131-142
373. Dorr P, Westby M, Dobbs S, Griffin P, Irvine B, Macartney M et al. Maraviroc (UK-427,857), a potent, orally bioavailable, and selective small-molecule inhibitor of chemokine receptor CCR5 with broad-spectrum anti-human immunodeficiency virus type 1 activity. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49(11):4721-4732
374. Gulick RM, Lalezari J, Goodrich J, Clumeck N, DeJesus E, Horban A et al. Maraviroc for Previously Treated Patients with R5 HIV-1 Infection. N Engl J Med 2008; 359(14):1429-1441
375. Ashmuth D, Goodrich J, Cooper D, et al. CD4+ cell restoration after 48 weeks in the maraviroc treatment-experienced trials MOTIVATE 1 and 2. 17th International AIDS Conference, Mexico DF, 3-8 August 2008. Abstract TUPE0050.
376. Fatkenheuer G, Nelson M, Lazzarin A, Konourina I, Hoepelman AIM, Lampiris H et al. Subgroup Analyses of Maraviroc in Previously Treated R5 HIV-1 Infection. N Engl J Med 2008; 359(14):1442-1455
377. Hardy WD, Gulick R, Mayer H, Fälkenheuer G, Nelson M, Heera J, et al. Efficacy and safety of Maraviroc in treatment-experienced patients infected with R5 HIV-1: 96 week combined analysis of the MOTIVATE 1 and 2 Studies. 9th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow, November 9-13 2008. Abstract 425.
378. Ayoub A, Goodrich J, Tressler R, van der Ryst E, Rajcic N, Butelli S, et al. Incidence of infections in treatment-experienced patients infected with R5 HIV-1 in the MOTIVATE studies of maraviroc in combination with optimized background therapy. 9th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow, November 9-13 2008. Abstract 154.
379. Ayoub A, Walmsley S, Campo R, Goodrich J, Heera J, Valdez H, et al. Incidence and risk factors for malignancies in treatment-experienced patients in the MOTIVATE Studies of Maraviroc + optimized background therapy: 96-week follow-up. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract WEPEB255.
380. Van der Ryst E, Westby M. Changes in HIV-1 co-receptor tropism for patients participating in the maraviroc MOTIVATE 1 and 2 clinical trials. 47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Chicago, September 17-20 2007. Abstract H-715.

381. Cahn P, Sued O. Raltegravir: a new antiretroviral class for salvage therapy. *Lancet* 2007; 369(9569):1235-1236
382. Cooper D, Steigbigel R, Lennox J, Grinsztejn B, Markowitz M, Sklar P, et al. Review of cancer incidence in raltegravir clinical trials. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 859.
383. Steigbigel RT, Cooper DA, Teppler H, Eron JJ, Gatell JM, Kumar PN et al. Long-term efficacy and safety of Raltegravir combined with optimized background therapy in treatment-experienced patients with drug-resistant HIV infection: week 96 results of the BENCHMRK 1 and 2 Phase III trials. *Clin Infect Dis* 2010; 50(4):605-612
384. Fagard C, Descamps D, Dubar V, Colin C, Taburet AM, Roquebert B, et al. Efficacy and safety of raltegravir plus etravirine and darunavir/ritonavir in treatment-experienced patients with multidrug-resistant virus: 48-week results from the ANRS 139 TRIO trial. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract TUPDB204.
385. Grabar S, Le Moing V, Goujard C, Leport C, Kazatchkine MD, Costagliola D et al. Clinical outcome of patients with HIV-1 infection according to immunologic and virologic response after 6 months of highly active antiretroviral therapy. *Ann Intern Med* 2000; 133(6):401-10
386. Ledergerber B, Egger M, Opravil M, Telenti A, Hirschel B, Battegay M et al. Clinical progression and virological failure on highly active antiretroviral therapy in HIV-1 patients: a prospective cohort study. Swiss HIV Cohort Study. *Lancet* 1999; 353(9156):863-8
387. Deeks SG, Barbour JD, Grant RM, Martin JN. Duration and predictors of CD4 T-cell gains in patients who continue combination therapy despite detectable plasma viremia. *AIDS* 2002; 16(2):201-7
388. Gandhi T, Wei W, Amin K, Kazanjian P. Effect of maintaining highly active antiretroviral therapy on AIDS events among patients with late-stage HIV infection and inadequate response to therapy. *Clin Infect Dis* 2006; 42(6):878-884
389. Kousignian I, Abgrall S, Grabar S, Mahamat A, Teicher E, Rouveix E et al. Maintaining antiretroviral therapy reduces the risk of AIDS-defining events in patients with uncontrolled viral replication and profound immunodeficiency. *Clin Infect Dis* 2008; 46(2):296-304
390. Deeks SG, Hoh R, Neilands TB, Liegler T, Aweeka F, Petropoulos CJ et al. Interruption of treatment with individual therapeutic drug classes in adults with multidrug-resistant HIV-1 infection. *J Infect Dis* 2005; 192(9):1537-1544
391. Castagna A, Danise A, Menzo S, Galli L, Gianotti N, Carini E et al. Lamivudine monotherapy in HIV-1-infected patients harbouring a lamivudine-resistant virus: a randomized pilot study (E-184V study). *AIDS* 2006; 20(6):795-803
392. Anderson AM, Bartlett JA. Changing antiretroviral therapy in the setting of virologic relapse: review of the current literature. *Curr HIV/AIDS Rep* 2006; 3(2):79-85
393. Chaix ML, Sahali S, Pallier C, Barrail-Tran A, Delfraissy JF, Ghosn J. Switching to darunavir/ritonavir achieves viral suppression in patients with persistent low replication on first-line lopinavir/ritonavir. *AIDS* 2008; 22(17):2405-2407
394. Verhofstede C, Van WF, Van Der GB, Pelgrom J, Vandekerckhove L, Plum J et al. Detection of drug resistance mutations as a predictor of subsequent virological failure in patients with HIV-1 viral rebounds of less than 1,000 RNA copies/ml. *J Med Virol* 2007; 79(9):1254-1260
395. Parra-Ruiz J, Alvarez M, Chueca N, Pena A, Pasquau J, Lopez-Ruz MA et al. Resistencias genotípicas en pacientes con VIH-1 y grados de viremia persistentemente bajos. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2009; 27(2):75-80
396. Neely MN, Benning L, Xu J, Strickler HD, Greenblatt RM, Minkoff H et al. Cervical shedding of HIV-1 RNA among women with low levels of viremia while receiving highly active antiretroviral therapy. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 44(1):38-42
397. Lawrence J, Mayers DL, Hullsiek KH, Collins G, Abrams DI, Reisler RB et al. Structured treatment interruption in patients with multidrug-resistant human immunodeficiency virus. *N Engl J Med* 2003; 349(9):837-846
398. Deeks SG, Wrin T, Liegler T, Hoh R, Hayden M, Barbour JD et al. Virologic and immunologic consequences of discontinuing combination antiretroviral-drug therapy in HIV-infected patients with detectable viremia. *N Engl J Med* 2001; 344(7):472-80
399. Markowitz M, Hill-Zabala C, Lang J, DeJesus E, Liao Q, Lanier ER et al. Induction with abacavir/lamivudine/zidovudine plus efavirenz for 48 weeks followed by 48-week maintenance with

- abacavir/lamivudine/zidovudine alone in antiretroviral-naive HIV-1-infected patients. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2005; 39(3):257-264
400. Pulido F, Arribas JR, Delgado R, Cabrero E, Gonzalez-Garcia J, Perez-Elias MJ et al. Lopinavir-ritonavir monotherapy versus lopinavir-ritonavir and two nucleosides for maintenance therapy of HIV. *AIDS* 2008; 22(2):F1-F9
 401. Pulido F, Arribas J, Gonzalez-Garcia J, López Aldeguer J, Domingo P, Estrada V, et al. Risk factors for loss of virological suppression at 48 weeks in patients receiving Lopinavir/ritonavir monotherapy in 2 clinical trials comparing LPV/r monotherapy vs triple therapy with LPV/r (OK and OK04 trials). 14th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Los Angeles, February 25-28 2007. Abstract 513.
 402. Cameron DW, da Silva BA, Arribas JR, Myers RA, Bellos NC, Gilmore N et al. A 96-week comparison of lopinavir-ritonavir combination therapy followed by lopinavir-ritonavir monotherapy versus efavirenz combination therapy. *J Infect Dis* 2008; 198(2):234-240
 403. Nunes EP, Santini de OM, Mercon M, Zajdenverg R, Faulhaber JC, Pilotto JH et al. Monotherapy with Lopinavir/Ritonavir as maintenance after HIV-1 viral suppression: results of a 96-week randomized, controlled, open-label, pilot trial (KaIMo study). *HIV Clin Trials* 2009; 10(6):368-374
 404. Gutmann C, Cusini A, Gunthard HF, Fux C, Hirschel B, Decosterd LA et al. Randomized controlled study demonstrating failure of LPV/r monotherapy in HIV: the role of compartment and CD4-nadir. *AIDS* 2010; 24(15):2347-2354
 405. Wilkin TJ, McKinnon JE, DiRienzo AG, Mollan K, Fletcher CV, Margolis DM et al. Regimen simplification to atazanavir-ritonavir alone as maintenance antiretroviral therapy: final 48-week clinical and virologic outcomes. *J Infect Dis* 2009; 199(6):866-871
 406. Arribas JR, Horban A, Gerstoft J, Fatkenheuer G, Nelson M, Clumeck N et al. The MONET trial: darunavir/ritonavir with or without nucleoside analogues, for patients with HIV RNA below 50 copies/ml. *AIDS* 2010; 24(2):223-230
 407. Rieger A, Banhegyi D, Schmidt W, Arribas JR, Hill A, van Delft, Y, Moecklinghoff C. The MONET trial 96 week analysis: darunavir/r monotherapy versus darunavir/r + 2NRTIs, for patients with HIV RNA < 50 copies/mL at baseline. 18th International AIDS Conference, Vienna, July 18-23 2010. Abstract TBLBB209.
 408. Katlama C, Valantin MA, Algarte-Genin M, Duvivier C, Lambert-Niclot S, Girard PM, et al. MONOI ANRS 136A randomized multicenter study to compare the efficacy of a monotherapy of darunavir to a triple therapy with 2 nucleosides analogues combined to darunavir/r in HIV infected patients with full viral suppression. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract WELBB102.
 409. Molto J, Valle M, Santos JR, Mothe B, Miranda C, Cedeno S et al. Treatment simplification to once daily darunavir/ritonavir guided by the darunavir inhibitory quotient in heavily pretreated HIV-infected patients. *Antivir Ther* 2010; 15(2):219-225
 410. Valantin MA, Flandre P, Kolta S, Duvivier C, Algarte-Genin M, Ponscarme D, Slama L, Cuzin L, et al. Fat tissue distribution changes in HIV-infected patients with viral suppression treated with DRV/r Monotherapy vs 2 NRTI+DRV/r in the MONOI-ANRS 136 randomized trial: results at 48 weeks. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 721.
 411. Cahn P, Fourie J, Grinsztejn B, Hodder S, Molina JM, Ruxrungtham K, Workman C, et al. Efficacy and safety at 48 weeks of one-daily vs twice daily DRV/r in treatment experienced HIV-1 + patients with no DRV/ resistance associated mutations: the ODIN-trial. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 57.
 412. Curran A, Gutierrez M, Deig E, Mateo G, Lopez RM, Imaz A et al. Efficacy, safety and pharmacokinetics of 900/100 mg of darunavir/ritonavir once daily in treatment-experienced patients. *J Antimicrob Chemother* 2010; 65(10):2195-2203
 413. Pulido F, Serrano O, Rivero A, Montes ML, Rubio R, López Bernaldo de Quirós JC, et al. Atazanavir/ritonavir en monoterapia como mantenimiento en pacientes con supresión virológica: Análisis primario a las 48 semanas del estudio OREY. 1er Congreso Nacional de Gesida, Madrid, 21-24 octubre 2009. PO-70.
 414. Ghosn J, Carosi G, Moreno S, Pokrovsky V, Lazzarin A, Pialoux G et al. Unboosted atazanavir-based therapy maintains control of HIV type-1 replication as effectively as a ritonavir-boosted regimen. *Antivir Ther* 2010; 15(7):993-1002

415. Squires KE, Young B, DeJesus E, Bellos N, Murphy D, Sutherland-Phillips DH et al. Safety and efficacy of a 36-week induction regimen of abacavir/lamivudine and ritonavir-boosted atazanavir in HIV-infected patients. *HIV Clin Trials* 2010; 11(2):69-79
416. Squires KE, Young B, DeJesus E, Bellos N, Murphy D, Zhao HH et al. Similar efficacy and tolerability of atazanavir compared with atazanavir/ritonavir, each with abacavir/lamivudine after initial suppression with abacavir/lamivudine plus ritonavir-boosted atazanavir in HIV-infected patients. *AIDS* 2010; 24(13):2019-2027
417. Squires KE, DeJesus E, Bellos N, Ward D, Murphy D, Young B, et al. Sustained virologic efficacy of atazanavir vs atazanavir/ritonavir each in combination with abacavir/lamivudine over 120 weeks: the ARIES trial. 50th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Boston, September 12-15 2010. Abstract H-204.
418. Becker S, Rachlis A, Gill J, DeJesus E, Pierone G, Kirkland L, Koosian S, Farina D, Labriola D, Ruiz N, Bessen L, Villano S. Successful substitution of protease inhibitors with efavirenz in patients with undetectable viral loads: A prospective, randomized, multicenter, open-label study (DMP 049). 8th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Chicago, February 4-8 2001. Abstract 20.
419. Katlama C, Stazewsky S, Clumeck N, Arasteh K, Dellamonica P, Molina JM, et al. Successful substitution of protease inhibitors with Sustiva (efavirenz) in patients with undetectable plasma HIV-1 RNA: results of a prospective, randomized, multicenter, open-label study (DMP 006-027). XIII International AIDS Conference, Durban, South Africa, 2000 (Abstract LbPeB7044).
420. Negro E, Cruz L, Paredes R, Ruiz L, Fumaz CR, Bonjoch A et al. Virological, immunological, and clinical impact of switching from protease inhibitors to nevirapine or to efavirenz in patients with human immunodeficiency virus infection and long-lasting viral suppression. *Clin Infect Dis* 2002; 34(4):504-10
421. Maggiolo F, Ripamonti D, Ravasio L, Gregis G, Quinzan G, Callegaro A et al. Outcome of 2 simplification strategies for the treatment of human immunodeficiency virus type 1 infection. *Clin Infect Dis* 2003; 37(1):41-49
422. Campo RE, Cohen C, Grimm K, Shangguan T, Maa J, Seekins D. Switch from protease inhibitor- to efavirenz-based antiretroviral therapy improves quality of life, treatment satisfaction and adherence with low rates of virological failure in virologically suppressed patients. *Int J STD AIDS* 2010; 21(3):166-171
423. Ruiz L, Negro E, Domingo P, Paredes R, Francia E, Balague M et al. Antiretroviral treatment simplification with nevirapine in protease inhibitor-experienced patients with hiv-associated lipodystrophy: 1-year prospective follow-up of a multicenter, randomized, controlled study. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2001; 27(3):229-36
424. Negro E, Ribalta J, Paredes R, Ferre R, Sirera G, Ruiz L et al. Reversal of atherogenic lipoprotein profile in HIV-1 infected patients with lipodystrophy after replacing protease inhibitors by nevirapine. *AIDS* 2002; 16(10):1383-1389
425. Arranz Caso JA, Lopez JC, Santos I, Estrada V, Castilla V, Sanz J et al. A randomized controlled trial investigating the efficacy and safety of switching from a protease inhibitor to nevirapine in patients with undetectable viral load. *HIV Med* 2005; 6(5):353-359
426. Barreiro P, Soriano V, Blanco F, Casimiro C, de la Cruz JJ, Gonzalez-Lahoz J. Risks and benefits of replacing protease inhibitors by nevirapine in HIV-infected subjects under long-term successful triple combination therapy. *AIDS* 2000; 14(7):807-12
427. Dieleman JP, Sturkenboom MC, Wit FW, Jambroes M, Mulder JW, Ten Veen JH et al. Low risk of treatment failure after substitution of nevirapine for protease inhibitors among human immunodeficiency virus-infected patients with virus suppression. *J Infect Dis* 2002; 185(9):1261-1268
428. Negro E, Miro O, Rodriguez-Santiago B, Garrabou G, Estany C, Masabeu A et al. Improvement of mitochondrial toxicity in patients receiving a nucleoside reverse-transcriptase inhibitor-sparing strategy: results from the Multicenter Study with Nevirapine and Kaletra (MULTINEKA). *Clin Infect Dis* 2009; 49(6):892-900
429. Clumeck N, Goebel F, Rozenbaum W, Gerstoft J, Staszewski S, Montaner J et al. Simplification with abacavir-based triple nucleoside therapy versus continued protease inhibitor-based highly active antiretroviral therapy in HIV-1-infected patients with undetectable plasma HIV-1 RNA. *AIDS* 2001; 15(12):1517-26
430. Manfredi R, Calza L. Nevirapine versus efavirenz in 742 patients: no link of liver toxicity with female sex, and a baseline CD4 cell count greater than 250 cells/microl. *AIDS* 2006; 20(17):2233-2236

431. Wolf E, Koegl C, Theobald T, Jaegel-Guedes E, Jaeger H. Nevirapine-associated hepatotoxicity: no increased risk for females or high CD4 count in a single-centre HIV cohort. 46th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, September 2-30 2006. Abstract H-1063.
432. de Lazzari E, Leon A, Arnaiz JA, Martinez E, Knobel H, Negro E et al. Hepatotoxicity of nevirapine in virologically suppressed patients according to gender and CD4 cell counts. *HIV Med* 2008; 9(4):221-226
433. Mocroft A, Staszewski S, Weber R, Gatell J, Rockstroh J, Gasirowski J et al. Risk of discontinuation of nevirapine due to toxicities in antiretroviral-naive and -experienced HIV-infected patients with high and low CD4+ T-cell counts. *Antivir Ther* 2007; 12(3):325-333
434. Antela A, Ocampo A, Gomez R, Lopez MJ, Marino A, Losada E et al. Liver toxicity after switching or simplifying to nevirapine-based therapy is not related to CD4 cell counts: results of the TOSCANA study. *HIV Clin Trials* 2010; 11(1):11-17
435. Wit FW, Kesselring AM, Gras L, Richter C, Van Der Ende ME, Brinkman K et al. Discontinuation of nevirapine because of hypersensitivity reactions in patients with prior treatment experience, compared with treatment-naive patients: the ATHENA cohort study. *Clin Infect Dis* 2008; 46(6):933-940
436. Katlama C, Fenske S, Gazzard B, Lazzarin A, Clumeck N, Mallolas J et al. TRIZAL study: switching from successful HAART to Trizivir (abacavir-lamivudine-zidovudine combination tablet): 48 weeks efficacy, safety and adherence results. *HIV Med* 2003; 4(2):79-86
437. Opravil M, Hirschel B, Lazzarin A, Furrer H, Chave JP, Yerly S et al. A randomized trial of simplified maintenance therapy with abacavir, lamivudine, and zidovudine in human immunodeficiency virus infection. *J Infect Dis* 2002; 185(9):1251-1260
438. Pulvirenti J, Goodwin D, Slater L. Simplification of protease inhibitor- containing HAART regimens with abacavir maintains viral suppression and favourable adherence in HIV-1 infected adults (COLA30305). 39th Annual Meeting of the Infectious Disease Society of America, San Francisco, October 25-28 2001. Abstract 620.
439. Mallolas J, Pich J, Penaranda M, Domingo P, Knobel H, Pedrol E et al. Induction therapy with trizivir plus efavirenz or lopinavir/ritonavir followed by trizivir alone in naive HIV-1-infected adults. *AIDS* 2008; 22(3):377-384
440. d'Ettorre G, Zaffiri L, Ceccarelli G, Andreotti M, Massetti AP, Vella S et al. Simplified maintenance therapy with abacavir/lamivudine/zidovudine plus tenofovir after sustained HIV load suppression: four years of follow-up. *HIV Clin Trials* 2007; 8(3):182-188
441. Hoogwerf M, Regez RM, Schouten WE, Weigel HM, Frissen PH, Brinkman K. Change to abacavir-lamivudine-tenofovir combination treatment in patients with HIV-1 who had complete virological suppression. *Lancet* 2003; 362(9400):1979-1980
442. Martinez E, Arnaiz JA, Podzamczar D, Dalmau D, Ribera E, Domingo P et al. Substitution of nevirapine, efavirenz, or abacavir for protease inhibitors in patients with human immunodeficiency virus infection. *N Engl J Med* 2003; 349(11):1036-1046
443. Martinez E, Arnaiz JA, Podzamczar D, Dalmau D, Ribera E, Domingo P et al. Three-year follow-up of protease inhibitor-based regimen simplification in HIV-infected patients. *AIDS* 2007; 21(3):367-369
444. Ochoa de EA, Arnedo M, Xercavins M, Martinez E, Roson B, Ribera E et al. Genotypic and phenotypic resistance patterns at virological failure in a simplification trial with nevirapine, efavirenz or abacavir. *AIDS* 2005; 19(13):1385-1391
445. Fisac C, Fumero E, Crespo M, Roson B, Ferrer E, Virgili N et al. Metabolic benefits 24 months after replacing a protease inhibitor with abacavir, efavirenz or nevirapine. *AIDS* 2005; 19(9):917-925
446. Martinez E, Gatell JM. Considerations on the effectiveness of nevirapine in protease inhibitor-based regimen simplification. *AIDS* 2007; 21(13):1829-1830
447. Abgrall S, Yeni PG, Bouchaud O, Costagliola D. Switch from a first virologically effective protease inhibitor-containing regimen to a regimen containing efavirenz, nevirapine or abacavir. *AIDS* 2006; 20(16):2099-2106
448. Bonjoch A, Paredes R, Galvez J, Miralles C, Videla S, Martinez E et al. Antiretroviral treatment simplification with 3 NRTIs or 2 NRTIs plus nevirapine in HIV-1-infected patients treated with successful first-line HAART. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2005; 39(3):313-316
449. Gatell J, Salmon-Ceron D, Lazzarin A, van WE, Antunes F, Leen C et al. Efficacy and safety of atazanavir-based highly active antiretroviral therapy in patients with virologic suppression switched from a stable, boosted or unboosted protease inhibitor treatment regimen: the SWAN Study (AI424-097) 48-week results. *Clin Infect Dis* 2007; 44(11):1484-1492

450. Mallolas J, Podzamczar D, Milinkovic A, Domingo P, Clotet B, Ribera E et al. Efficacy and safety of switching from boosted lopinavir to boosted atazanavir in patients with virological suppression receiving a LPV/r-containing HAART: the ATAZIP study. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 51(1):29-36
451. Rubio R, Serrano O, Carmena J, Asensi V, Echevarria S, Flores J et al. Effect of simplification from protease inhibitors to boosted atazanavir-based regimens in real-life conditions. *HIV Med* 2010; 11(9):545-553
452. Moyle G, Girard JM, Andrade J, Salvato P, Bogner JR, Hay P, et al. Continuation of BID boosted PI vs switch to once-daily ATV/RTV for the management of lipodystrophy: 48 week primary analysis of the 96 week multicenter, open-label, randomized, prospective ReAL study. 17th International AIDS Conference, Mexico DF, 3-8 August 2008. Abstract MOPDB103.
453. Sension M, Andrade Neto JL, Grinsztejn B, Molina JM, Zavala I, Gonzalez-Garcia J et al. Improvement in lipid profiles in antiretroviral-experienced HIV-positive patients with hyperlipidemia after a switch to unboosted atazanavir. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 51(2):153-162
454. Molina JM, Journot V, Morand-Joubert L, Yeni P, Rozenbaum W, Rancinan C et al. Simplification therapy with once-daily emtricitabine, didanosine, and efavirenz in HIV-1-infected adults with viral suppression receiving a protease inhibitor-based regimen: a randomized trial. *J Infect Dis* 2005; 191(6):830-839
455. Negrodo E, Molto J, Munoz-Moreno JA, Pedrol E, Ribera E, Viciano P et al. Safety and efficacy of once-daily didanosine, tenofovir and nevirapine as a simplification antiretroviral approach. *Antivir Ther* 2004; 9(3):335-342
456. Barrios A, Rendon A, Negrodo E, Barreiro P, Garcia-Benayas T, Labarga P et al. Paradoxical CD4+ T-cell decline in HIV-infected patients with complete virus suppression taking tenofovir and didanosine. *AIDS* 2005; 19(6):569-575
457. Fisher M, Moyle GJ, Shahmanesh M, Orkin C, Kingston M, Wilkins E et al. A randomized comparative trial of continued zidovudine/lamivudine or replacement with tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine in efavirenz-treated HIV-1-infected individuals. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 51(5):562-568
458. Martínez E, Ribera E, Pulido F, Rubio R, Negrodo E, Sanz J et al. Early improvement of limb fat content in patients switching from AZT/3TC to FTC/TDF (TVD): a 24 week interim analysis of the RECOMB Trial. 17th International AIDS Conference, Mexico DF, 3-8 August 2008. Abstract MOPDB102.
459. Ribera E, Martinez E, Clotet B, Estrada V, Sanz J, Berenguer J, et al. 72 week outcomes following switch from AZT/3TC to FTC/TDF (TVD) vs continuing on AZT/3TC. Final results of the RECOMB trial. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract CDB091.
460. Valantin MA, Bittar R, de TP, Bollens D, Slama L, Giral P et al. Switching the nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbone to tenofovir disoproxil fumarate + emtricitabine promptly improves triglycerides and low-density lipoprotein cholesterol in dyslipidaemic patients. *J Antimicrob Chemother* 2010; 65(3):556-561
461. Martinez E, Arranz JA, Podzamczar D, Lonca M, Sanz J, Barragan P et al. A simplification trial switching from nucleoside reverse transcriptase inhibitors to once-daily fixed-dose abacavir/lamivudine or tenofovir/emtricitabine in HIV-1-infected patients with virological suppression. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 51(3):290-297
462. Martin A, Bloch M, Amin J, Baker D, Cooper DA, Emery S et al. Simplification of antiretroviral therapy with tenofovir-emtricitabine or abacavir-Lamivudine: a randomized, 96-week trial. *Clin Infect Dis* 2009; 49(10):1591-1601
463. DeJesus E, Young B, Morales-Ramirez JO, Sloan L, Ward DJ, Flaherty JF et al. Simplification of antiretroviral therapy to a single-tablet regimen consisting of efavirenz, emtricitabine, and tenofovir disoproxil fumarate versus unmodified antiretroviral therapy in virologically suppressed HIV-1-infected patients. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 51(2):163-174
464. Hodder SL, Mounzer K, DeJesus E, Ebrahimi R, Grimm K, Esker S et al. Patient-reported outcomes in virologically suppressed, HIV-1-infected subjects after switching to a simplified, single-tablet regimen of efavirenz, emtricitabine, and tenofovir DF. *AIDS Patient Care STDS* 2010; 24(2):87-96
465. Airoidi M, Zaccarelli M, Bisi L, Bini T, Antinori A, Mussini C et al. One-pill once-a-day HAART: a simplification strategy that improves adherence and quality of life of HIV-infected subjects. *Patient Prefer Adherence* 2010; 4:115-125

466. Podzamczar D, Olmo M, Sanz J, Boix V, Negredo E, Knobel H et al. Safety of switching nevirapine twice daily to nevirapine once daily in virologically suppressed patients. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 50(4):390-396
467. Pollard RB. Can HIV infection be treated successfully with a once-daily regimen? *AIDS Read* 2002; 12(11):489-8, 500, 508
468. Towner W, Klein D, Kerrigan HL, Follansbee S, Yu K, Horberg M. Virologic outcomes of changing enfuvirtide to raltegravir in HIV-1 patients well controlled on an enfuvirtide based regimen: 24-week results of the CHEER study. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 51(4):367-373
469. Harris M, Larsen G, Montaner JSG. Outcomes of patients switched from Raltegravir within a virologically suppressive regimen. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 799.
470. De Castro N, Braun J, Charreau I, Pialoux G, Cotte L, Katlama C, et al. Switch from Enfuvirtide to Raltegravir in highly treatment-experienced patients: a randomized open label non-inferiority trial, Easier-ANRS 138. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 572.
471. Gatti F, Matti A, Nasta P, Cogni G, Costarelli S, Carosi G. Switch from enfuvirtide to raltegravir: a simplification option for heavily pretreated patients. 9th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow, November 9-13 2008. Abstract P52.
472. Talbot A, Machouf N, Thomas R, Marcotte S, Therrien R, Lessard B et al. Switch from enfuvirtide to raltegravir in patients with undetectable viral load: efficacy and safety at 24 weeks in a Montreal cohort. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 51(3):362-364
473. Santos JR, Llibre JM, Ferrer E, Domingo P, Imaz A, Molto J et al. Efficacy and safety of switching from enfuvirtide to raltegravir in patients with virological suppression. *HIV Clin Trials* 2009; 10(6):432-438
474. Loutfy M, Ribera E, Florence E, De WS, Castagna A, Ryan R et al. Sustained HIV RNA suppression after switching from enfuvirtide to etravirine in the early access programme. *J Antimicrob Chemother* 2009; 64(6):1341-1344
475. Eron JJ, Young B, Cooper DA, Youle M, DeJesus E, Andrade-Villanueva J et al. Switch to a raltegravir-based regimen versus continuation of a lopinavir-ritonavir-based regimen in stable HIV-infected patients with suppressed viraemia (SWITCHMRK 1 and 2): two multicentre, double-blind, randomised controlled trials. *Lancet* 2010; 375(9712):396-407
476. Martinez E, Larrousse M, Llibre JM, Gutierrez F, Saumoy M, Antela A et al. Substitution of raltegravir for ritonavir-boosted protease inhibitors in HIV-infected patients: the SPIRAL study. *AIDS* 2010; 24(11):1697-1707
477. Vispo E, Barreiro P, Maida I, Mena A, Blanco F, Rodriguez-Novoa S, et al. Simplification from protease inhibitors to once or twice daily raltegravir: the ODIS trial. 18th International AIDS Conference, Vienna, July 18-23 2010. Abstract MOAB0102.
478. Kilby JM. Switching HIV therapies: competing host and viral factors. *Lancet* 2010; 375(9712):352-354
479. Eron J, Andrade J, Zajdenverg R, Workman C, Cooper D, Young B, et al. Switching from stable lopinavir/ritonavir-based to raltegravir-based combination ART resulted in a superior lipid profile at week 12 but did not demonstrate non-inferior virologic efficacy at week 24. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 70aLB.
480. Arribas JR, Delgado R, Arranz A, Munoz R, Portilla J, Pasquau J et al. Lopinavir-ritonavir monotherapy versus lopinavir-ritonavir and 2 nucleosides for maintenance therapy of HIV: 96-week analysis. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 51(2):147-152
481. Pulido F, Matarranz M, Rodriguez-Rivera V, Fiorante S, Hernando A. Boosted protease inhibitor monotherapy. What have we learnt after seven years of research? *AIDS Rev* 2010; 12(3):127-134
482. Arribas JR, Horban A, Gerstoft J, Fälkenheuer G, Nelson M, Clumeck N, Pulido F, et al. The MONET trial: darunavir/ritonavir monotherapy shows non-inferior efficacy to standard HAART, for patients with HIV RNA <50 copies/mL at baseline. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract TUAB106-LB.
483. Barrios A, Negredo E, Domingo P, Estrada V, Labarga P, Asensi V et al. Simplification therapy with once-daily didanosine, tenofovir and efavirenz in HIV-1-infected adults with viral suppression receiving a more complex antiretroviral regimen: final results of the EFADITE trial. *Antivir Ther* 2005; 10(7):825-832

484. Rubio R, Carmena J, Asensi V, Echevarria S, et al. Effect of simplification from protease inhibitors to boosted atazanavir based regimens in real life conditions: final 1 year results of GESIDA 44/04 SIMPATAZ study. 17th International AIDS Conference, Mexico DF, 3-8 August 2008. Abstract TUPE0111.
485. Nieuwkerk PT, Oort FJ. Self-reported adherence to antiretroviral therapy for HIV-1 infection and virologic treatment response: a meta-analysis. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2005; 38(4):445-448
486. Wood E, Hogg RS, Yip B, Harrigan PR, O'Shaughnessy MV, Montaner JS. The impact of adherence on CD4 cell count responses among HIV-infected patients. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2004; 35(3):261-268
487. Lima VD, Harrigan R, Bangsberg DR, Hogg RS, Gross R, Yip B et al. The combined effect of modern highly active antiretroviral therapy regimens and adherence on mortality over time. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 50(5):529-536
488. Garcia de Olalla P, Knobel H, Carmona A, Guelar A, Lopez-Colomes JL, Cayla JA. Impact of adherence and highly active antiretroviral therapy on survival in HIV-infected patients. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2002; 30(1):105-110
489. Rueda S, Park-Wyllie LY, Bayoumi AM, Tynan AM, Antoniou TA, Rourke SB, Glazier RH. Patient support and education for promoting adherence to highly active antiretroviral therapy for HIV/AIDS. *Cochrane Database Syst Rev Issue 3*. Art. No.: CD001442. DOI: 10.1002/14651858.CD001442.pub2.
490. Mills EJ, Nachega JB, Bangsberg DR, Singh S, Rachlis B, Wu P et al. Adherence to HAART: a systematic review of developed and developing nation patient-reported barriers and facilitators. *PLoS One* 2006; 3(11):e438
491. Glass TR, De GS, Weber R, Vernazza PL, Rickenbach M, Furrer H et al. Correlates of self-reported nonadherence to antiretroviral therapy in HIV-infected patients: the Swiss HIV Cohort Study. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2006; 41(3):385-392
492. Pardi GR, Nunes MA, Preto R, Canassa PG, Correia D. Profile of adherence to highly active antiretroviral therapy of patients older than 50 years old. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 52(2):301-303
493. Ettenhofer ML, Hinkin CH, Castellon SA, Durvasula R, Ullman J, Lam M et al. Aging, neurocognition, and medication adherence in HIV infection. *Am J Geriatr Psychiatry* 2009; 17(4):281-290
494. Stone VE. Strategies for optimizing adherence to highly active antiretroviral therapy: lessons from research and clinical practice. *Clin Infect Dis* 2001; 33(6):865-72
495. Muñoz-Moreno JA, Fumaz CR, Ferrer MJ, Tuldra A, Rovira T, Viladrich C et al. Assessing self-reported adherence to HIV therapy by questionnaire: the SERAD (Self-Reported Adherence) Study. *AIDS Res Hum Retroviruses* 2007; 23(10):1166-1175
496. Knobel H, Alonso J, Casado JL, Collazos J, Gonzalez J, Ruiz I et al. Validation of a simplified medication adherence questionnaire in a large cohort of HIV-infected patients: the GEEMA Study. *AIDS* 2002; 16(4):605-613
497. Duong M, Golzi A, Peytavin G, Piroth L, Froidure M, Grappin M et al. Usefulness of therapeutic drug monitoring of antiretrovirals in routine clinical practice. *HIV Clin Trials* 2004; 5(4):216-223
498. Deschamps AE, Graeve VD, van WE, De S, V, Vandamme AM, van VK et al. Prevalence and correlates of nonadherence to antiretroviral therapy in a population of HIV patients using Medication Event Monitoring System. *AIDS Patient Care STDS* 2004; 18(11):644-657
499. Bangsberg DR. Less than 95% adherence to nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitor therapy can lead to viral suppression. *Clin Infect Dis* 2006; 43(7):939-941
500. Maggiolo F, Ravasio L, Ripamonti D, Gregis G, Quinzan G, Arici C et al. Similar adherence rates favor different virologic outcomes for patients treated with nonnucleoside analogues or protease inhibitors. *Clin Infect Dis* 2005; 40(1):158-163
501. Cohen CJ, Colson AE, Sheble-Hall AG, McLaughlin KA, Morse GD. Pilot study of a novel short-cycle antiretroviral treatment interruption strategy: 48-week results of the five-days-on, two-days-off (FOTO) study. *HIV Clin Trials* 2007; 8(1):19-23
502. Knobel H, Urbina O, Gonzalez A, Sorli ML, Montero M, Carmona A et al. Impact of different patterns of nonadherence on the outcome of highly active antiretroviral therapy in patients with long-term follow-up. *HIV Med* 2009; 10(6):364-369
503. Nachega JB, Hislop M, Dowdy DW, Chaisson RE, Regensberg L, Maartens G. Adherence to nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-based HIV therapy and virologic outcomes. *Ann Intern Med* 2007; 146(8):564-573

504. Nelson M, Girard PM, DeMasi R, Chen L, Smets E, Sekar V et al. Suboptimal adherence to darunavir/ritonavir has minimal effect on efficacy compared with lopinavir/ritonavir in treatment-naive, HIV-infected patients: 96 week ARTEMIS data. *J Antimicrob Chemother* 2010; 65(7):1505-1509
505. Parienti JJ, Das-Douglas M, Massari V, Guzman D, Deeks SG, Verdon R et al. Not all missed doses are the same: sustained NNRTI treatment interruptions predict HIV rebound at low-to-moderate adherence levels. *PLoS One* 2008; 3(7):e2783
506. Bangsberg DR, Kroetz DL, Deeks SG. Adherence-resistance relationships to combination HIV antiretroviral therapy. *Curr HIV/AIDS Rep* 2007; 4(2):65-72
507. Maggiolo F, Airoidi M, Kleinloog HD, Callegaro A, Ravasio V, Arici C et al. Effect of adherence to HAART on virologic outcome and on the selection of resistance-conferring mutations in N. *HIV Clin Trials* 2007; 8(5):282-292
508. Bangsberg DR. Preventing HIV antiretroviral resistance through better monitoring of treatment adherence. *J Infect Dis* 2008; 197 Suppl 3:S272-S278
509. Gardner EM, Sharma S, Peng G, Hullsiek KH, Burman WJ, MacArthur RD et al. Differential adherence to combination antiretroviral therapy is associated with virological failure with resistance. *AIDS* 2008; 22(1):75-82
510. Bangsberg DR, Ragland K, Monk A, Deeks SG. A single tablet regimen is associated with higher adherence and viral suppression than multiple tablet regimens in HIV+ homeless and marginally housed people. *AIDS* 2010; 24(18):2835-2840
511. Golin CE, Earp J, Tien HC, Stewart P, Porter C, Howie L. A 2-arm, randomized, controlled trial of a motivational interviewing-based intervention to improve adherence to antiretroviral therapy (ART) among patients failing or initiating ART. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2006; 42(1):42-51
512. Simoni JM, Amico KR, Smith L, Nelson K. Antiretroviral adherence interventions: translating research findings to the real world clinic. *Curr HIV/AIDS Rep* 2010; 7(1):44-51
513. Hart JE, Jeon CY, Ivers LC, Behforouz HL, Caldas A, Drobac PC et al. Effect of directly observed therapy for highly active antiretroviral therapy on virologic, immunologic, and adherence outcomes: a meta-analysis and systematic review. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2010; 54(2):167-179
514. Kleeberger CA, Buechner J, Palella F, Detels R, Riddler S, Godfrey R et al. Changes in adherence to highly active antiretroviral therapy medications in the Multicenter AIDS Cohort Study. *AIDS* 2004; 18(4):683-688
515. Falco V, Rodriguez D, Ribera E, Martinez E, Miro JM, Domingo P et al. Severe nucleoside-associated lactic acidosis in human immunodeficiency virus-infected patients: report of 12 cases and review of the literature. *Clin Infect Dis* 2002; 34(6):838-46
516. Waters L, Nelson M. Long-term complications of antiretroviral therapy: lipodystrophy. *Int J Clin Pract* 2007; 61(6):999-1014
517. Hetherington S, McGuirk S, Powell G, Cutrell A, Naderer O, Spreen B et al. Hypersensitivity reactions during therapy with the nucleoside reverse transcriptase inhibitor abacavir. *Clin Ther* 2001; 23(10):1603-1614
518. Kesselring AM, Wit FW, Sabin CA, Lundgren JD, Gill MJ, Gatell JM et al. Risk factors for treatment-limiting toxicities in patients starting nevirapine-containing antiretroviral therapy. *AIDS* 2009; 23(13):1689-1699
519. Sulkowski MS. Drug-induced liver injury associated with antiretroviral therapy that includes HIV-1 protease inhibitors. *Clin Infect Dis* 2004; 38 Suppl 2:S90-S97
520. Pineda JA, Palacios R, Rivero A, bdel-Kader L, Marquez M, Cano P et al. Low incidence of severe liver toxicity in patients receiving antiretroviral combinations including atazanavir. *J Antimicrob Chemother* 2006; 57(5):1016-1017
521. Palacios R, Vergara S, Rivero A, Aguilar I, Macias J, Camacho A et al. Low incidence of severe liver events in HIV patients with and without hepatitis C or B coinfection receiving lopinavir/ritonavir. *HIV Clin Trials* 2006; 7(6):319-323
522. Clifford DB, Evans S, Yang Y, Acosta EP, Goodkin K, Tashima K et al. Impact of efavirenz on neuropsychological performance and symptoms in HIV-infected individuals. *Ann Intern Med* 2005; 143(10):714-721
523. Blanch J, Martinez E, Rousaud A, Blanco JL, Garcia-Viejo MA, Peri JM et al. Preliminary data of a prospective study on neuropsychiatric side effects after initiation of efavirenz. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2001; 27(4):336-43

524. Journot V, Chene G, De CN, Rancinan C, Cassuto JP, Allard C et al. Use of efavirenz is not associated with a higher risk of depressive disorders: a substudy of the randomized clinical trial ALIZE-ANRS 099. *Clin Infect Dis* 2006; 42(12):1790-1799
525. Gallant JE, Parish MA, Keruly JC, Moore RD. Changes in renal function associated with tenofovir disoproxil fumarate treatment, compared with nucleoside reverse-transcriptase inhibitor treatment. *Clin Infect Dis* 2005; 40(8):1194-1198
526. Nelson MR, Katlama C, Montaner JS, Cooper DA, Gazzard B, Clotet B et al. The safety of tenofovir disoproxil fumarate for the treatment of HIV infection in adults: the first 4 years. *AIDS* 2007; 21(10):1273-1281
527. Cassetti I, Madruga JV, Suleiman JM, Etzel A, Zhong L, Cheng AK et al. The safety and efficacy of tenofovir DF in combination with lamivudine and efavirenz through 6 years in antiretroviral-naive HIV-1-infected patients. *HIV Clin Trials* 2007; 8(3):164-172
528. Gupta SK. Tenofovir-associated Fanconi syndrome: review of the FDA adverse event reporting system. *AIDS Patient Care STDS* 2008; 22(2):99-103
529. Moyle GJ, Sabin CA, Cartledge J, Johnson M, Wilkins E, Churchill D et al. A randomized comparative trial of tenofovir DF or abacavir as replacement for a thymidine analogue in persons with lipodystrophy. *AIDS* 2006; 20(16):2043-2050
530. Wever K, van Aagtmael MA, Carr A. Incomplete reversibility of tenofovir-related renal toxicity in HIV-infected men. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2010; 55(1):78-81
531. Hicks C, Cahn P, Ward D, Lazzarin A, Jelaska A, Drulak M, et al. Tripranavir/r maintains long term virological suppression in highly treatment experienced patients –Three year follow-up RESIST. 11th European AIDS Conference, Madrid, October 24-27 2007. Abstract P7.3/25.
532. Moyle G. Metabolic issues associated with protease inhibitors. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 45 Suppl 1:S19-S26
533. Smith KY, Weinberg WG, DeJesus E, Fischl MA, Liao Q, Ross LL et al. Fosamprenavir or atazanavir once daily boosted with ritonavir 100 mg, plus tenofovir/emtricitabine, for the initial treatment of HIV infection: 48-week results of ALERT. *AIDS Res Ther* 2008; 5:5
534. Martinez E, Arranz JA, Podzamczar D, Lonca M, Sanz J, Barragan P et al. A simplification trial switching from nucleoside reverse transcriptase inhibitors to once-daily fixed-dose abacavir/lamivudine or tenofovir/emtricitabine in HIV-1-infected patients with virological suppression. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 51(3):290-297
535. Walmsley S, Ruxrungtham K, Slim J, et al. Saquinavir/r BiD versus lopinavir/r BiD, plus emtricitabine/tenofovir QD as initial therapy in HIV-1 infected patients: the GEMINI study. 11th European AIDS Conference, Madrid, October 24-27 2007. Abstract PS1/4.
536. Mallolas J, Podzamczar D, Domingo P, Clotet B, Ribera E, Gutiérrez F. Efficacy and safety of switching from boosted lopinavir (LPV/r) to boosted atazanavir (ATV/r) in patients with virologic suppression receiving a LPV/r-containing HAART: the AZATIP study. 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Sydney, July 22-25 2007. Abstract WEPEB117LB.
537. Martinez E, Arranz JA, Podzamczar D, Ribera E, Roca V, et al. Efficacy and safety of NRTI's switch to tenofovir plus emtricitabine (Truvada) vs. abacavir plus lamivudine (Kivexa) in patients with virologic suppression receiving a lamivudine containing HAART: The BICOMBO study. 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Sydney, July 22-25 2007. Abstract WESS102.
538. Tomaka F, Lefebvre E, Sekar V, Van BB, Vangeneugden T, Vandevoorde A et al. Effects of ritonavir-boosted darunavir vs. ritonavir-boosted atazanavir on lipid and glucose parameters in HIV-negative, healthy volunteers. *HIV Med* 2009; 10(5):318-327
539. Lundgren JD, Battegay M, Behrens G, De WS, Guaraldi G, Katlama C et al. European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines on the prevention and management of metabolic diseases in HIV. *HIV Med* 2008; 9(2):72-81
540. Polo R, Galindo MJ, Martinez E, Alvarez J, Arevalo JM, Asensi V et al. Recomendaciones de GEAM/SPNS sobre el tratamiento de las alteraciones metabólicas y morfológicas en el paciente con infección por VIH. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2006; 24(2):96-117
541. Llibre JM, Domingo P, Palacios R, Santos J, Perez-Elias MJ, Sanchez-de la RR et al. Sustained improvement of dyslipidaemia in HAART-treated patients replacing stavudine with tenofovir. *AIDS* 2006; 20(10):1407-1414

542. Madruga JR, Cassetti I, Suleiman JM, Etzel A, Zhong L, Holmes CB et al. The safety and efficacy of switching stavudine to tenofovir DF in combination with lamivudine and efavirenz in hiv-1-infected patients: three-year follow-up after switching therapy. *HIV Clin Trials* 2007; 8(6):381-390
543. Moyle G, Fisher M, and the SWEET study group. Switching from Combivir to Truvada preserved limb fat: results of a DEXA sub-study of a 48-week randomized study. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 938.
544. Blumer RM, van Vonderen MG, Sutinen J, Hassink E, Ackermans M, van Agtmael MA et al. Zidovudine/lamivudine contributes to insulin resistance within 3 months of starting combination antiretroviral therapy. *AIDS* 2008; 22(2):227-236
545. Carr A, Ritzhaupt A, Zhang W, Zajdenverg R, Workman C, Gatell JM et al. Effects of boosted tipranavir and lopinavir on body composition, insulin sensitivity and adipocytokines in antiretroviral-naive adults. *AIDS* 2008; 22(17):2313-2321
546. Brown TT, Li X, Cole SR, Kingsley LA, Palella FJ, Riddler SA et al. Cumulative exposure to nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors is associated with insulin resistance markers in the Multicenter AIDS Cohort Study. *AIDS* 2005; 19(13):1375-1383
547. De Wit S., Sabin CA, Weber R, Worm SW, Reiss P, Cazanave C et al. Incidence and risk factors for new-onset diabetes in HIV-infected patients: the Data Collection on Adverse Events of Anti-HIV Drugs (D:A:D) study. *Diabetes Care* 2008; 31(6):1224-1229
548. Ledergerber B, Furrer H, Rickenbach M, Lehmann R, Elzi L, Hirschel B et al. Factors associated with the incidence of type 2 diabetes mellitus in HIV-infected participants in the Swiss HIV Cohort Study. *Clin Infect Dis* 2007; 45(1):111-119
549. Fleischman A, Johnsen S, Systrom DM, Hrovat M, Farrar CT, Frontera W et al. Effects of a nucleoside reverse transcriptase inhibitor, stavudine, on glucose disposal and mitochondrial function in muscle of healthy adults. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2007; 292(6):E1666-E1673
550. Heera J, Ive P, Botes M, DeJesus E, Mayer H, Goodrich J, et al. The MERIT study of Maraviroc in antiretroviral-naïve patients with R5 HIV-1: 96-week results. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract TuAB103.
551. Bozzette SA, Ake CF, Tam HK, Phippard A, Cohen D, Scharfstein DO et al. Long-term survival and serious cardiovascular events in HIV-infected patients treated with highly active antiretroviral therapy. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2008; 47(3):338-341
552. Holmberg SD, Moorman AC, Williamson JM, Tong TC, Ward DJ, Wood KC et al. Protease inhibitors and cardiovascular outcomes in patients with HIV-1. *Lancet* 2002; 360(9347):1747-1748
553. Mary-Krause M, Cotte L, Simon A, Partisani M, Costagliola D, Clinical Epidemiology Group from the French Hospital Database. Increased risk of myocardial infarction with duration of protease inhibitor therapy in HIV-infected men. *AIDS* 2003; 17:2479-2486
554. Bongiovanni M, Casana M, Cicconi P, Pisacreta M, Codemo R, Pelucchi M et al. Predictive factors of vascular intima media thickness in HIV-positive subjects. *J Antimicrob Chemother* 2008; 61(1):195-199
555. Currier JS, Kendall MA, Henry WK, Ston-Smith B, Torriani FJ, Tebas P et al. Progression of carotid artery intima-media thickening in HIV-infected and uninfected adults. *AIDS* 2007; 21(9):1137-1145
556. Currier JS, Lundgren JD, Carr A, Klein D, Sabin CA, Sax PE et al. Epidemiological evidence for cardiovascular disease in HIV-infected patients and relationship to highly active antiretroviral therapy. *Circulation* 2008; 118(2):e29-e35
557. Lundgren JD, Reiss P, Worms S, Weber R, El-Sadr W, De Wit S, et al. Risk of myocardial infarction with exposure to specific ARV from the PI, NNRTI, and NRTI classes: The D:A:D study. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 44LB.
558. Lang S, Mary-Krause M, Cotte L, Gilquin J, Partisani M, Simon A, et al. Impact of specific NRTI and PI exposure on the risk of myocardial infarction: a case-control study nested with FHDH ANRS CO4. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 43LB.
559. Durand M, Sheehy O, Baril JG, Lelonier J, Tremblay C. Relation between use of nucleosidic reverse transcriptase inhibitors and risk of myocardial infarction: a nested case control study using Quebec's Public Health Insurance Database. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract TuPEB175.
560. Lichtenstein K, Buckner K, Armon C, Tedaldi E, Chmiel J, Wood K, et al. Low CD4 count is an important risk factor for cardiovascular disease in the HIV Outpatient Study (HOPS) in U.S. 17th International AIDS Conference, Mexico DF, 3-8 August 2008. Abstract THPE0236.

561. Benson C, Ribaud H, Zheng E, Koletar S, Smurzynski M, Bosch R, et al. No association of abacavir use with risk of myocardial infarction or severe cardiovascular disease events: results from ACTG A5001. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 721.
562. Bedimo R, Westfall A, Drechsler, H, Tebas P. Abacavir use and risk of acute myocardial infarction and cerebrovascular disease in the HAART era. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract MoAb202.
563. McComsey G, Smith KY, Patel P, Bellos NC, Sloan L, Lackey P, et al. Similar reductions in markers of inflammation and endothelial activation after initiation of abacavir/lamivudine (ABC/3TC) or tenofovir/emtricitabine (TDF/FTC) in the HEAT study. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 732.
564. Martinez E, Larrousse M, Perez I, Lonca M, Podzamczar D, Gutierrez F, et al. No evidence for recent abacavir/ lamivudine use in promoting inflammation, endothelial dysfunction, hypercoagulability, or insulin resistance in virologically suppressed HIV-infected patients: a substudy of the BICOMBO randomized clinical trial (ISRCTN 6189). 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract MoAb203.
565. Martin A, Amin J, Cooper DA, Carr A, Kelleher AD, Bloch M et al. Abacavir does not affect circulating levels of inflammatory or coagulopathic biomarkers in suppressed HIV: a randomized clinical trial. *AIDS* 2010; 24(17):2657-2663
566. Haubrich RH, Riddler SA, DiRienzo AG, Komarow L, Powderly WG, Klingman K et al. Metabolic outcomes in a randomized trial of nucleoside, nonnucleoside and protease inhibitor-sparing regimens for initial HIV treatment. *AIDS* 2009; 23(9):1109-1118
567. McComsey G, Kitch D, Daar E, Tiemey C, Jahed N, Tebas P, et al. Bone and limb fat outcomes of ACTG A5224s, a substudy of ACTG A5202: A prospective, randomized, partially blinded phase III trial of ABC/3TC or TDF/FTC with EFV or ATV/r for initial treatment of HIV infection. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 106LB.
568. Falutz J, Allas S, Mamputu JC, Potvin D, Kotler D, Somero M et al. Long-term safety and effects of tesamorelin, a growth hormone-releasing factor analogue, in HIV patients with abdominal fat accumulation. *AIDS* 2008; 22(14):1719-1728
569. Guaraldi G, Orlando G, De FD, De L, I, Rottino A, De SG et al. Comparison of three different interventions for the correction of HIV-associated facial lipoatrophy: a prospective study. *Antivir Ther* 2005; 10(6):753-759
570. Lo J, You SM, Canavan B, Liebau J, Beltrani G, Koutkia P et al. Low-dose physiological growth hormone in patients with HIV and abdominal fat accumulation: a randomized controlled trial. *JAMA* 2008; 300(5):509-519
571. Moyle GJ, Lysakova L, Brown S, Sibtain N, Healy J, Priest C et al. A randomized open-label study of immediate versus delayed polylactic acid injections for the cosmetic management of facial lipoatrophy in persons with HIV infection. *HIV Med* 2004; 5(2):82-87
572. McComsey GA, Tebas P, Shane E, Yin MT, Overton ET, Huang JS et al. Bone disease in HIV infection: a practical review and recommendations for HIV care providers. *Clin Infect Dis* 2010; 51(8):937-946
573. Grupo de expertos del Plan Nacional sobre el Sida y Gesida. Documento de consenso sobre alteraciones osteoarticulares en la infección por el VIH (Junio 2010). Disponible en: www.gesida.seimc.org/pcientifica/fuentes/DcyRc/gesidadcyrc2010-altoseas.pdf (Acceso 14.12.2010).
574. Stellbrink HJ, Orkin C, Arribas JR, Compston J, Gerstoft J, van WE et al. Comparison of changes in bone density and turnover with abacavir-lamivudine versus tenofovir-emtricitabine in HIV-infected adults: 48-week results from the ASSERT study. *Clin Infect Dis* 2010; 51(8):963-972
575. Gutierrez F, Padilla S, Masia M, Flores J, Boix V, Merino E et al. Osteonecrosis in patients infected with HIV: clinical epidemiology and natural history in a large case series from Spain. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2006; 42(3):286-292
576. Dear Health Care Provider. Important Change in SUSTIVA® (efavirenz) Package Insert . Change from Pregnancy Category C to D. Bristol-Myers Squibb Company. March 2005 .
577. Stein JH. Managing cardiovascular risk in patients with HIV infection. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2005; 38(2):115-123

578. Gupta SK, Eustace JA, Winston JA, Boydston II, Ahuja TS, Rodriguez RA et al. Guidelines for the management of chronic kidney disease in HIV-infected patients: recommendations of the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2005; 40(11):1559-1585
579. Panel de GESIDA y Plan Nacional del Sida. Recomendaciones de GESIDA/SPNS para la evaluación y el tratamiento de las alteraciones renales en pacientes con infección por el VIH (2009). Disponible en: www.gesida.seimc.org/pcientifica/dcconsensos 2009;
580. Tuset M, Miró JM, Codina C, Ribas J, (Editores). Guía de interacciones farmacológicas en VIH. Disponible en: www.interaccionesshiv.com (Acceso 14.12.2010).
581. Evans-Jones JG, Cottle LE, Back DJ, Gibbons S, Beeching NJ, Carey PB et al. Recognition of risk for clinically significant drug interactions among HIV-infected patients receiving antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis* 2010; 50(10):1419-1421
582. Dickinson L, Khoo S, Back D. Pharmacokinetics and drug-drug interactions of antiretrovirals: an update. *Antiviral Res* 2010; 85(1):176-189
583. Back D, Gibbons S, Wilkins E, Burger D, Shapiro J, Marzolini C et al. HIV Drug Interactions website. Disponible en: www.hiv-druginteractions.org 2010; (Acceso 14.12.2010)
584. Cohen C, Shambraw D, Ruane P, Lion R, DeJesus E, Liu H, et al. Single-tablet, fixed-dose regimen of elvitegravir/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate/GS-9350 achieves a high rate of virologic suppression and GS-9350 is an effective booster. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 58LB.
585. German P, Warren D, West S, Hui J, Kearney BP. Pharmacokinetics and bioavailability of an integrase and novel pharmacoenhancer-containing single-tablet fixed-dose combination regimen for the treatment of HIV. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2010; 55(3):323-329
586. Mathias A, Liu HC, Warren D, Sekar V, Kearney BP. Relative bioavailability and pharmacokinetics of Darunavir when boosted with the pharmacoenhancer GS-9350 versus ritonavir. 11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Sorrento, April 7-9 2010. Abstract 28.
587. Mathias AA, German P, Murray BP, Wei L, Jain A, West S et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of GS-9350: a novel pharmacokinetic enhancer without anti-HIV activity. *Clin Pharmacol Ther* 2010; 87(3):322-329
588. Ramanathan S, Warren D, Wei L, Kearney B. Pharmacokinetic Boosting of Atazanavir with the Pharmacoenhancer GS-9350 versus Ritonavir. 49th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, September 12-15 2009. Abstract A1-1301.
589. Ray AS, Tong L, Robinson LK, Kearney B, Rhodes GR. Role of intestinal absorption in increased tenofovir exposure when tenofovir disoproxil fumarate is co-administered with atazanavir or lopinavir/ritonavir. 7th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Lisbon, April 20-22 2006. Abstract 49.
590. Ray AS, Cihlar T, Robinson LK, Tong L, Vela JE, Wieman ML, et al. Mechanism of active tubular secretion of tenofovir and potential for a renal drug-drug interactions with HIV protease inhibitors. 7th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Lisbon, April 20-22 2006. Abstract 39.
591. Crane H, Harrington R, Van Rompaey SE, Kitahata M. Didanosine and lower baseline body weight are associated with declining renal function among patients receiving tenofovir. 13th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Denver, February 5-8, 2006. Abstract 780.
592. Jao J, Wyatt CM. Antiretroviral medications: adverse effects on the kidney. *Adv Chronic Kidney Dis* 2010; 17(1):72-82
593. Zimmermann AE, Pizzoferrato T, Bedford J, Morris A, Hoffman R, Braden G. Tenofovir-associated acute and chronic kidney disease: a case of multiple drug interactions. *Clin Infect Dis* 2006; 42(2):283-290
594. Kearney BP, Mathias A, Mittan A, Sayre J, Ebrahimi R, Cheng AK. Pharmacokinetics and safety of tenofovir disoproxil fumarate on coadministration with lopinavir/ritonavir. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2006; 43(3):278-283
595. Fux C, Opravil M, Cavassini M, Calmy A, Flepp M, Gurtner-Delafuente V, et al. Tenofovir and PI use are associated with an increased prevalence of proximal renal tubular dysfunction in the Swiss HIV cohort study. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 743.
596. Lee L, Soon GH, Shen P, Young EL, Flexner C, Pham P. Effect of efavirenz and darunavir/ritonavir on bilirubin levels in healthy adult volunteers: role of induction of UGT1A1 and bile efflux transporters.

11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Sorrento, April 7-9 2010.
Abstract 27.

597. Schöller-Gyüre M, Kakuda TN, Stevens T, Aharchi F, de Smedt G, Peeters M, et al. Effect of etravirine on cytochrome P450 isozymes assessed by the Cooperstown 5+1 cocktail. 48th Annual ICCAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington DC, October 25-28 2008. Abstract A-955.
598. Schöller-Gyüre M, Kakuda TN, Raoof A, de SG, Hoetelmans RM. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of etravirine. *Clin Pharmacokinet* 2009; 48(9):561-574
599. Kharasch ED, Mitchell D, Coles R, Blanco R. Rapid clinical induction of hepatic cytochrome P4502B6 activity by ritonavir. *Antimicrob Agents Chemother* 2008; 52(5):1663-1669
600. Yeh RF, Gaver VE, Patterson KB, Rezk NL, Baxter-Meheux F, Blake MJ et al. Lopinavir/ritonavir induces the hepatic activity of cytochrome P450 enzymes CYP2C9, CYP2C19, and CYP1A2 but inhibits the hepatic and intestinal activity of CYP3A as measured by a phenotyping drug cocktail in healthy volunteers. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2006; 42(1):52-60
601. Vourvahis M, Dumond J, Patterson K, Rezk N, Tien H, Li J, et al. Effects of tipranavir/ritonavir (TPV/r) on the activity of cytochrome p450 (CYP) enzymes 1A2, 2C9, and 2D6 in healthy volunteers. 8th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Budapest, April 16-18 2007. Abstract 52.
602. Carter NJ, Keating GM. Maraviroc. *Drugs* 2007; 67(15):2277-2288
603. Hyland R, Dickins M, Collins C, Jones H, Jones B. Maraviroc: in vitro assessment of drug-drug interaction potential. *Br J Clin Pharmacol* 2008; 66(4):498-507
604. Yost R, Pasquale TR, Sahloff EG. Maraviroc: a coreceptor CCR5 antagonist for management of HIV infection. *Am J Health Syst Pharm* 2009; 66(8):715-726
605. Perry CM. Maraviroc: a review of its use in the management of CCR5-tropic HIV-1 infection. *Drugs* 2010; 70(9):1189-1213
606. Raltegravir. Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertfordshire, Reino Unido. Septiembre 2010. Disponible en: www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000860/WC500037405.pdf Acceso: 21.10.2010.
607. Burger DM. Raltegravir: a review of its pharmacokinetics, pharmacology and clinical studies. *Expert Opin Drug Metab Toxicol* 2010; 6(9):1151-1160
608. Croxtall JD, Lyseng-Williamson KA, Perry CM. Raltegravir. *Drugs* 2008; 68(1):131-138
609. Evering TH, Markowitz M. Raltegravir (MK-0518): an integrase inhibitor for the treatment of HIV-1. *Drugs Today (Barc)* 2007; 43(12):865-877
610. Iwamoto M, Wenning LA, Mistry GC, Petry AS, Liou SY, Ghosh K et al. Atazanavir modestly increases plasma levels of raltegravir in healthy subjects. *Clin Infect Dis* 2008; 47(1):137-140
611. Ofotokun I, Acosta EP, Lennox JL, Pan Y, Easley KA. Pharmacokinetics of an indinavir-ritonavir-fosamprenavir regimen in patients with human immunodeficiency virus. *Pharmacotherapy* 2008; 28(1):74-81
612. Peytavin G, Chazallon C, Descamps D, Capitant C, Katlama C, Pialoux G, et al. Pharmacokinetic, safety and efficacy of two dual PI regimens (FPV/r bid/ATV qd and SQV/ATV/r qd) for the treatment of antiretroviral-naïve HIV-1 subjects: a randomized pilot study (ANRS 127). 9th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, New Orleans, April 7-9 2008. Abstract P39.
613. Moltó J, Llibre JM, Valle M, Miranda C, Cedeño S, Pérez Alvarez N, et al. The effect of nevirapine on the steady-state through concentrations of atazanavir/ritonavir. 9th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, New Orleans, April 7-9 2008. Abstract P20.
614. Rhame F, Long M, Acosta E. RAL-KAL: Pharmacokinetics of coadministered Raltegravir and Lopinavir-Ritonavir in healthy adults. 9th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, New Orleans, April 7-9 2008. Abstract O19.
615. Ng J, Klein C, Xiong J, Chiu YL, Doan T, Rolle C, et al. Lopinavir/Ritonavir 500/125 mg Twice-daily + Efavirenz Approximate the Pharmacokinetic Exposure of LPV/r 400/100 mg Twice-daily Administered Alone in Healthy Adult Subjects. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 765.
616. Khanlou H, Allavena C, Billaud E, McKellar M, Reliquet V. Development of hepatic cytolysis after switching from enfuvirtide to raltegravir in virologically suppressed patients treated with

- tipranavir/ritonavir. 17th International AIDS Conference, Mexico DF, 3-8 August 2008. Abstract TUPE0087.
617. Hanley WD, Wenning LA, Moreau A, Kost JT, Mangin E, Shamp T et al. Effect of tipranavir-ritonavir on pharmacokinetics of raltegravir. *Antimicrob Agents Chemother* 2009; 53(7):2752-2755
 618. Lubner A, Condoluci D, Slowinski P, Loui S, Morwinkin N, Pappa K, et al. Steady-state pharmacokinetics of maraviroc and amprenavir alone and in combination after maraviroc is given BID with unboosted or ritonavir boosted fosamprenavir once- or twice-daily in fasted healthy volunteers. 10th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Amsterdam, April 15-17, 2009. Abstract P-31.
 619. Lee LS, Soon GH, Shen P, Flexner C, Pham P. Pharmacokinetics of darunavir 900 mg and ritonavir 100 mg once daily when co-administered with efavirenz 600 mg once daily in healthy adult volunteers. 10th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Amsterdam, April 15-17, 2009. Abstract P-29.
 620. Schöller-Gyüre M, Kakuda NT, Akuma SH, DeClerq I, De Smedt G, et al. Pharmacokinetic interaction between etravirine and lopinavir/ritonavir. 49th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, September 12-15 2009. Abstract A1-1298.
 621. Lubner A, Slovinski D, Acosta E, Pakes G, Pappa K, Condoluci D, et al. Steady-state pharmacokinetics of fosamprenavir and raltegravir alone and combined with unboosted and ritonavir-boosted fosamprenavir. 49th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, September 12-15 2009. Abstract A1-1297.
 622. Wittkop L, Breilh D, Da SD, Duffau P, Mercie P, Raymond I et al. Virological and immunological response in HIV-1-infected patients with multiple treatment failures receiving raltegravir and optimized background therapy, ANRS CO3 Aquitaine Cohort. *J Antimicrob Chemother* 2009; 63(6):1251-1255
 623. Sekar V, Lefebvre E, Marien K, De PM, Vangeneugden T, Pozniak A et al. Pharmacokinetic interaction between nevirapine and darunavir with low-dose ritonavir in HIV-1-infected patients. *Br J Clin Pharmacol* 2009; 68(1):116-119
 624. Anderson MS, Kakuda TN, Hanley W, Miller J, Kost JT, Stoltz R et al. Minimal pharmacokinetic interaction between the human immunodeficiency virus nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor etravirine and the integrase inhibitor raltegravir in healthy subjects. *Antimicrob Agents Chemother* 2008; 52(12):4228-4232
 625. Andrews E, Glue P, Fang J, Crownover P, Tressler R, Damle B. Assessment of the pharmacokinetics of co-administered maraviroc and raltegravir. *Br J Clin Pharmacol* 2010; 69(1):51-57
 626. Baroncelli S, Villani P, Weimer LE, Ladisa N, Francisci D, Tommasi C et al. Raltegravir plasma concentrations in treatment-experienced patients receiving salvage regimens based on raltegravir with and without maraviroc coadministration. *Ann Pharmacother* 2010; 44(5):838-843
 627. Barrail-Tran A, Yazdanpanah Y, Fagard C, Colin C, Piketti C, Katlama C, et al. Lack of Interaction between Etravirine and Raltegravir plus Darunavir/Ritonavir When Combined in Treatment-experienced Patients: A Substudy of the ANRS 139 TRIO Trial. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 606.
 628. Fagard C, Descamps D, Dubar V, Colin C, Taburet AM, Roquebert B, et al. Efficacy and safety of raltegravir plus etravirine and darunavir/ritonavir in treatment-experienced patients with multidrug-resistant virus: 48-week results from the ANRS 139 TRIO trial. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract TUPDB204.
 629. Imaz A, del Sz SV, Ribas MA, Curran A, Caballero E, Falco V et al. Raltegravir, etravirine, and ritonavir-boosted darunavir: a safe and successful rescue regimen for multidrug-resistant HIV-1 infection. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 52(3):382-386
 630. la Porte CJ, Sabo JP, Beique L, Cameron DW. Lack of effect of efavirenz on the pharmacokinetics of tipranavir-ritonavir in healthy volunteers. *Antimicrob Agents Chemother* 2009; 53(11):4840-4844
 631. Menard A, Solas C, Mokthari S, Bregigeon S, Drogoul MP, Tamalet C et al. Etravirine-raltegravir, a marked interaction in HIV-1-infected patients: about four cases. *AIDS* 2009; 23(7):869-871
 632. Muret P, Piedoux S, Foltzer A, Beguinot I, Boyer L, Burty C, et al. Pk/pd of raltegravir, etravirine and darunavir/r when used in combination as salvage therapy. 12th European AIDS Conference, Cologne, November 11-14 2009. Abstract PE4.1/5.
 633. Soon GH, Shen P, Yong EL, Pham P, Flexner C, Lee L. Pharmacokinetics of darunavir at 900 milligrams and ritonavir at 100 milligrams once daily when coadministered with efavirenz at 600 milligrams once daily in healthy volunteers. *Antimicrob Agents Chemother* 2010; 54(7):2775-2780

634. Tommasi C, Tempestilli M, Bellagamba R, Notari S, Nicastrì E, Pucillo LP, et al. Pharmacokinetics of darunavir/ritonavir, raltegravir and etravirine co-administered in HIV-1 infected patients. 10th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Amsterdam, April 15-17, 2009. Abstract O-11.
635. Sekar VJ, Lefebvre E, De MT, Spinosa-Guzman S, De PM, De PE et al. Pharmacokinetics of darunavir (TMC114) and atazanavir during coadministration in HIV-negative, healthy volunteers. *Drugs R D* 2007; 8(4):241-248
636. Haas D, Koletar S, Laughlin L, Kendall M, Suckow C, Gerber J, et al. Hepatic Transaminase Elevations and Gastrointestinal Intolerance when HIV-negative Healthy Volunteers on Rifampin add Twice-daily Atazanavir (300 mg)/Ritonavir (100 mg): ACTG Protocol A5213. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 766b.
637. Nijland HM, L'homme RF, Rongen GA, van UP, van CR, Boeree MJ et al. High incidence of adverse events in healthy volunteers receiving rifampicin and adjusted doses of lopinavir/ritonavir tablets. *AIDS* 2008; 22(8):931-935
638. Centers for Disease Control and Prevention. Managing drug interactions in the treatment of HIV-related tuberculosis (online). Disponible en: www.cdc.gov/tb/publications/guidelines/TB_HIV_Drugs/PDF/tbhiv.pdf (Acceso 14.12.2010).
639. Wenning LA, Hanley WD, Brainard DM, Petry AS, Ghosh K, Jin B et al. Effect of rifampin, a potent inducer of drug-metabolizing enzymes, on the pharmacokinetics of raltegravir. *Antimicrob Agents Chemother* 2009; 53(7):2852-2856
640. Khachi H, O'Connell R, Ladenheim D, Orkin C. Pharmacokinetic interactions between rifabutin and lopinavir/ritonavir in HIV-infected patients with mycobacterial co-infection. *J Antimicrob Chemother* 2009; 64(4):871-873
641. Brainard DM, Petry AS, Hanley WD, Wenning LA, Jin B, Breidinger S, et al. Doubling the dose of raltegravir does not increase trough levels in the presence of rifampin. 48th Annual ICCAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington DC, October 25-28 2008. Abstract A-964.
642. Swaminathan S, Padmapriyadarsini C, Venkatesan P, Narendran G, Kumar R, Iliayas S, et al. Once-daily nevirapine vs efavirenz in the treatment of HIV-infected patients with TB: A randomized clinical trial. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 35.
643. Bonora S, Di PG. Interactions between antiretroviral agents and those used to treat tuberculosis. *Curr Opin HIV AIDS* 2008; 3(3):306-312
644. Ello F, Bissagnene E, Eholié S, Polneau S, Moutomé K, Tanon A, et al. A randomized clinical trial of efavirenz 600mg/day versus 800mg/day in HIV-infected patients with tuberculosis receiving rifampicin in Abidjan (Cote d'Ivoire). 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract TUPEB142.
645. Boule A, van CG, Cohen K, Hilderbrand K, Mathee S, Abrahams M et al. Outcomes of nevirapine- and efavirenz-based antiretroviral therapy when coadministered with rifampicin-based antitubercular therapy. *JAMA* 2008; 300(5):530-539
646. Brainard DM, Petry AS, Fang L, Lui C, Breidinger SA, Denoia EP, et al. Lack of a clinically important effect of rifabutin on raltegravir pharmacokinetics. 49th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, September 12-15 2009. Abstract A1-1296.
647. Jenny-Avital ER, Joseph K. Rifamycin-resistant Mycobacterium tuberculosis in the highly active antiretroviral therapy era: a report of 3 relapses with acquired rifampin resistance following alternate-day rifabutin and boosted protease inhibitor therapy. *Clin Infect Dis* 2009; 48(10):1471-1474
648. Manosuthi W, Sungkanuparph S, Tantanathip P, Lueangniyomkul A, Mankatitham W, Prasithsirskul W et al. A randomized trial comparing plasma drug concentrations and efficacies between 2 nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitor-based regimens in HIV-infected patients receiving rifampicin: the N2R Study. *Clin Infect Dis* 2009; 48(12):1752-1759
649. Boulanger C, Hollender E, Farrell K, Stambaugh JJ, Maasen D, Ashkin D et al. Pharmacokinetic evaluation of rifabutin in combination with lopinavir-ritonavir in patients with HIV infection and active tuberculosis. *Clin Infect Dis* 2009; 49(9):1305-1311
650. Decloedt EH, Maartens G, Smith P, Merry C, McIlleron H. The pharmacokinetics of Lopinavir in South African HIV-infected volunteers receiving rifampicin with adjusted doses of Lopinavir/ritonavir. 11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Sorrento, April 7-9 2010. Abstract 47.

651. Klein R, Struble K. U.S. Food and Drug Administration. New label information affecting all approved protease inhibitors for treatment of HIV. HIV Update April 27, 2010
652. Cohen K, Grant A, Dandara C, McIlleron H, Pemba L, Fielding K et al. Effect of rifampicin-based antitubercular therapy and the cytochrome P450 2B6 516G>T polymorphism on efavirenz concentrations in adults in South Africa. *Antivir Ther* 2009; 14(5):687-695
653. Cohen K, Meintjes G. Management of individuals requiring antiretroviral therapy and TB treatment. *Curr Opin HIV AIDS* 2010; 5(1):61-69
654. Bruce RD, Altice FL, Moody DE, Morse GD, Andrews L, Lin SN et al. Pharmacokinetic interactions between buprenorphine/naloxone and once-daily lopinavir/ritonavir. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2010; 54(5):511-514
655. Bruce RD, Kresina TF, Cance-Katz EF. Medication-assisted treatment and HIV/AIDS: aspects in treating HIV-infected drug users. *AIDS* 2010; 24(3):331-340
656. Nieminen TH, Hagelberg NM, Saari TI, Neuvonen M, Neuvonen PJ, Laine K et al. Oxycodone concentrations are greatly increased by the concomitant use of ritonavir or lopinavir/ritonavir. *Eur J Clin Pharmacol* 2010; 66(10):977-985
657. Anderson MS, Luk JM, Hanley WD, Jin B, Reisenberg RA, Wenning LA, et al. Effect of raltegravir on the pharmacokinetics of methadone. 49th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, September 12-15 2009. Abstract A1-1295.
658. Baker J, Gruber VA, Moody DE, Morse GD, Ma Q, Arenander JN, et al. Interactions between buprenorphine and antiretrovirals: Nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitors didanosine, lamivudine and tenofovir. 49th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, September 12-15 2009. Abstract A1-1306.
659. Bruce R, Altice F, Moody D, Lin S, Fanf W, Sabo JS, et al. Pharmacokinetic interactions between buprenorphine/naloxone and tipranavir/ritonavir in HIV-negative subjects chronically receiving buprenorphine/naloxone. 48th Annual ICCAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington DC, October 25-28 2008. Abstract A-967a.
660. Gallagher DP, Kieran J, Sheehan G, Lambert J, Mahon N, Mallon PW. Ritonavir-boosted atazanavir, methadone, and ventricular tachycardia: 2 case reports. *Clin Infect Dis* 2008; 47(3):e36-e38
661. Schöller-Gyüre M, van den BW, Kakuda TN, Woodfall B, de SG, Vanaken H et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic study of the concomitant administration of methadone and TMC125 in HIV-negative volunteers. *J Clin Pharmacol* 2008; 48(3):322-329
662. Sekar VJ, Tomaka F, Meyvisch P, De Pauw M, Spinosa-Guzman S, Vangeneugden T, Ettenhofer ML. Pharmacokinetic interaction between darunavir in combination with low-dose ritonavir and buprenorphine/naloxone. 49th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, September 12-15 2009. Abstract H-232.
663. Busti AJ, Bain AM, Hall RG, Bedimo RG, Leff RD, Meek C et al. Effects of atazanavir/ritonavir or fosamprenavir/ritonavir on the pharmacokinetics of rosuvastatin. *J Cardiovasc Pharmacol* 2008; 51(6):605-610
664. van der Lee M, Sankatsing R, Schippers E, Vogel M, Fatkenheuer G, van d, V et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of combined use of lopinavir/ritonavir and rosuvastatin in HIV-infected patients. *Antivir Ther* 2007; 12(7):1127-1132
665. Kiser JJ, Gerber JG, Predhomme JA, Wolfe P, Flynn DM, Hoody DW. Drug/Drug interaction between lopinavir/ritonavir and rosuvastatin in healthy volunteers. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2008; 47(5):570-578
666. Van Luin M, Colbers A, van Ewijk-Beneken-Kolmer EW, Verweij-Van Wissen C, Schouwenberg B, Hoitsma A, et al. Drug-drug interactions between raltegravir and pravastatin in healthy volunteers. 11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Sorrento, April 7-9 2010. Abstract 29.
667. Aquilante C, Kiser JJ, Anderson P, Christians U, Kosmiski L, Schniedewinnd B, et al. Influence of SLCO1B1 polymorphisms on pharmacokinetic variability in the drug-drug interaction between darunavir/ritonavir and pravastatin. 50th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Boston, September 12-15 2010. Abstract A1-2007.
668. Fichtenbaum CJ, Samineri D, Moore E, Sharma S, Sallans L, Desai P, et al. Darunavir/ritonavir (DRV/r) increases rosuvastatin (RSV) concentrations but does not alter lipid-lowering effect in healthy volunteers. 18th International AIDS Conference, Vienna, July 18-23 2010. Abstract WEPE0101.

669. Busse KH, Hadigan C, Chairez C, Alfaro RM, Formentini E, Kovacs JA et al. Gemfibrozil concentrations are significantly decreased in the presence of lopinavir-ritonavir. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 52(2):235-239
670. Pham PA, la Porte CJ, Lee LS, van HR, Sabo JP, Elgadi MM et al. Differential effects of tipranavir plus ritonavir on atorvastatin or rosuvastatin pharmacokinetics in healthy volunteers. *Antimicrob Agents Chemother* 2009; 53(10):4385-4392
671. Kostapanos MS, Milionis HJ, Elisaf MS. Rosuvastatin-associated adverse effects and drug-drug interactions in the clinical setting of dyslipidemia. *Am J Cardiovasc Drugs* 2010; 10(1):11-28
672. Jackson A, Moyle G, Watson V, Back D, Khoo S, Higgs C, et al. Variability in steady state raltegravir pharmacokinetics, impact of ezetimibe? 10th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Amsterdam, April 15-17, 2009. Abstract P-25.
673. Berenguer J, Von Wichmann MA, Quereda C, Miralles P, Mallolas J, López Aldeguer J, et al. Effect of accompanying antiretroviral drugs on virologic response to PEG-IFN and ribavirin in HIV/HCV-coinfected patients. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 663.
674. Rodriguez-Torres M, Slim J, Bhatti L, Sterling R, Sulkowski M, Hassanein T, et al. Impact of zidovudine on hematologic parameters during treatment with peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C in HIV/HCV co-infected patients enrolled in a large randomized double-blind study. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 664.
675. Amorosa V, Slim J, Mounzer K, Bruno C, Hoffman-Terry M, Dorey-Stein Z, et al. Abacavir use is not associated with lack of virologic response in ARV-treated HIV/HCV-co-infected patients receiving pegylated interferon and ribavirin. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 850.
676. van Heeswijk R, Gysen V, Boogaerts G, De Paepe E, Vangeneugden T, De Backer K, et al. The pharmacokinetic interaction between tenofovir disoproxil fumarate and the investigational HCV protease inhibitor telaprevir. 48th Annual ICCAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington DC, October 25-28 2008. Abstract A-966.
677. Vispo E, Barreiro P, Pineda JA, Mira JA, Girón JA. Higher rate of failure to pegylated-interferon plus ribavirin in HIV+ patients with chronic hepatitis C receiving abacavir. *Antivir Ther* 2008; 13:428-437
678. González-García JJ, Berenguer J, Condes E, Quereda C, Labarga P, Laguno M, et al. The use of TDF+ 3TC/FTC is associated with an improved response to pegylated interferon + ribavirin in HIV/HCV-co-infected patients receiving HAART: The Gesida 50/06 study. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 1076.
679. Mira J, López-Cortés L, Barreiro P, Tural C, Torres-Tortosa M, de los Santos Gil I, et al. Efficacy of Pegylated Interferon + Ribavirin Treatment in HIV/HCV-co-infected Patients Receiving Abacavir + Lamivudine or Tenofovir + either Lamivudine or Emtricitabine as Nucleoside Analogue Backbone. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 1074.
680. Moreno A, Quereda C, Muriel A, Pérez-Elias M, Casado J, Dronda F, et al. Does the Choice of NRTI Have a Significant Influence on the Outcome of pegIFN plus Ribavirin among HIV/HCV-co-infected Patients? 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 1075.
681. Vfend® (voriconazol). Información técnica del producto. Agencia Europea del Medicamento (EMA). Revisado: 23/09/2010. Disponible en: www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000387/WC500049756.pdf (Acceso 13.11.2010).
682. Brüggermann R, Van Luin M, van den Dungen M, Colbers A, Schouwenberg B, le Blanc R, et al. Bidirectional pharmacokinetic interaction between posaconazole and fosamprenavir. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 621.
683. Carten M, Kiser JJ, Kwara A, MaWhinney S, Cu-Uvin S. Pharmacokinetic interactions between the hormonal emergency contraception, levonorgestrel, and efavirenz. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 934.
684. Cingolani A, Torti L, Pinnetti C, de Gaetano DK, Murri R, Tacconelli E et al. Detrimental clinical interaction between ritonavir-boosted protease inhibitors and vinblastine in HIV-infected patients with Hodgkin's lymphoma. *AIDS* 2010; 24(15):2408-2412
685. Corti N, Heck A, Rentsch K, Zingg W, Jetter A, Stieger B et al. Effect of ritonavir on the pharmacokinetics of the benzimidazoles albendazole and mebendazole: an interaction study in healthy volunteers. *Eur J Clin Pharmacol* 2009; 65(10):999-1006

686. Hardy H, Backman ES, Farber HW. Successful bosentan and nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-based therapy in a patient with acquired immunodeficiency syndrome and pulmonary arterial hypertension. *Pharmacotherapy* 2010; 30(4):139e-144e
687. Kredo T, Van der Walt JS, Mauff K, Smith P, Cohen K, Maartens G, et al. Nevirapine increases lumefantrine exposure in HIV-infected patient. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 603.
688. Liedtke MD, Rathbun RC. Drug interactions with antiretrovirals and warfarin. *Expert Opin Drug Saf* 2010; 9(2):215-223
689. Marfo K, Greenstein S. Antiretroviral and immunosuppressive drug-drug interactions in human immunodeficiency virus-infected liver and kidney transplant recipients. *Transplant Proc* 2009; 41(9):3796-3799
690. Mir O, ssard-Diana B, Louet AL, Louergue P, Viard JP, Langlois A et al. Severe toxicity related to a pharmacokinetic interaction between docetaxel and ritonavir in HIV-infected patients. *Br J Clin Pharmacol* 2010; 69(1):99-101
691. Mounier N, Katlama C, Costagliola D, Chichmanian RM, Spano JP. Drug interactions between antineoplastic and antiretroviral therapies: Implications and management for clinical practice. *Crit Rev Oncol Hematol* 2009; 72(1):10-20
692. Pollack TM, McCoy C, Stead W. Clinically significant adverse events from a drug interaction between quetiapine and atazanavir-ritonavir in two patients. *Pharmacotherapy* 2009; 29(11):1386-1391
693. Soyinka JO, Onyeji CO, Omoruyi SI, Owolabi AR, Sarma PV, Cook JM. Pharmacokinetic interactions between ritonavir and quinine in healthy volunteers following concurrent administration. *Br J Clin Pharmacol* 2010; 69(3):262-270
694. van LM, Colbers A, Verwey-van Wissen CP, van Ewijk-Beneken-Kolmer EW, van der KM, Hoitsma A et al. The effect of raltegravir on the glucuronidation of lamotrigine. *J Clin Pharmacol* 2009; 49(10):1220-1227
695. Back D, Sekar V, Hoetelmans RM. Darunavir: pharmacokinetics and drug interactions. *Antivir Ther* 2008; 13(1):1-13
696. Brown KC, Paul S, Kashuba AD. Drug interactions with new and investigational antiretrovirals. *Clin Pharmacokinet* 2009; 48(4):211-241
697. Burger DM, Huisman A, Van EN, Neisingh H, van UP, Rongen GA et al. The effect of atazanavir and atazanavir/ritonavir on UDP-glucuronosyltransferase using lamotrigine as a phenotypic probe. *Clin Pharmacol Ther* 2008; 84(6):698-703
698. Ciraci E, Villani P, Stano F, Cusato M, Heichen M, Monno L, et al. Efficacy and safety of TDM-assisted combination therapy with voriconazole plus efavirenz in AIDS patients with cryptococcosis. 9th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, New Orleans, April 7-9 2008. Abstract P18.
699. Corona G, Vaccher E, Sandron S, Sartor I, Tirelli U, Innocenti F et al. Lopinavir-ritonavir dramatically affects the pharmacokinetics of irinotecan in HIV patients with Kaposi's sarcoma. *Clin Pharmacol Ther* 2008; 83(4):601-606
700. Di Biagio A., Rosso R, Siccardi M, D'Avolio A, Bonora S, Viscoli C. Lack of interaction between raltegravir and cyclosporin in an HIV-infected liver transplant recipient. *J Antimicrob Chemother* 2009; 64(4):874-875
701. Fang AF, Damle BD, LaBadie RR, Crownover PH, Hewlett D, Jr., Glue PW. Significant decrease in nelfinavir systemic exposure after omeprazole coadministration in healthy subjects. *Pharmacotherapy* 2008; 28(1):42-50
702. Foisy MM, Yakiwchuk EM, Chiu I, Singh AE. Adrenal suppression and Cushing's syndrome secondary to an interaction between ritonavir and fluticasone: a review of the literature. *HIV Med* 2008; 9(6):389-396
703. German P, Parikh S, Lawrence J, Dorsey G, Rosenthal PJ, Havlir D et al. Lopinavir/ritonavir affects pharmacokinetic exposure of artemether/lumefantrine in HIV-uninfected healthy volunteers. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 51(4):424-429
704. Guaraldi G, Cocchi S, Ciuffi S, Motta A, Pinetti D, Codeluppi M, et al. Different Dose Adjustments of Immunosuppressants are Necessary after Initiating Boosted or Unboosted First Protease Inhibitors Regimen Post-liver Transplantation. 11th European AIDS Conference, Madrid, October 24-27 2007. Abstract P4.2/04.

705. Iwamoto M, Wenning LA, Moreau AR, Hanley WD, Jin B, Breidinger SA, et al. Omeprazole increases plasma levels of raltegravir in healthy subjects. 48th Annual ICCAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington DC, October 25-28 2008. Abstract A-963.
706. Iwamoto M, Kassahun K, Troyer MD, Hanley WD, Lu P, Rhoton A et al. Lack of a pharmacokinetic effect of raltegravir on midazolam: in vitro/in vivo correlation. *J Clin Pharmacol* 2008; 48(2):209-214
707. Ji P, Damle B, Xie J, Unger SE, Grasela DM, Kaul S. Pharmacokinetic interaction between efavirenz and carbamazepine after multiple-dose administration in healthy subjects. *J Clin Pharmacol* 2008; 48(8):948-956
708. Knoll BM, Vento S, Temesgen Z. Etravirine. *Drugs Today (Barc)* 2008; 44(1):23-33
709. Krishna G, Moton A, Ma L, Martinho M, Seiberling M, McLeod J. Effects of oral posaconazole on the pharmacokinetics of atazanavir alone and with ritonavir or with efavirenz in healthy adult volunteers. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2009; 51(4):437-444
710. Mertz D, Battegay M, Marzolini C, Mayr M. Drug-drug interaction in a kidney transplant recipient receiving HIV salvage therapy and tacrolimus. *Am J Kidney Dis* 2009; 54(1):e1-e4
711. Moreno A, Perez-Elias MJ, Casado JL, Fortun J, Quereda C, Bárcena R, et al. Safety and effectiveness of raltegravir-based HAART in HIV-subjects after solid organ transplantation. 49th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, September 12-15 2009. Abstract **H-913**.
712. Moreno A, Barcena R, Quereda C, Casado JL, Perez-Elias MJ, Fortun J et al. Safe use of raltegravir and sirolimus in an HIV-infected patient with renal impairment after orthotopic liver transplantation. *AIDS* 2008; 22(4):547-548
713. Oostendorp RL, Huitema A, Rosing H, Jansen RS, Ter HR, Keessen M et al. Coadministration of ritonavir strongly enhances the apparent oral bioavailability of docetaxel in patients with solid tumors. *Clin Cancer Res* 2009; 15(12):4228-4233
714. Sabo JP, Cong XJ, Haas D, Eskoetter H, Kraft M, Mauss S. Lack of a pharmacokinetic effect between steady-state tipranavir/ritonavir and single-dose valacyclovir in healthy volunteers. 48th Annual ICCAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington DC, October 25-28 2008. Abstract A-967.
715. Schöller-Gyüre M, Kakuda NT, Van Solingen-Ristea RM, Onkelinx J, De Smedt G, Peeters M, et al. No clinically relevant effect of etravirine on digoxin pharmacokinetics in HIV-negative volunteers. 9th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, New Orleans, April 7-9 2008. Abstract P22.
716. Schöller-Gyüre M, Kakuda NT, Van Solingen-Ristea RM, Aharchi F, De Smedt G, Witek J, et al. Pharmacokinetic interaction between etravirine and fluconazole or voriconazole in HIV-negative volunteers. 49th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, September 12-15 2009. Abstract A1-1299.
717. Sekar V, Tomaka F, Lavreys L, Meyvisch P, Bleys C, Da Pawn M, et al. Pharmacokinetic interaction between darunavir in combination with low-dose ritonavir and carbamazepine. 17th International AIDS Conference, Mexico DF, 3-8 August 2008. Abstract TUPE0083.
718. Sekar V, Lefebvre E, De MT, De PM, De PE, Vangeneugden T et al. Effect of repeated doses of darunavir plus low-dose ritonavir on the pharmacokinetics of sildenafil in healthy male subjects: phase I randomized, open-label, two-way crossover study. *Clin Drug Investig* 2008; 28(8):479-485
719. Sekar VJ, Spinosa-Guzman S, De PE, De PM, Vangeneugden T, Lefebvre E et al. Darunavir/ritonavir pharmacokinetics following coadministration with clarithromycin in healthy volunteers. *J Clin Pharmacol* 2008; 48(1):60-65
720. Spak CW, Dhanireddy S, Kosel BW. Clinical interaction between efavirenz and phenytoin. *AIDS* 2008; 22(1):164-165
721. Tappouni HL, Rublein JC, Donovan BJ, Hollowell SB, Tien HC, Min SS et al. Effect of omeprazole on the plasma concentrations of indinavir when administered alone and in combination with ritonavir. *Am J Health Syst Pharm* 2008; 65(5):422-428
722. Tricot L, Teicher E, Peytavin G, Zucman D, Conti F, Calmus Y et al. Safety and efficacy of raltegravir in HIV-infected transplant patients cotreated with immunosuppressive drugs. *Am J Transplant* 2009; 9(8):1946-1952
723. Van Luin M, Van Der Ende ME, Richter C, Visser M, Farag D, Van der Ven A, et al. Drug interactions between atovaquone/proguanil and antiretroviral agents. 10th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Amsterdam, April 15-17, 2009. Abstract O-19.

724. Ribera E, Juárez JC, Montoro JB, (Editores). *Fitoterapia e infección por el VIH. Interacciones entre fármacos antirretrovirales y plantas medicinales*. Madrid: Gráficas Enar S A, 2007
725. Robertson SM, Davey RT, Voell J, Formentini E, Alfaro RM, Penzak SR. Effect of Ginkgo biloba extract on lopinavir, midazolam and fexofenadine pharmacokinetics in healthy subjects. *Curr Med Res Opin* 2008; 24(2):591-599
726. Malati CY, Robertson SM, Hunt JD, Chairez C, Alfaro RA, Kovacs JA, et al. *Echinacea purpurea* does not alter the steady state pharmacokinetics of lopinavir or ritonavir in healthy human volunteers. 49th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, September 12-15 2009. Abstract A1-1307.
727. MacDonald L, Murty M, Foster BC. Antiviral drug disposition and natural health products: risk of therapeutic alteration and resistance. *Expert Opin Drug Metab Toxicol* 2009; 5(6):563-578
728. Izzo AA, Ernst E. Interactions between herbal medicines and prescribed drugs: an updated systematic review. *Drugs* 2009; 69(13):1777-1798
729. Abel S, Ridgway C, Hamlin J, Davis J. An open, parallel group study to compare the pharmacokinetics, safety and toleration of a single oral dose of Maraviroc in subjects with mild and moderate hepatic impairment with subjects with normal hepatic function. 8th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Budapest, April 16-18 2007. Abstract 8.
730. Agarwala S, Eley T, Child M, Wang Y, Persson A, Filoramo D, et al. Pharmacokinetics of Atazanavir in severely renally impaired subjects including those on hemodialysis. 8th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Budapest, April 16-18 2007. Abstract 2.
731. Barreiro P, Rodriguez-Novoa S, Labarga P, Ruiz A, Jimenez-Nacher I, Martin-Carbonero L et al. Influence of liver fibrosis stage on plasma levels of antiretroviral drugs in HIV-infected patients with chronic hepatitis C. *J Infect Dis* 2007; 195(7):973-979
732. Bossi P, Peytavin G, Lamotte C, Calvez V, Bricaire F, Costagliola D et al. High indinavir plasma concentrations in HIV-positive patients co-infected with hepatitis B or C virus treated with low doses of indinavir and ritonavir (400/100 mg twice a day) plus two nucleoside reverse transcriptase inhibitors. *AIDS* 2003; 17(7):1108-1110
733. Breilh D, Guinguene S, de Ledinghen V, Toutain J, Pellegrin JL, Trimoulet P, et al. Pharmacokinetics of Boosted PI and NNRTI in HCV/HIV-co-infected Patients. 14th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Los Angeles, February 25-28 2007. Abstract 946.
734. Chen L, Sabo JP, Philip E, Mao Y, Norris SH, MacGregor TR et al. Steady-state disposition of the nonpeptidic protease inhibitor tipranavir when coadministered with ritonavir. *Antimicrob Agents Chemother* 2007; 51(7):2436-2444
735. Damle B, Hewlett D, Jr., Hsyu PH, Becker M, Petersen A. Pharmacokinetics of nelfinavir in subjects with hepatic impairment. *J Clin Pharmacol* 2006; 46(11):1241-1249
736. Dominguez S, Benhamou Y, Katlama C, Peytavin G. Nevirapine plasma concentrations in HIV/HCV and HIV infected patients, a case control study: NEVADOSE. 7th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Lisbon, April 20-22 2006. Abstract 21.
737. Dragovic G, Smith CJ, Jevtovic D, Grbovic L, Ypole M. The impact of HCV/HIV co-infection on nevirapine plasma concentration in a cohort of patients in Belgrade. 8th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Budapest, April 16-18 2007. Abstract 4.
738. Gatti F, Nasta P, Matti A, Loregian A, Pagni S, Prestini K, et al. Pharmacokinetics of atazanavir in HIV-1-HCV co-infected patients. 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Sydney, July 22-25 2007. Abstract WEPEB008.
739. Gatti F, Pagni S, Nasta P, Boldrin C, Matti A, Loregian A, et al. Potential role of TDM in dosing protease inhibitors in HIV-HCV co-infected patients with or without cirrhosis. 25th International Congress of Chemotherapy, Munich, March 31 - April 3 2007 Abstract.
740. Gill MJ, Ostrop NJ, Fiske WD, Brennan JM. Efavirenz dosing in patients receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis. *AIDS* 2000; 14(8):1062-1064
741. Guaraldi G, Cocchi S, Motta A, Ciaffi S, Codeluppi M, Bonora S et al. A pilot study on the efficacy, pharmacokinetics and safety of atazanavir in patients with end-stage liver disease. *J Antimicrob Chemother* 2008;
742. Gupta SK, Rosenkranz SL, Cramer YS, Koletar SL, Szczech LA, Amorosa V et al. The pharmacokinetics and pharmacogenomics of efavirenz and lopinavir/ritonavir in HIV-infected persons requiring hemodialysis. *AIDS* 2008; 22(15):1919-1927

743. Hermida Donate JM, Quereda C, Moreno A, Hernandez B, Rodriguez MA, Dronda F, et al. Efficacy and safety of atazanavir in HIV-infected patients with liver cirrhosis. 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Sydney, July 22-25 2007. Abstract MOPEB060.
744. Izzedine H, Launay-Vacher V, Jullien V, Aymard G, Duvivier C, Deray G. Pharmacokinetics of tenofovir in haemodialysis. *Nephrol Dial Transplant* 2003; 18(9):1931-1933
745. Jayasekara D, Aweeka FT, Rodriguez R, Kalayjian RC, Humphreys MH, Gambertoglio JG. Antiviral therapy for HIV patients with renal insufficiency. *J Acquir Immune Defic Syndr* 1999; 21(5):384-95
746. Katsounas A, Frank A, Klinker H, Langmann P. Efavirenz-therapy in HIV-patients with underlying liver disease: importance of continuous TDM of EFV. *Eur J Med Res* 2007; 12(8):331-336
747. Kearney BP, Yale K, Shah J, Zhong L, Flaherty JF. Pharmacokinetics and dosing recommendations of tenofovir disoproxil fumarate in hepatic or renal impairment. *Clin Pharmacokinet* 2006; 45(11):1115-1124
748. King JR, Acosta EP. Tipranavir: a novel nonpeptidic protease inhibitor of HIV. *Clin Pharmacokinet* 2006; 45(7):665-682
749. Mallolas J, Perez-Elias MJ, Ortega E, Gutiérrez F, Felizarta F, Bleiber G, et al. Fosamprenavir / ritonavir dose adjustment for patients with mild and moderate hepatic impairment (APV10017). 8th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Budapest, April 16-18 2007. Abstract 1.
750. Micheli V, Regazzi M, Dickinson L, Meraviglia P, Villani P, Khoo SH et al. Lopinavir/ritonavir pharmacokinetics in HIV/HCV-coinfected patients with or without cirrhosis. *Ther Drug Monit* 2008; 30(3):306-313
751. Molto J, Valle M, Blanco A, Negro E, Delavarga M, Miranda C et al. Lopinavir/ritonavir pharmacokinetics in HIV and hepatitis C virus co-infected patients without liver function impairment: influence of liver fibrosis. *Clin Pharmacokinet* 2007; 46(1):85-92
752. Molto J, Negro E, Kaeser B, Gel S, Abt M, Becker M, et al. Nelfinavir pharmacokinetics in patients with HIV mono- and HIV-HCV co-infection. 8th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Budapest, April 16-18 2007. Abstract 9.
753. Morello J, García-Gascó P, Blanco F, Rodríguez-Novoa S, Barreiro P, Maida I, et al. Higher plasma levels of Tipranavir in patients with more significant liver fibrosis and risk of liver toxicity. 8th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Budapest, April 16-18 2007. Abstract 35.
754. Paci-Bonaventure S, Hafi A, Vincent I, Quertainmont Y, Goujard C, Charpentier B et al. Lack of removal of nelfinavir during a haemodialysis session in an HIV-1 infected patient with hepatic and renal insufficiency. *Nephrol Dial Transplant* 2001; 16:642-643
755. Peng JZ, Pulido F, Causemaker SJ, Li J, Lorenzo A, Cepeda C et al. Pharmacokinetics of lopinavir/ritonavir in HIV/hepatitis C virus-coinfected subjects with hepatic impairment. *J Clin Pharmacol* 2006; 46(3):265-274
756. Pereira SA, Caixas U, Branco T, Germano I, Lampreia F, Papoila AL et al. Efavirenz concentrations in HIV-infected patients with and without viral hepatitis. *Br J Clin Pharmacol* 2008; 66(4):551-5
757. Pineda JA, Santos J, Rivero A, bdel-Kader L, Palacios R, Camacho A et al. Liver toxicity of antiretroviral combinations including atazanavir/ritonavir in patients co-infected with HIV and hepatitis viruses: impact of pre-existing liver fibrosis. *J Antimicrob Chemother* 2008; 61(4):925-932
758. Regazzi M, Tinelli C, Villani P, Cusato M, De Silvestri A, Zucchi P, et al. Predictability of individual Nelfinavir concentrations at different time points for total systemic exposure in HIV and HIV/HCV co-infected patients, with and without cirrhosis. 6th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Quebec, April 28-30 2005. Abstract 61.
759. Schöller-Gyüre M, Kakuda NT, De Smedt G, Woodfall B, Berckmans C, Peeters M, et al. Pharmacokinetics of TMC125 in HIV-negative volunteers with mild and moderate hepatic impairment. 47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Chicago, September 17-20 2007. Abstract A-1428.
760. Sekar VJ, Spinosa-Guzman S, De Paepe E, Stevens T, Tomaka F, De Pauw M, et al. Pharmacokinetics of multiple-dose darunavir in combination with low-dose ritonavir in individuals with impaired hepatic function. 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Sydney, July 22-25 2007. Abstract TUPDB05.

761. Spagnuolo V, Gentilini G, De BA, Galli L, Uberti-Foppa C, Soldarini A et al. Liver function parameters in HIV/HCV co-infected patients treated with amprenavir and ritonavir and correlation with plasma levels. *New Microbiol* 2007; 30(3):279-282
762. Taburet AM, Naveau S, Zorza G, Colin JN, Delfraissy JF, Chaput JC et al. Pharmacokinetics of zidovudine in patients with liver cirrhosis. *Clin Pharmacol Ther* 1990; 47(6):731-9
763. Tebas P, Bellos N, Lucasti C, Richmond G, Godofsky E, Patel I, et al. Enfuvirtide does not require dose-adjustment in patients with chronic renal failure: the results of a pharmacokinetic study on enfuvirtide in HIV-1-infected patients with impaired renal function (NP17586). 14th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Los Angeles, February 25-28 2007. Abstract 572.
764. Veronese L, Rautureau J, Sadler BM, Gillotin C, Petite JP, Pillegand B et al. Single-dose pharmacokinetics of amprenavir, a human immunodeficiency virus type 1 protease inhibitor, in subjects with normal or impaired hepatic function. *Antimicrob Agents Chemother* 2000; 44(4):821-6
765. Wyles DL, Gerber JG. Antiretroviral drug pharmacokinetics in hepatitis with hepatic dysfunction. *Clin Infect Dis* 2005; 40(1):174-181
766. Crespo M, Pou L, Esteban JI, Falco V, Ribera E, López R et al. Early monitoring of ribavirin serum concentration is not useful to optimize hepatitis C virus treatment in HIV-coinfected patients. *Antivir Ther* 2007; 12(8):1217-1223
767. Vouvahis M, Fang J, Checcio T, Weatherley B, Heera J. Pharmacokinetics, safety, and tolerability of maraviroc in subjects with various degrees of renal impairment and normal renal function. 11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Sorrento, April 7-9 2010. Abstract 15.
768. McFadyen L, Weatherley B, Vouvahis M. Population modelling of maraviroc pharmacokinetic data when administered with and without saquinavir/ritonavir in subjects with renal dysfunction. 11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Sorrento, April 7-9 2010. Abstract 43.
769. Molto J, Sanz-Moreno J, Valle M, Cedeño S, Bonal J, Bouarich H, Clotet B. Effect of hemodialysis in raltegravir clearance in HIV-infected patients with end stage renal disease. 11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Sorrento, April 7-9 2010. Abstract 7.
770. Tommasi C, Nicastrì E, Gallo AL, Tempestilli M, Bellagamba R, Fezza R, et al. Raltegravir and darunavir plasma pharmacokinetics in HIV-1 infected patients with advanced liver disease. 11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Sorrento, April 7-9 2010. Abstract 10.
771. Von Hentig N, Khaykin P, Stephan C, Nisius G, Bickel M, Haberl A, et al. Hepatitis/HIV co-infection without hepatic impairment does not alter lopinavir plasma concentrations in HIV-1 infected adults. 11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy, Sorrento, April 7-9 2010. Abstract 57.
772. Chang L, Kreuzer C, Farha R, Abr M, Baher L, Tebas P, et al. Effect of moderate liver impairment on the multiple dose pharmacokinetics of ritonavir-boosted saquinavir in HIV patient. 18th International AIDS Conference, Vienna, July 18-23 2010. Abstract WEPE0093.
773. Sekar V, Spinosa-Guzman S, De PE, Stevens T, Tomaka F, De PM et al. Pharmacokinetics of multiple-dose darunavir in combination with low-dose ritonavir in individuals with mild-to-moderate hepatic impairment. *Clin Pharmacokinet* 2010; 49(5):343-350
774. Bonacini M, Louie S, Bzowej N, Wohl AR. Survival in patients with HIV infection and viral hepatitis B or C: a cohort study. *AIDS* 2004; 18(15):2039-2045
775. García García JA, Aguilar-Guisado M, Rivero A, Girón González J, González Serrano M, Merino D, et al. Natural History of Compensated Hepatitis C Virus-related Cirrhosis in HIV-infected Patients. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 1059.
776. Lopez-Dieguez, Gesida 37/03-FIPSE 36465/03 Study Group. Factors Associated with Survival and First Hepatic Decompensation in a Large Prospective Cohort of HIV/HCV-co-infected Patients with Liver Cirrhosis. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 1057.
777. Macias J, Mira JA, Lopez-Cortes LF, Santos I, Giron-Gonzalez JA, Gonzalez-Serrano M et al. Antiretroviral therapy based on protease inhibitors as a protective factor against liver fibrosis progression in patients with chronic hepatitis C. *Antivir Ther* 2006; 11(7):839-846
778. Merchante N, Giron-Gonzalez JA, Gonzalez-Serrano M, Torre-Cisneros J, Garcia-Garcia JA, Arizcorreta A et al. Survival and prognostic factors of HIV-infected patients with HCV-related end-stage liver disease. *AIDS* 2006; 20(1):49-57

779. Qurishi N, Kreuzberg C, Luchters G, Effenberger W, Kupfer B, Sauerbruch T et al. Effect of antiretroviral therapy on liver-related mortality in patients with HIV and hepatitis C virus coinfection. *Lancet* 2003; 362(9397):1708-1713
780. Pineda JA, Garcia-Garcia JA, Guilar-Guisado M, Rios-Villegas MJ, Ruiz-Morales J, Rivero A et al. Clinical progression of hepatitis C virus-related chronic liver disease in human immunodeficiency virus-infected patients undergoing highly active antiretroviral therapy. *Hepatology* 2007; 46(3):622-630
781. Soriano V, Puoti M, Peters M, Benhamou Y, Sulkowski M, Zoulim F et al. Care of HIV patients with chronic hepatitis B: updated recommendations from the HIV-Hepatitis B Virus International Panel. *AIDS* 2008; 22(12):1399-1410
782. Tuyama A, Hong F, Mosoian A, Chen P, Chen B, Fiel I, et al. HIV Entry and Replication in Stellate Cells Promotes Cellular Activation and Fibrogenesis: Implications for Hepatic Fibrosis in HIV/HCV Co-infection. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 57.
783. Carr A, Cooper DA. Adverse effects of antiretroviral therapy. *Lancet* 2000; 356(9239):1423-30
784. Reislter RB, Han C, Burman WJ, Tedaldi EM, Neaton JD. Grade 4 events are as important as AIDS events in the era of HAART. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2003; 34(4):379-386
785. Rivero A, Mira JA, Pineda JA. Liver toxicity induced by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. *J Antimicrob Chemother* 2007; 59(3):342-346
786. Nunez M. Hepatotoxicity of antiretrovirals: incidence, mechanisms and management. *J Hepatol* 2006; 44(1 Suppl):S132-S139
787. Sabin CA. Pitfalls of assessing hepatotoxicity in trials and observational cohorts. *Clin Infect Dis* 2004; 38 Suppl 2:S56-S64
788. AIDS Clinical Trials Group. Table of grading severity of adult adverse experiences. Rockville, MD: US Division of AIDS, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Bethesda, 1996.
789. Sulkowski MS, Thomas DL, Chaisson RE, Moore RD. Hepatotoxicity associated with antiretroviral therapy in adults infected with human immunodeficiency virus and the role of hepatitis C or B virus infection. *JAMA* 2000; 283(1):74-80
790. Saves M, Raffi F, Clevenbergh P, Marchou B, Waldner-Combernoux A, Morlat P. Hepatitis B or hepatitis C virus infection is a risk factor for severe hepatic cytolysis after initiation of protease inhibitor containing antiretroviral regimen in human immunodeficiency virus-infected patients. *Antimicrob Agents Chemother* 2000; 44:3451-3455
791. Sulkowski MS, Thomas DL, Mehta SH, Chaisson RE, Moore RD. Hepatotoxicity associated with nevirapine or efavirenz-containing antiretroviral therapy: role of hepatitis C and B infections. *Hepatology* 2002; 35(1):182-9
792. Aranzabal L, Casado JL, Moya J, Quereda C, Diz S, Moreno A et al. Influence of liver fibrosis on highly active antiretroviral therapy-associated hepatotoxicity in patients with HIV and hepatitis C virus coinfection. *Clin Infect Dis* 2005; 40(4):588-593
793. McGovern BH, Birch C, Zaman MT, Bica I, Stone D, Quirk JR et al. Managing symptomatic drug-induced liver injury in HIV-hepatitis C virus-coinfected patients: a role for interferon. *Clin Infect Dis* 2007; 45(10):1386-1392
794. Labarga P, Soriano V, Vispo ME, Pinilla J, Martin-Carbonero L, Castellares C et al. Hepatotoxicity of antiretroviral drugs is reduced after successful treatment of chronic hepatitis C in HIV-infected patients. *J Infect Dis* 2007; 196(5):670-676
795. Moore KH, Raasch RH, Brouwer KL, Opheim K, Cheeseman SH, Eyster E et al. Pharmacokinetics and bioavailability of zidovudine and its glucuronidated metabolite in patients with human immunodeficiency virus infection and hepatic disease (AIDS Clinical Trials Group protocol 062). *Antimicrob Agents Chemother* 1995; 39(12):2732-7
796. Johnson MA, Horak J, Breuel P. The pharmacokinetics of lamivudine in patients with impaired hepatic function. *Eur J Clin Pharmacol* 1998; 54(4):363-6
797. Schaad HJ, Petty BG, Grasela DM, Christofalo B, Raymond R, Stewart M. Pharmacokinetics and safety of a single dose of stavudine (d4T) in patients with severe hepatic impairment. *Antimicrob Agents Chemother* 1997; 41(12):2793-6
798. Khaliq Y, Gallicano K, Seguin I, Fyke K, Carignan G, Bulman D et al. Single and multiple dose pharmacokinetics of nelfinavir and CYP2C19 activity in human immunodeficiency virus-infected patients with chronic liver disease. *Br J Clin Pharmacol* 2000; 50(2):108-15

799. Arribas J, Pulido F, Peng JZ, Kemmis S, Li JL, Lorenzo A. Evaluation of the multiple-dose pharmacokinetics of lopinavir/ritonavir (LPV/R) in HIV and HCV co-infected subjects with mild or moderate hepatic insufficiency. 9th European AIDS Conference / 1st EACS Resistance & Pharmacology Workshop, Warsaw, October 25-29 2003. Abstract F2/6.
800. Torriani FJ, Rodriguez-Torres M, Rockstroh JK, Lissen E, Gonzalez-Garcia J, Lazzarin A et al. Peginterferon Alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection in HIV-infected patients. *N Engl J Med* 2004; 351(5):438-450
801. Torriani FJ, Rockstroh J, Rodriguez-Torres M, Lissen E, Gonzalez J, Lazzarin A, Carosi G, et al. Final results of APRICOT: A randomized, partially blinded, international trial evaluating peginterferon-alfa-2a + ribavirin vs interferon-alfa-2a + ribavirin in the treatment of HCV in HIV/HCV co-infection. 11th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 8--11 2004. Abstract 112.
802. Perronne C, Carrat F, Bani-Sadr F, Pol S, Rosenthal E, Lunel F, Morand P, Salmon D, et al. Final results of ANRS HC02-RIBAVIC: A randomized controlled trial of pegylated-Interferon-alfa-2b plus ribavirin vs interferon-alfa-2b plus ribavirin for the initial treatment of chronic hepatitis C in HIV co-infected patients. 11th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 8--11 2004. Abstract 117LB.
803. Perez-Olmeda M, Soriano V, Asensi V, Morales D, Romero M, Ochoa A et al. Treatment of chronic hepatitis C in HIV-infected patients with interferon alpha-2b plus ribavirin. *AIDS Res Hum Retroviruses* 2003; 19(12):1083-1089
804. Perez-Olmeda M, Nunez M, Romero M, Gonzalez J, Castro A, Arribas JR et al. Pegylated IFN-alpha2b plus ribavirin as therapy for chronic hepatitis C in HIV-infected patients. *AIDS* 2003; 17(7):1023-1028
805. Laguno M, Murillas J, Blanco JL, Martinez E, Miquel R, Sanchez-Tapias JM et al. Peginterferon alfa-2b plus ribavirin compared with interferon alfa-2b plus ribavirin for treatment of HIV/HCV co-infected patients. *AIDS* 2004; 18(13):F27-F36
806. Chung RT, Andersen J, Volberding P, Robbins GK, Liu T, Sherman KE et al. Peginterferon Alfa-2a plus ribavirin versus interferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C in HIV-coinfected persons. *N Engl J Med* 2004; 351(5):451-459
807. Chung R, Andersen J, Volberding P, Robbins G, Liu T, Sherman K, et al. A randomized, controlled trial of PEG-interferon-alfa-2a plus ribavirin vs interferon-alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C Vvrus infection in HIV-co-infected persons: Follow-up results of ACTG A5071. 11th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 8--11 2004. Abstract 110.
808. Carrat F, Bani-Sadr F, Pol S, Rosenthal E, Lunel-Fabiani F, Benzekri A et al. Pegylated interferon alfa-2b vs standard interferon alfa-2b, plus ribavirin, for chronic hepatitis C in HIV-infected patients: a randomized controlled trial. *JAMA* 2004; 292(23):2839-2848
809. Soriano V, Mocroft A, Rockstroh J, Ledergerber B, Knysz B, Chaplinskas S et al. Spontaneous viral clearance, viral load, and genotype distribution of hepatitis C virus (HCV) in HIV-infected patients with anti-HCV antibodies in Europe. *J Infect Dis* 2008; 198(9):1337-1344
810. Shores NJ, Maida I, Soriano V, Nunez M. Sexual transmission is associated with spontaneous HCV clearance in HIV-infected patients. *J Hepatol* 2008; 49(3):323-328
811. Serpaggi J, Chaix ML, Batisse D, Dupont C, Vallet-Pichard A, Fontaine H et al. Sexually transmitted acute infection with a clustered genotype 4 hepatitis C virus in HIV-1-infected men and inefficacy of early antiviral therapy. *AIDS* 2006; 20(2):233-240
812. Gotz HM, van DG, Niesters HG, den Hollander JG, Thio HB, de ZO. A cluster of acute hepatitis C virus infection among men who have sex with men--results from contact tracing and public health implications. *AIDS* 2005; 19(9):969-974
813. Santantonio T, Fasano M. Therapy of acute hepatitis C: a review of literature. *Curr Pharm Des* 2008; 14(17):1686-1689
814. Jaeckel E, Cornberg M, Wedemeyer H, Santantonio T, Mayer J, Zankel M et al. Treatment of acute hepatitis C with interferon alfa-2b. *N Engl J Med* 2001; 345(20):1452-1457
815. Vogel M, Nattermann J, Baumgarten A, Klausen G, Bieniek B, Schewe K et al. Pegylated interferon-alpha for the treatment of sexually transmitted acute hepatitis C in HIV-infected individuals. *Antivir Ther* 2006; 11(8):1097-1101

816. Soriano V, Puoti M, Sulkowski M, Cargnel A, Benhamou Y, Peters M et al. Care of patients coinfecting with HIV and hepatitis C virus: 2007 updated recommendations from the HCV-HIV International Panel. *AIDS* 2007; 21(9):1073-1089
817. Alvarez D, Dieterich DT, Brau N, Moorehead L, Ball L, Sulkowski MS. Zidovudine use but not weight-based ribavirin dosing impacts anaemia during HCV treatment in HIV-infected persons. *J Viral Hepat* 2006; 13(10):683-689
818. Brau N, Rodriguez-Torres M, Prokupek D, Bonacini M, Giffen CA, Smith JJ et al. Treatment of chronic hepatitis C in HIV/HCV-coinfection with interferon alpha-2b+ full-course vs. 16-week delayed ribavirin. *Hepatology* 2004; 39(4):989-998
819. Garcia-Benayas T, Blanco F, Soriano V. Weight loss in HIV-infected patients. *N Engl J Med* 2002; 347(16):1287-1288
820. Lafeuillade A, Hittinger G, Chadapaud S. Increased mitochondrial toxicity with ribavirin in HIV/HCV coinfection. *Lancet* 2001; 357(9252):280-281
821. Moreno A, Quereda C, Moreno L, Perez-Elias MJ, Muriel A, Casado JL et al. High rate of didanosine-related mitochondrial toxicity in HIV/HCV-coinfecting patients receiving ribavirin. *Antivir Ther* 2004; 9(1):133-138
822. Mauss S, Larrey D, Valenti W, Torriani F, Dieterich D, Pisse S et al. Risk factors for hepatic decompensation in cirrhotic patients with HIV/HCV co-infection treated with pegylated interferon- α or interferon- α and ribavirin, or placebo. *Antivir Ther* 2003; 8(L4)
823. Bani-Sadr F, Carrat F, Pol S, Hor R, Rosenthal E, Goujard C et al. Risk factors for symptomatic mitochondrial toxicity in HIV/hepatitis C virus-coinfecting patients during interferon plus ribavirin-based therapy. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2005; 40(1):47-52
824. Bani-Sadr F, Denoel L, Morand P, Lunel-Fabiani F, Pol S, Cacoub P et al. Early virologic failure in HIV-coinfecting hepatitis C patients treated with the peginterferon-ribavirin combination: does abacavir play a role? *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 45(1):123-125
825. Vispo E, Barreiro P, Pineda JA, Mira JA, Maida I, Martin-Carbonero L et al. Low response to pegylated interferon plus ribavirin in HIV-infected patients with chronic hepatitis C treated with abacavir. *Antivir Ther* 2008; 13(3):429-437
826. Mira JA, Lopez-Cortes LF, Barreiro P, Tural C, Torres-Tortosa M, de Los SG, I et al. Efficacy of pegylated interferon plus ribavirin treatment in HIV/hepatitis C virus co-infected patients receiving abacavir plus lamivudine or tenofovir plus either lamivudine or emtricitabine as nucleoside analogue backbone. *J Antimicrob Chemother* 2008; 62(6):1365-1373
827. Amorosa VK, Slim J, Mounzer K, Bruno C, Hoffman-Terry M, Dorey-Stein Z et al. The influence of abacavir and other antiretroviral agents on virological response to HCV therapy among antiretroviral-treated HIV-infected patients. *Antivir Ther* 2010; 15(1):91-99
828. Laufer N, Laguno M, Perez I, Cifuentes C, Murillas J, Vidal F et al. Abacavir does not influence the rate of virological response in HIV-HCV-coinfecting patients treated with pegylated interferon and weight-adjusted ribavirin. *Antivir Ther* 2008; 13(7):953-957
829. Meynard JL, Lacombe K, Poirier JM, Legrand J, Morand-Joubert L, Girard PM. Influence of liver fibrosis stage on plasma levels of efavirenz in HIV-infected patients with chronic hepatitis B or C. *J Antimicrob Chemother* 2009; 63(3):579-584
830. Rodriguez-Novoa S, Morello J, Gonzalez M, Vispo E, Barreiro P, Gonzalez-Pardo G et al. Increase in serum bilirubin in HIV/hepatitis-C virus-coinfecting patients on atazanavir therapy following initiation of pegylated-interferon and ribavirin. *AIDS* 2008; 22(18):2535-2537
831. Glue P. The clinical pharmacology of ribavirin. *Semin Liver Dis* 1999; 19 Suppl 1:17-24
832. Japour AJ, Lertora JJ, Meehan PM, Erice A, Connor JD, Griffith BP et al. A phase-I study of the safety, pharmacokinetics, and antiviral activity of combination didanosine and ribavirin in patients with HIV-1 disease. AIDS Clinical Trials Group 231 Protocol Team. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retroviro* 1996; 13(3):235-46
833. van Bommel F., Wunsche T, Mauss S, Reinke P, Bergk A, Schurmann D et al. Comparison of adefovir and tenofovir in the treatment of lamivudine-resistant hepatitis B virus infection. *Hepatology* 2004; 40(6):1421-1425
834. Dore GJ, Cooper DA, Pozniak AL, DeJesus E, Zhong L, Miller MD et al. Efficacy of tenofovir disoproxil fumarate in antiretroviral therapy-naive and -experienced patients coinfecting with HIV-1 and hepatitis B virus. *J Infect Dis* 2004; 189(7):1185-1192

835. Schildgen O, Schewe CK, Vogel M, Daumer M, Kaiser R, Weitner L et al. Successful therapy of hepatitis B with tenofovir in HIV-infected patients failing previous adefovir and lamivudine treatment. *AIDS* 2004; 18(17):2325-2327
836. Lim SG, Ng TM, Kung N, Krastev Z, Volfova M, Husa P et al. A double-blind placebo-controlled study of emtricitabine in chronic hepatitis B. *Arch Intern Med* 2006; 166(1):49-56
837. Bang LM, Scott LJ. Emtricitabine: an antiretroviral agent for HIV infection. *Drugs* 2003; 63(22):2413-2424
838. Thio CL, Locarnini S. Treatment of HIV/HBV coinfection: clinical and virologic issues. *AIDS Rev* 2007; 9(1):40-53
839. Ramos B, Nunez M, Martin-Carbonero L, Sheldon J, Rios P, Labarga P et al. Hepatitis B virus genotypes and lamivudine resistance mutations in HIV/hepatitis B virus-coinfected patients. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 44(5):557-561
840. Matthews GV, Bartholomeusz A, Locarnini S, Ayres A, Sasadues J, Seaberg E et al. Characteristics of drug resistant HBV in an international collaborative study of HIV-HBV-infected individuals on extended lamivudine therapy. *AIDS* 2006; 20(6):863-870
841. Suzuki F, Tsubota A, Arase Y, Suzuki Y, Akuta N, Hosaka T et al. Efficacy of lamivudine therapy and factors associated with emergence of resistance in chronic hepatitis B virus infection in Japan. *Intervirology* 2003; 46(3):182-189
842. Bessesen M, Ives D, Condeary L, Lawrence S, Sherman KE. Chronic active hepatitis B exacerbations in human immunodeficiency virus-infected patients following development of resistance to or withdrawal of lamivudine. *Clin Infect Dis* 1999; 28(5):1032-5
843. d'Arminio MA, Gonzalez L, Haberl A, Sherr L, Ssanyu-Sseruma W, Walmsley SL. Better mind the gap: addressing the shortage of HIV-positive women in clinical trials. *AIDS* 2010; 24(8):1091-1094
844. Perez-Elias MJ, Muriel A, Moreno A, Arazo P, Leal M, Navarro G, et al. Relevant changes in features at presentation among HIV infected women in the Spanish AIDS research network cohort (CoRis, 1996-2008). 18th International AIDS Conference, Vienna, July 18-23 2010. Abstract CDC0280.
845. Nicastrì E, Leone S, Angeletti C, Palmisano L, Sarmati L, Chiesi A et al. Sex issues in HIV-1-infected persons during highly active antiretroviral therapy: a systematic review. *J Antimicrob Chemother* 2007; 60(4):724-732
846. Hirsch JS. Gender, sexuality, and antiretroviral therapy: using social science to enhance outcomes and inform secondary prevention strategies. *AIDS* 2007; 21 Suppl 5:S21-S29
847. Collazos J, Asensi V, Carton JA. Sex differences in the clinical, immunological and virological parameters of HIV-infected patients treated with HAART. *AIDS* 2007; 21(7):835-843
848. Tedaldi EM, Absalon J, Thomas AJ, Shlay JC, van dB-W. Ethnicity, race, and gender. Differences in serious adverse events among participants in an antiretroviral initiation trial: results of CPCRA 058 (FIRST Study). *J Acquir Immune Defic Syndr* 2008; 47(4):441-448
849. Prins M, Meyer L, Hessel NA. Sex and the course of HIV infection in the pre- and highly active antiretroviral therapy eras. *AIDS* 2005; 19(4):357-370
850. Struble K, Soon GH, Min M, Chan-Tack K, Murray J, Birnkrant D, et al. Meta-analysis of efficacy outcomes for treatment-naïve and treatment-experienced HIV-infected women in randomized controlled clinical trials: 2000 to 2008. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 987b.
851. Nicastrì E, Angeletti C, Palmisano L, Sarmati L, Chiesi A, Geraci A et al. Gender differences in clinical progression of HIV-1-infected individuals during long-term highly active antiretroviral therapy. *AIDS* 2005; 19(6):577-583
852. Sarner L, Fakoya A. Acute onset lactic acidosis and pancreatitis in the third trimester of pregnancy in HIV-1 positive women taking antiretroviral medication. *Sex Transm Infect* 2002; 78(1):58-59
853. Pernerstorfer-Schoen H, Jilma B, Perschler A, Wichlas S, Schindler K, Schindl A et al. Sex differences in HAART-associated dyslipidaemia. *AIDS* 2001; 15(6):725-734
854. Kumar PN, Rodriguez-French A, Thompson MA, Tashima KT, Averitt D, Wannamaker PG et al. A prospective, 96-week study of the impact of Trizivir, Combivir/nelfinavir, and lamivudine/stavudine/nelfinavir on lipids, metabolic parameters and efficacy in antiretroviral-naïve patients: effect of sex and ethnicity. *HIV Med* 2006; 7(2):85-98

855. Dube MP, Lipshultz SE, Fichtenbaum CJ, Greenberg R, Schechter AD, Fisher SD. Effects of HIV infection and antiretroviral therapy on the heart and vasculature. *Circulation* 2008; 118(2):e36-e40
856. Barzon L, Zamboni M, Pacenti M, Milan G, Bosello O, Federspil G et al. Do oestrogen receptors play a role in the pathogenesis of HIV-associated lipodystrophy? *AIDS* 2005; 19(5):531-533
857. Mulligan K, Anastos K, Justman J, Freeman R, Wichienkuer P, Robison E et al. Fat distribution in HIV-infected women in the United States: DEXA substudy in the Women's Interagency HIV Study. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2005; 38(1):18-22
858. From the Study of Fat Redistribution and Metabolic Change in HIV Infection. Fat distribution in women with HIV infection. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2006; 42(5):562-571
859. Cespedes MS, Aberg JA. Neuropsychiatric complications of antiretroviral therapy. *Drug Saf* 2006; 29(10):865-874
860. Smith CJ, Sabin CA, Youle MS, Lampe FC, Bhagani S, Madge S et al. Response to efavirenz-containing regimens in previously antiretroviral-naive HIV-positive patients: the role of gender. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 46(1):62-67
861. Morrison MF, Petitto JM, Ten HT, Gettes DR, Chiappini MS, Weber AL et al. Depressive and anxiety disorders in women with HIV infection. *Am J Psychiatry* 2002; 159(5):789-796
862. Ickovics JR, Hamburger ME, Vlahov D, Schoenbaum EE, Schuman P, Boland RJ et al. Mortality, CD4 cell count decline, and depressive symptoms among HIV-seropositive women: longitudinal analysis from the HIV Epidemiology Research Study. *JAMA* 2001; 285(11):1466-1474
863. Dolan SE, Carpenter S, Grinspoon S. Effects of weight, body composition, and testosterone on bone mineral density in HIV-infected women. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 45(2):161-167
864. Dolan SE, Huang JS, Killilea KM, Sullivan MP, Aliabadi N, Grinspoon S. Reduced bone density in HIV-infected women. *AIDS* 2004; 18(3):475-483
865. Yin MT, Lu D, Cremers S, Tien PC, Cohen MH, Shi Q et al. Short-term bone loss in HIV-infected premenopausal women. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2010; 53(2):202-208
866. Yin MT, Shane E. Low bone-mineral density in patients with HIV: pathogenesis and clinical significance. *Curr Opin Endocrinol Diabetes* 2006; 13(6):497-502
867. Arnsten JH, Freeman R, Howard AA, Floris-Moore M, Santoro N, Schoenbaum EE. HIV infection and bone mineral density in middle-aged women. *Clin Infect Dis* 2006; 42(7):1014-1020
868. Cejtin HE. Gynecologic issues in the HIV-infected woman. *Infect Dis Clin North Am* 2008; 22(4):709-39
869. Curtis KM, Nanda K, Kapp N. Safety of hormonal and intrauterine methods of contraception for women with HIV/AIDS: a systematic review. *AIDS* 2009; 23 Suppl 1:S55-S67
870. Waters L, Barton S. Contraception and HIV: what do we know and what needs to be done? *J Fam Plann Reprod Health Care* 2006; 32(1):10-14
871. Heikinheimo O, Lahteenmaki P. Contraception and HIV infection in women. *Hum Reprod Update* 2009; 15(2):165-176
872. Mitchell HS, Stephens E. Contraception choice for HIV positive women. *Sex Transm Infect* 2004; 80(3):167-173
873. Sevinsky H, Eley T, He B, Persson A, Garner D, Yones C, et al. Effect of efavirenz on the pharmacokinetics of ethinyl estradiol and norgestimate in healthy female subjects. 48th Annual ICCAC/IDSA 46th Annual Meeting, Washington DC, October 25-28 2008. Abstract A598.
874. El-Ibiary SY, Cocohoba JM. Effects of HIV antiretrovirals on the pharmacokinetics of hormonal contraceptives. *Eur J Contracept Reprod Health Care* 2008; 13(2):123-132
875. Chu JH, Gange SJ, Anastos K, Minkoff H, Cejtin H, Bacon M et al. Hormonal contraceptive use and the effectiveness of highly active antiretroviral therapy. *Am J Epidemiol* 2005; 161(9):881-890
876. Mildvan D, Yarrish R, Marshak A, Hutman HW, McDonough M, Lamson M et al. Pharmacokinetic interaction between nevirapine and ethinyl estradiol/norethindrone when administered concurrently to HIV-infected women. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2002; 29(5):471-477
877. Ouellet D, Hsu A, Qian J, Locke CS, Eason CJ, Cavanaugh JH et al. Effect of ritonavir on the pharmacokinetics of ethinyl oestradiol in healthy female volunteers. *Br J Clin Pharmacol* 1998; 46(2):111-116

878. Anderson MS, Wenning LA, Moreau A, Kost JT, Bieberdorf FA, Stone JA, et al. Effect of raltegravir on the pharmacokinetics of oral contraceptives. 47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Chicago, September 17-20 2007. Abstract A-1425.
879. Zhang J, Chung E, Eley T, Yones C, Persson A, Xu X, et al. Effect of atazanavir/ritonavir on the pharmacokinetics of ethinyl estradiol and 17-deacetyl norgestimate in healthy female subjects. 47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Chicago, September 17-20 2007. Abstract A-1415.
880. Beksinska ME, Smit JA, Ramkissoon A. Progestogen-only injectable hormonal contraceptive use should be considered in analysis of studies addressing the loss of bone mineral density in HIV-positive women. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2010; 54(4):e5
881. Morrison CS, Chen PL, Kwok C, Richardson BA, Chipato T, Mugerwa R et al. Hormonal contraception and HIV acquisition: reanalysis using marginal structural modeling. *AIDS* 2010; 24(11):1778-1781
882. Watts DH, Park JG, Cohn SE, Yu S, Hitti J, Stek A et al. Safety and tolerability of depot medroxyprogesterone acetate among HIV-infected women on antiretroviral therapy: ACTG A5093. *Contraception* 2008; 77(2):84-90
883. Nanda K, Amaral E, Hays M, Viscola MA, Mehta N, Bahamondes L. Pharmacokinetic interactions between depot medroxyprogesterone acetate and combination antiretroviral therapy. *Fertil Steril* 2008; 90(4):965-971
884. Public Health Service Task Force. Recommendations for use of antiretroviral drugs in pregnant HIV-1-infected women for maternal health and interventions to reduce perinatal HIV transmission in the United States (May 24, 2010). Disponible en: <http://aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/PerinatalGL.pdf> (Acceso 14/12/2010).
885. Polo R, Iribarren JA, de José MI, Muñoz Gállego E, (Coordinadores). Recomendaciones de la Secretaría del PNS, el GeSida, la SEGO y la AEP para el seguimiento de la infección por el VIH con relación a la reproducción, el embarazo y la prevención de la transmisión vertical (diciembre 2007). Accesible en: <http://www.gesida.seimc.org/> (Acceso 14.12.2010).
886. Ioannidis JP, Abrams EJ, Ammann A, Bulterys M, Goedert JJ, Gray L et al. Perinatal transmission of human immunodeficiency virus type 1 by pregnant women with RNA virus loads <1000 copies/ml. *J Infect Dis* 2001; 183(4):539-45
887. Connor EM, Sperling RS, Gelber R, Kiselev P, Scott G, O'Sullivan MJ et al. Reduction of maternal-infant transmission of human immunodeficiency virus type 1 with zidovudine treatment. Pediatric AIDS Clinical Trials Group Protocol 076 Study Group. *N Engl J Med* 1994; 331(18):1173-80
888. Cotter AM, Garcia AG, Duthely ML, Luke B, O'Sullivan MJ. Is antiretroviral therapy during pregnancy associated with an increased risk of preterm delivery, low birth weight, or stillbirth? *J Infect Dis* 2006; 193(9):1195-1201
889. Antiretroviral Pregnancy Registry Steering Committee. Antiretroviral pregnancy registry international interim report for 1 January 1989 through 31 January 2010. Accesible en: www.apregistry.com (Acceso 14.12.2010).
890. Best BM, Capparelli EV, Stek A, Burchett SK, Huo Y, Aweeka F, et al. Raltegravir pharmacokinetics during pregnancy. 50th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Boston, September 12-15 2010. Abstract H-1668a.
891. Garrido C, Soriano V, de MC. New therapeutic strategies for raltegravir. *J Antimicrob Chemother* 2010; 65(2):218-223
892. McKeown DA, Rosenvinge M, Donaghy S, Sharland M, Holt DW, Cormack I et al. High neonatal concentrations of raltegravir following transplacental transfer in HIV-1 positive pregnant women. *AIDS* 2010; 24(15):2416-2418
893. Hitti J, Frenkel LM, Stek AM, Nachman SA, Baker D, Gonzalez-Garcia A et al. Maternal toxicity with continuous nevirapine in pregnancy: results from PACTG 1022. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2004; 36(3):772-776
894. Fiore S, Newell ML, Thorne C. Higher rates of post-partum complications in HIV-infected than in uninfected women irrespective of mode of delivery. *AIDS* 2004; 18(6):933-938
895. Achievements in public health. Reduction in perinatal transmission of HIV infection--United States, 1985-2005. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2006; 55(21):592-597
896. UNAIDS. AIDS epidemic update 2010. Disponible en: www.unaids.org/globalreport/default.htm 2010; (Acceso 14.12.2010)

897. Centers for Disease Control and Prevention. Incorporating HIV prevention into the medical care of persons living with HIV. Recommendations of CDC, the Health Resources and Services Administration, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. *MMWR Recomm Rep* 2003; 52(RR-12):1-24
898. Padian NS, Buve A, Balkus J, Serwadda D, Cates W, Jr. Biomedical interventions to prevent HIV infection: evidence, challenges, and way forward. *Lancet* 2008; 372(9638):585-599
899. Piot P, Bartos M, Larson H, Zewdie D, Mane P. Coming to terms with complexity: a call to action for HIV prevention. *Lancet* 2008; 372(9641):845-859
900. Quinn TC, Wawer MJ, Sewankambo N, Serwadda D, Li C, Wabwire-Mangen F et al. Viral load and heterosexual transmission of human immunodeficiency virus type 1. Rakai Project Study Group. *N Engl J Med* 2000; 342(13):921-929
901. Centers for Disease Control and Prevention. 2009 Compendium of evidence-based HIV prevention interventions. Available at: www.cdc.gov/hiv/topics/research/prs/evidence-based-interventions.htm (Acceso: 20.10.2010).
902. Hollingsworth TD, Anderson RM, Fraser C. HIV-1 transmission, by stage of infection. *J Infect Dis* 2008; 198(5):687-693
903. Moreno S, Mocroft A, Monforte A. Medical and societal consequences of late presentation. *Antivir Ther* 2010; 15 Suppl 1:9-15
904. Watts DH. Management of human immunodeficiency virus infection in pregnancy. *N Engl J Med* 2002; 346(24):1879-1891
905. Donnell D, Baeten JM, Kiarie J, Thomas KK, Stevens W, Cohen CR et al. Heterosexual HIV-1 transmission after initiation of antiretroviral therapy: a prospective cohort analysis. *Lancet* 2010; 375(9731):2092-2098
906. Sullivan P, Kayitenkore K, Chomba E, Karita E, Mwananyanda L, Vwalika C, et al. Reduction of HIV Transmission Risk and High Risk Sex while Prescribed ART: Results from Discordant Couples in Rwanda and Zambia. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 52bLB.
907. Del Romero J., Castilla J, Hernando V, Rodriguez C, Garcia S. Combined antiretroviral treatment and heterosexual transmission of HIV-1: cross sectional and prospective cohort study. *BMJ* 2010; 340:c2205
908. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Preventing sexual transmission of HIV with anti-VIH drugs. Disponible en: <http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00074581> 2010; (Acceso 14.12.2010)
909. Granich RM, Gilks CF, Dye C, De Cock KM, Williams BG. Universal voluntary HIV testing with immediate antiretroviral therapy as a strategy for elimination of HIV transmission: a mathematical model. *Lancet* 2009; 373(9657):48-57
910. Charlebois E, Porco T, Das-Douglas M, Havlir D. Effect of expanded ART strategies on the MSM VIH epidemic in San Francisco. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 996.
911. Das M, Chu PL, Santos GM, Scheer S, Vittinghoff E, McFarland W et al. Decreases in community viral load are accompanied by reductions in new HIV infections in San Francisco. *PLoS One* 2010; 5(6):e11068
912. Montaner JS, Lima VD, Barrios R, Yip B, Wood E, Kerr T et al. Association of highly active antiretroviral therapy coverage, population viral load, and yearly new HIV diagnoses in British Columbia, Canada: a population-based study. *Lancet* 2010; 376(9740):532-539
913. Dieffenbach CW, Fauci AS. Universal voluntary testing and treatment for prevention of HIV transmission. *JAMA* 2009; 301(22):2380-2382
914. Cohen MS, Gay CL. Treatment to prevent transmission of HIV-1. *Clin Infect Dis* 2010; 50 Suppl 3:S85-S95
915. Hillier S. Pre-Exposure Prophylaxis: Could It Work? 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 73.
916. Abdool KQ, Abdool Karim SS, Frohlich JA, Grobler AC, Baxter C, Mansoor LE et al. Effectiveness and safety of tenofovir gel, an antiretroviral microbicide, for the prevention of HIV infection in women. *Science* 2010; 329(5996):1168-1174
917. Grant RM, Lama JR, Anderson PL, McMahan V, Liu AY, Vargas L et al. Preexposure Chemoprophylaxis for HIV Prevention in Men Who Have Sex with Men. *N Engl J Med* 2010 (doi: 10.1065/NEJMoa1011205)

918. Kim SC, Becker S, Dieffenbach C, Hanewall BS, Hankins C, Lo YR et al. Planning for pre-exposure prophylaxis to prevent HIV transmission: challenges and opportunities. *J Int AIDS Soc* 2010; 13(26):24-33
919. Underhill K, Operario D, Mimiaga MJ, Skeer MR, Mayer KH. Implementation science of pre-exposure prophylaxis: preparing for public use. *Curr HIV/AIDS Rep* 2010; 7(4):210-219
920. Baggaley RF, Boily MC, White RG, Alary M. Risk of HIV-1 transmission for parenteral exposure and blood transfusion: a systematic review and meta-analysis. *AIDS* 2006; 20(6):805-812
921. Cardo DM, Culver DH, Ciesielski CA, Srivastava PU, Marcus R, Abiteboul D et al. A case-control study of HIV seroconversion in health care workers after percutaneous exposure. Centers for Disease Control and Prevention Needlestick Surveillance Group. *N Engl J Med* 1997; 337(21):1485-90
922. Grob PM, Cao Y, Muchmore E, Ho DD, Norris S, Pav JW et al. Prophylaxis against HIV-1 infection in chimpanzees by nevirapine, a nonnucleoside inhibitor of reverse transcriptase. *Nat Med* 1997; 3(6):665-70
923. Luque A, Hulse S, Wang D, Shahzad U, Tanzman E, Antenozzi S et al. Assessment of adverse events associated with antiretroviral regimens for postexposure prophylaxis for occupational and nonoccupational exposures to prevent transmission of human immunodeficiency virus. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2007; 28(6):695-701
924. Rabaud C, Burty C, Grandidier M, Christian B, Penalba C, Beguinot I et al. Tolerability of postexposure prophylaxis with the combination of zidovudine-lamivudine and lopinavir-ritonavir for HIV infection. *Clin Infect Dis* 2005; 40(2):303-305
925. Centers for Disease Control and Prevention. Serious adverse events attributed to nevirapine regimens for postexposure prophylaxis after HIV exposures--worldwide, 1997-2000. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2001; 49(51-52):1153-6
926. Young T, Arens FJ, Kenndy GE, Laurie JV, Rutherford GW. Antiretroviral post-exposure prophylaxis for occupational HIV exposure. *Cochrane Database Syst Rev* 2007; 2007(1):Art. No.: CD002835. DOI:10.1002/14651858.CD002835.pub3.
927. Zenner D, Tomkins S, Charlett A, Wellings K, Ncube F. HIV prone occupational exposures: epidemiology and factors associated with initiation of post-exposure prophylaxis. *J Epidemiol Community Health* 2009; 63(5):373-378
928. Beltrami EM, Cheingsong R, Heneine WM, Respass RA, Orelie JG, Mendelson MH et al. Antiretroviral drug resistance in human immunodeficiency virus-infected source patients for occupational exposures to healthcare workers. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2003; 24(10):724-730
929. Polo R, Aguirrebengoa K, Vives N, (Coordinadores). Recomendaciones del SPNS, Gesida, CEESCAT, SEIP y AEP sobre profilaxis postexposición frente al VIH, VHB y VHC en adultos y niños. Ministerio Sanidad y Consumo 2008.
930. Clumeck N, Dedes N, Pozniak A, Raffi F. European AIDS Clinical Society. Guidelines. Clinical management and treatment of HIV infected adults in Europe. Disponible en: www.europeanaidscinicalsociety.org/guidelinespdf/EACS-EuroGuidelines_FullVersion.pdf 2009; (Acceso: 20.10.2010)
931. Panlilio AL, Cardo DM, Grohskopf LA, Heneine W, Ross CS. Updated U.S. Public Health Service guidelines for the management of occupational exposures to HIV and recommendations for postexposure prophylaxis. *MMWR Recomm Rep* 2005; 54(RR-9):1-17
932. New York State Department of Health AIDS Institute. HIV prophylaxis following occupational exposure. May 2010 Update. Disponible en: www.hivguidelines.org 2010; (Acceso: 19.10.2010)
933. Landovitz RJ, Currier JS. Postexposure prophylaxis for HIV infection (clinical practice). *N Engl J Med* 2009; 361(18):1768-1775
934. Smith DK, Grohskopf LA, Black RJ, Auerbach JD, Veronese F, Struble KA et al. Antiretroviral postexposure prophylaxis after sexual, injection-drug use, or other nonoccupational exposure to HIV in the United States: recommendations from the U.S. Department of Health and Human Services. *MMWR Recomm Rep* 2005; 54(RR-2):1-20
935. Boily MC, Baggaley RF, Wang L, Masse B, White RG, Hayes RJ et al. Heterosexual risk of HIV-1 infection per sexual act: systematic review and meta-analysis of observational studies. *Lancet Infect Dis* 2009; 9(2):118-129
936. Jin F, Jansson J, Law M, Prestage GP, Zablotska I, Imrie JC et al. Per-contact probability of HIV transmission in homosexual men in Sydney in the era of HAART. *AIDS* 2010; 24(6):907-913

937. Barber TJ, Benn PD. Postexposure prophylaxis for HIV following sexual exposure. *Curr Opin HIV AIDS* 2010; 5(4):322-326
938. Martin JN, Roland ME, Neilands TB, Krone MR, Bamberger JD, Kohn RP et al. Use of postexposure prophylaxis against HIV infection following sexual exposure does not lead to increases in high-risk behavior. *AIDS* 2004; 18(5):787-792
939. Dumond JB, Yeh RF, Patterson KB, Corbett AH, Jung BH, Rezk NL et al. Antiretroviral drug exposure in the female genital tract: implications for oral pre- and post-exposure prophylaxis. *AIDS* 2007; 21(14):1899-1907
940. Bryant J, Baxter L, Hird S. Non-occupational postexposure prophylaxis for HIV: a systematic review. *Health Technol Assess* 2009; 13(14):iii, ix-60
941. Vives N, Almeda J, Contreras CA, Garcia F, Campins M, Casabona J. Demanda y prescripción de la profilaxis postexposición no ocupacional al VIH en España (2001-2005). *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2008; 26(9):546-551
942. Guinot D, Ho MT, Poynten IM, McAllister J, Pierce A, Pell C et al. Cost-effectiveness of HIV nonoccupational post-exposure prophylaxis in Australia. *HIV Med* 2009; 10(4):199-208
943. Taylor S, Davies S. Antiretroviral drug concentrations in the male and female genital tract: implications for the sexual transmission of HIV. *Curr Opin HIV AIDS* 2010; 5(4):335-343
944. Fisher M, Benn P, Evans B, Pozniak A, Jones M, Maclean S et al. UK Guideline for the use of post-exposure prophylaxis for HIV following sexual exposure. *Int J STD AIDS* 2006; 17(2):81-92
945. Tosini W, Muller P, Prazuck T, Benabdelmoumen G, Peyrouse E, Christian B et al. Tolerability of HIV postexposure prophylaxis with tenofovir/emtricitabine and lopinavir/ritonavir tablet formulation. *AIDS* 2010; 24(15):2375-2380
946. Sonder GJ, Prins JM, Regez RM, Brinkman K, Mulder JW, Veenstra J et al. Comparison of Two HIV Postexposure Prophylaxis Regimens Among Men Who Have Sex With Men in Amsterdam: Adverse Effects Do Not Influence Compliance. *Sex Transm Dis* 2010; 37(11):681-686
947. Diaz-Brito V, León A, Knobel H, Peraire J, Domingo P, Clotet B, et al. An open randomized multicenter clinical trial comparing Zidovudine/Lamivudine plus Lopinavir/Ritonavir or plus Atazanavir used as post-exposure prophylaxis for HIV infection. 17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 27-March 2 2010. Abstract 956.
948. Dybul M, Chun TW, Yoder C, Hidalgo B, Belson M, Hertogs K et al. Short-cycle structured intermittent treatment of chronic HIV infection with highly active antiretroviral therapy: effects on virologic, immunologic, and toxicity parameters. *Proc Natl Acad Sci USA* 2001; 98(26):15161-6
949. Garcia F, Plana M, Ortiz GM, Bonhoeffer S, Soriano A, Vidal C et al. The virological and immunological consequences of structured treatment interruptions in chronic HIV-1 infection. *AIDS* 2001; 15:F29-40
950. Ruiz L, Carcelain G, Martinez-Picado J, Frost S, Marfil S, Paredes R et al. HIV dynamics and Tcell immunity after three structured treatment interruptions in chronic HIV-1 infection. *AIDS* 2001; 15:F19-27
951. Fagard C, Oxenius A, Gunthard H, Garcia F, Le Braz M, Mestre G et al. A prospective trial of structured treatment interruptions in human immunodeficiency virus infection. *Arch Intern Med* 2003; 163:1220-1226
952. Miller V, Sabin C, Hertogs K, Bloor S, Martinez-Picado J, D'Aquila R et al. Virological and immunological effects of treatment interruptions in HIV-1 infected patients with treatment failure. *AIDS* 2000; 14(18):2857-67
953. Walmsley SL, Thorne A, Loutfy MR, LaPierre N, MacLeod J, Harrigan R et al. A prospective randomized controlled trial of structured treatment interruption in HIV-infected patients failing highly active antiretroviral therapy (Canadian HIV Trials Network Study 164). *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 45(4):418-425
954. Ruiz L, Ribera E, Bonjoch A, Romeu J, Martinez-Picado J, Paredes R et al. Role of structured treatment interruption before a 5-drug salvage antiretroviral regimen: the Retrogene Study. *J Infect Dis* 2003; 188:977-985
955. Deeks SG, Hoh R, Grant RM, Wrin T, Barbour JD, Narvaez A et al. CD4+ T Cell Kinetics and Activation in Human Immunodeficiency Virus-Infected Patients Who Remain Viremic Despite Long-Term Treatment with Protease Inhibitor-Based Therapy. *J Infect Dis* 2002; 185(3):315-23
956. Ananworanich J, Hirschel B. Intermittent therapy for the treatment of chronic HIV infection. *AIDS* 2007; 21(2):123-134

957. Arnedo-Valero M, García F, Gil C, Castro P, Blanco JL, Miro JM, Pumarola T, Gatell JM. Risk of developing selected de novo resistance mutations during structured therapy interruption in chronic HIV-1 infection. 11th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Francisco, February 8--11 2004. Abstract 668.
958. Cardiello PG, Hassink E, Ananworanich J, Srasuebkul P, Samor T, Mahanontharit A et al. A prospective, randomized trial of structured treatment interruption for patients with chronic HIV type 1 infection. *Clin Infect Dis* 2005; 40(4):594-600
959. Danel C, Moh R, Minga A, Anzian A, Ba-Gomis O, Kanga C et al. CD4-guided structured antiretroviral treatment interruption strategy in HIV-infected adults in west Africa (Trivacan ANRS 1269 trial): a randomised trial. *Lancet* 2006; 367(9527):1981-1989
960. Jacobson JM, Turner BJ, Abrutyn E. Trials that matter: CD4+ T-lymphocyte count-guided interruption of antiretroviral therapy in HIV-infected patients. *Ann Intern Med* 2007; 146(9):682-683
961. Marchou B, Tangre P, Charreau I, Izopet J, Girard PM, May T, et al. Structured treatment interruptions in HIV-infected patients with high CD4 cell counts and virologic suppression: Results of a prospective, randomized, open-label trial (Window - ANRS 106). 13th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Denver, February 5-8, 2006. Abstract 104.
962. Olmo M, Podzamczar D, Peñaranda M, Gutiérrez F, Nubió J, Romeu J, et al. A randomized trial of CD4-guided haart interruption in patients receiving mostly NRTI-based regimens: 96-week results. 11th European AIDS Conference, Madrid, October 24-27 2007. Abstract P7.6/02.
963. Olmo M, Podzamczar D, Peñaranda M, Gutiérrez F, Nubió J, Romeu J, et al. PBMC and plasma genotypic resistance during a CD4-guided HAART interruption randomized study. 96-week follow-up. 11th European AIDS Conference, Madrid, October 24-27 2007. Abstract P3.4/04.
964. Pogany K, van V, I, Prins JM, Nieuwkerk PT, van dE, I, Kauffmann RH et al. Effects of active treatment discontinuation in patients with a CD4+ T-cell nadir greater than 350 cells/mm3: 48-week Treatment Interruption in Early Starters Netherlands Study (TRISTAN). *J Acquir Immune Defic Syndr* 2007; 44(4):395-400
965. Ruiz L, Paredes R, Gomez G, Romeu J, Domingo P, Perez-Alvarez N et al. Antiretroviral therapy interruption guided by CD4 cell counts and plasma HIV-1 RNA levels in chronically HIV-1-infected patients. *AIDS* 2007; 21(2):169-178
966. Skiest DJ, Su Z, Havlir DV, Robertson KR, Coombs RW, Cain P et al. Interruption of antiretroviral treatment in HIV-infected patients with preserved immune function is associated with a low rate of clinical progression: a prospective study by AIDS Clinical Trials Group 5170. *J Infect Dis* 2007; 195(10):1426-1436
967. Ananworanich J, Gayet-Ageron A, Le Braz M, Prasithsirikul W, Chetchotisakd P, Kiertiburanakul S, Phanuphak P, Cooper D, Hirschel B, the Staccato Study Group. CD4-guided scheduled treatments interruptions compared to continuous therapy: Results of the Staccato trial. 13th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Denver, February 5-8, 2006. Abstract 102.
968. Ananworanich J, Gayet-Ageron A, Le BM, Prasithsirikul W, Chetchotisakd P, Kiertiburanakul S et al. CD4-guided scheduled treatment interruptions compared with continuous therapy for patients infected with HIV-1: results of the Staccato randomised trial. *Lancet* 2006; 368(9534):459-465
969. Kuller L, SMART Study Group. Elevated levels of interleukin-6 and D-dimer are associated with an increased risk of death in patients with HIV. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 139.
970. Calmy A, Nguyen A, Montecucco F, Gayet-Ageron A, Burger F, Mach F, et al. HIV activates markers of cardiovascular risk in a randomized treatment interruption trial: STACCATO. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, February 3-6 2008. Abstract 140.
971. Olmo M, Alonso Villaverde C, Penaranda M, Gutierrez F, Romeu J, Larrousse M, et al. Impact of HAART interruption on plasma inflammatory markers associated with cardiovascular disease. 24-month results from a randomized study. 16th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Montreal, February 8-11 2009. Abstract 738.
972. Schooley RT, Spritzler J, Wang H, Lederman MM, Havlir D, Kuritzkes DR et al. AIDS clinical trials group 5197: a placebo-controlled trial of immunization of HIV-1-infected persons with a replication-deficient adenovirus type 5 vaccine expressing the HIV-1 core protein. *J Infect Dis* 2010; 202(5):705-716
973. Davey RT, Jr., Murphy RL, Graziano FM, Boswell SL, Pavia AT, Cancio M et al. Immunologic and virologic effects of subcutaneous interleukin 2 in combination with antiretroviral therapy: A randomized controlled trial. *JAMA* 2000; 284(2):183-9

974. Emery S, Capra WB, Cooper DA, Mitsuyasu RT, Kovacs JA, Vig P et al. Pooled analysis of 3 randomized, controlled trials of interleukin-2 therapy in adult human immunodeficiency virus type 1 disease. *J Infect Dis* 2000; 182(2):428-34
975. Katlama C, Carcelain G, Duviol C, Chouquet C, Tubiana R, De Sa M et al. Interleukin -2 accelerates CD4 cell reconstitution in HIV-infected patients with severe immunosuppression despite highly active antiretroviral therapy: the IL2M study--ANRS 082. *AIDS* 2002; 16:2027-2034
976. The INSIGHT-ESPRIT Study Group and SILCAAT Scientific Committee. Interleukin-2 Therapy in Patients with HIV Infection. *N Engl J Med* 2009; 361(16):1548-1559
977. Kahn JO, Cherng DW, Mayer K, Murray H, Lagakos S. Evaluation of HIV-1 immunogen, an immunologic modifier, administered to patients infected with HIV having 300 to 549 x 10(6)/L CD4 cell counts: A randomized controlled trial. *JAMA* 2000; 284(17):2193-202
978. Garcia F, Lejeune M, Climent N, Gil C, Alcami J, Morente V et al. Therapeutic immunization with dendritic cells loaded with heat-inactivated autologous HIV-1 in patients with chronic HIV-1 infection. *J Infect Dis* 2005; 191(10):1680-1685
979. Fernandez-Cruz E, Moreno S, Navarro J, Clotet B, Bouza E, Carbone J et al. Therapeutic immunization with an inactivated HIV-1 Immunogen plus antiretrovirals versus antiretroviral therapy alone in asymptomatic HIV-infected subjects. *Vaccine* 2004; 22(23-24):2966-2973
980. Pozniak AL, Morales-Ramirez J, Katabira E, Steyn D, Lupo SH, Santoscoy M et al. Efficacy and safety of TMC278 in antiretroviral-naïve HIV-1 patients: week 96 results of a phase IIb randomized trial. *AIDS* 2010; 24(1):55-65
981. Azijn H, Tirry I, Vingerhoets J, de Bethune MP, Kraus G, Boven K et al. TMC278, a next-generation nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI), active against wild-type and NNRTI-resistant HIV-1. *Antimicrob Agents Chemother* 2010; 54(2):718-727
982. Cohen C, Molina JM, Cahn P, Clotet B, Fouriee J, Grinsztejn B, et al. Pooled Week 48 efficacy and safety results from ECHO and THRIVE, two double-blind, randomised, Phase III trials comparing TMC278 versus efavirenz in treatment-naïve, HIV-1-infected patients. 18th International AIDS Conference, Vienna, July 18-23 2010. abstract THLB206.
983. Shimura K, Kodama E, Sakagami Y, Matsuzaki Y, Watanabe W, Yamataka K et al. Broad antiretroviral activity and resistance profile of the novel human immunodeficiency virus integrase inhibitor elvitegravir (JTK-303/GS-9137). *J Virol* 2008; 82(2):764-774
984. Zolopa AR, Berger DS, Lampiris H, Zhong L, Chuck SL, Enejosa JV et al. Activity of elvitegravir, a once-daily integrase inhibitor, against resistant HIV Type 1: results of a phase 2, randomized, controlled, dose-ranging clinical trial. *J Infect Dis* 2010; 201(6):814-822
985. Underwood M, Johns B, Sato A, Fujiwara T, Spreen W. S/GSK1349572: a next generation integrase inhibitor with activity against integrase inhibitor clinical isolates from patients experiencing virologic failure while on raltegravir therapy. 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Cape Town, July 19-22 2009. Abstract WePeAO98.
986. Eron J, Durant J, Poizot-Martin I, Reynes J, Soriano V, Kumar P et al. Activity of a next generation integrase inhibitor, S/GSK1349572, in subjects with HIV exhibiting raltegravir resistance: initial results of VIKING study (ING112961). 18th International AIDS Conference, Vienna, July 18-23 2010. Abstract MOAB0105.
987. Arribas JR, Lazzarin A, Raffi F, Rakhmanova A, Richmond G, Rockstroh J, et al. Once-daily S/GSK1349572 as part of combination therapy in antiretroviral naïve adults: rapid and potent antiviral responses in the interim 16-week analysis from SPRING-1 (ING112276). 18th International AIDS Conference, Vienna, July 18-23 2010. Abstract THLB205.
988. Gulick RM, Su Z, Flexner C, Hughes MD, Skolnik PR, Wilkin TJ et al. Phase 2 study of the safety and efficacy of vicriviroc, a CCR5 inhibitor, in HIV-1-infected, treatment-experienced patients: AIDS clinical trials group 5211. *J Infect Dis* 2007; 196(2):304-312
989. McNicholas P, Wei Y, Whitcomb J, Greaves W, Black TA, Tremblay CL et al. Characterization of emergent HIV resistance in treatment-naïve subjects enrolled in a vicriviroc phase 2 trial. *J Infect Dis* 2010; 201(10):1470-1480
990. Wilkin TJ, Su Z, Krambrink A, Long J, Greaves W, Gross R et al. Three-year safety and efficacy of vicriviroc, a CCR5 antagonist, in HIV-1-infected treatment-experienced patients. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2010; 54(5):470-476

991. McCallister S, Doto J, Allaway G, Martin DE. Multiple dosing of the novel HIV-1 maturation inhibitor bevirimat: aggregate adverse event (AE) and laboratory data from four short-term studies. 4th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Sydney, July 22-25 2007. Abstract WEPEA110.
992. Llibre JM, Antela A, Arribas JR, Domingo P, Gatell JM, Lopez-Aldeguer J et al. El papel de las combinaciones de antirretrovirales a dosis fijas. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2010; 28(9):615-620